













*Edward Lawrence West*

BERNARDI SIEGFRIED ALBINI

TABULAE  
SCELETI  
ET  
MUSCULORUM  
CORPORIS HUMANI.



*N. Blaney inv. & del.*

*J. Smith sculp.*

LONDINI:  
TYPIS H. WOODFALL.  
IMPENSIS JOHANNIS ET PAULI KNAPTON. M.DCC.XLIX.



# HISTORIA

## HUJUS OPERIS.

**N**ON ab re esse videtur, quo melius ratio harum tabularum apparere possit, quo consilio, pactoque confectae sint, explicare: neque incommodum, non solum ea, quae, dum consequi, quod cupiebam, studui, recte acta putavi, commemorare; sed etiam ea, quae secus, non praeterire; quo facilius, quae fugere, quaeque sequi conveniat, possit judicari. Primum igitur à musculis exorsus sum, simul & singulos, & syntaxis omnium rationem pictura cupiens persequi paullo diligentius. Et quidem à syntaxi exorsus sum. Quam cum necesse esset, in certos quosdam ordines, eo quod fere alii post alios collocati musculi sunt, partiri; quorum primus primos, qui statim post integumenta corporis communia sequuntur, contineret musculos; secundus, detractis primis illis, secundos; & perinde reliqui: volebam, ut non modo idem membrorum in omnibus ordinum illorum figuris esset positus, sed ut ex omni etiam parte aliae aliis recte essent continuatae; atque adeo, ut plane figurarum series ostenderet omnia ita, uti sint in corpore, eo positu, adspectuque, quos elegissem. Hac ego mente ordines illos artificii, quo plerique praeveiant anatomici modo, propono ad imitandum. Reddereque is eos, quam quidem poterat bene; hoc maxime retardante, & impediante, quod, cum in primis ordinibus & musculi quidam, & ossa, quadam tantummodo parte sui exstarent; plenius autem in sequentibus, detractis, qui obtegebant, musculis primis: fieri non potuerat, ut partes illas eorum in primis ordinibus (ut qui, quia primi, primi propositi, exscriptique) sic definiret, ut simul eae recte in sequentibus continuari, simul ita apponi continuata possent, sicuti corpus ostendebat oportere. Quamvis autem deinde, ut interiores ordines faciendum esse indicabant, exteriorum figurae emendatae sint, figuraeque omnes non malae essent, in iisque artificis peritia eluceret; satis tamen non placebant, propterea quod neque satis apte, non certe ut volebam, omnia in iis cohaerebant, neque satis definite, rotundeque designata erant: & totae distabant ab iis, quarum species animo obversabatur. In aliquot autem expertus rem eram membris: ventre, pectore, brachio, facie. Ex quo hunc fructum reportavi, ut, quid facto opus sit, ut ad id, quod cupiebam, pervenirem, cognoverim. Animadverteram inter expingendum, quod, cum primi ordines figurarum membrorum in universum satis referrent, potuerint ab artifice sic satis exprimi, tanquam figurae illi, quam tenebat animo, inscribente, quae corpus exhibebat; siue pictura sic imitante eadem, ut membrorum figurae responderent: sed quod, quo magis ad interiora, detractis musculis primis, perveniebatur, eo etiam magis pereunte membrorum figura, artifex in exprimendis ordinibus interioribus non aequae cognitione figurae illius juvaretur, cogereturque ad primum ordinem, in quo figura illa in universum supererat, sequentes, ut ad fundamentum, accommodare. Idque minus bene succederet in ossibus, sceletique compage, ut quae syntaxis quaedam ipsa per se sit, figurae corporis humani in universum quidem respondens, sed multum tamen ab ea discrepans. Nec poterant tamen recte musculi reddi, nisi simul, cui appositi, affixique, compages redderetur sceleti. Intelligebam praeterea, vaga futura omnia, quaecunque acta essent, nisi ea, quae corpus ostenderet, secundum mensuram exscriberentur, si non accuratissima illa quidem subtilitate, certe tamen non incuriose. Id vero quo minus effectum dari posset, magnae videbantur impediturae difficultates. Illae primum, quas hoc ipsum, recte omnia demetiri, posteaque tabulae secundum mensuram inscribere, allaturum erat. Deinde, si id vel maxime ex sententia succederet, etiam alia, vix superanda. Etenim manifestum erat, qualis corporis membrive positus foret, talem, si omnia secundum mensuram, ut dictum est, exscriberentur, futurum in *icone*. Poterant autem quaedam membra sic quidem satis recte componi; ut caput, brachia, manus, crura, pedis: quaedam non poterant; ut truncus, & collum. Itaque intelligebatur fore, ut haec, quae non possint, inconcinno positu exprimerentur, nisi artificii relinqueretur ut eum artis suae peritia corrigeret: quorum tamen illud plane erat fugiendum: hoc, quoniam non posset non aberrari, certe periculum esset, ne aberraretur, probari mihi non poterat. Et si jam componi recte omnia potuissent, tamen, cum rimando, tractandoque musculos, aut alia aliqua occasione, positus primus mutatus aliquantum fuisset, vix videbatur ita reponendi facultas fore, ut iis, quae jam expressa essent, omnia plane responderent. Praeterquam quod satis apparebat, unum idemque corpus omnibus minime suffecturum, aliaque neque satis responsura, neque, tametsi responderent, futurum, ut eodem, quo, quae antea adhibita fuerint, modo possent componi, quo facultas esset, secundum mensuram omnia apte congruenterque exscribendi. Ipsa igitur res demonstrare, quod quaerebam, majus hoc esse quiddam, quam, qui mos fuerit anatomicorum, etiam in primis probatorum, sic tantummodo pictura imitari, quod propositum ante oculos sit, figurarumque conficere vagas, in quibus nec ad ordinem te adstringas, nec ad mensurae definitionem, nec ad continuationem seriemque. Quales figurae quamvis boni aliquid, quamvis multum, quamvis etiam plurimum contineant, relinquunt tamen multa, quae jure desiderantur, aut quae certe, quod in omni re difficillimum in primis est, addant perfectionem operi. Quid multa? demonstrare res, longe alia via incedendum, neque, quod intendam, me affecuturum, nisi certa quaedam norma inventa sit, ad quam figurae efficiantur. Cumque corpora hominum, quamvis plurimum differant inter se rebus multis, tamen in universum convenient; sumendum esse ex corpore ipso fundamentum quoddam conficiendarum iconum, commune corporibus omnium. Ac sceletum id esse: qui ut corpori sit, ut subiectus musculis, ita, quo certi quid, & naturae respondens consequeretur, subijciendus sit figuris. Ejus igitur figuras efficiendas primum esse, & ad eas deinde musculos referendos. Ita enim futurum, ut, sceleti figuris primum constitutis, cum in plerisque certe hominibus, cujuscunque staturae & to-

fitatis, eodem plus minus modo, iisdemque locis, sceletum musculi adhaereant, & appositi sint: futurum igitur, ut ad figuras illas, ex aliis aliisque corporibus, quamvis valde diversas inter se, dummodo non vitiosis, referri musculi possint, si, ut ad ossa in corporibus illis pertineant, sic ad eas appingantur. Apparebat simul etiam alius dictae regulae usus: futurum, ut, si eo pacto confectae figurae musculorum essent, inveniri per eas in vivo, cognoscique multi eorum, fere autem locus omnium posset. Nam primum, juvantibus sceleti figuris, haud difficile futurum, ossium in vivo partem magnam cognoscere, eorumque, quae aperte cognosci nequeant, satis tamen perspicere locum, positumque, aut argumenta invenire ad perspicendum: iisque cognitiss, perspicuisse, facultatem fore perpendendi, & judicandi, quomodo musculi, ut in figuris, appositi ossibus sint in vivo. Et praeterea, constitutis sceleti, & syntaxis musculorum figuris, fore, ut referri ad eas figurae viscerum possint: & iis quoque constitutis, possint figurae articularum, venarum, nervorum, caeterorum. Ut enim architecti, jactis fundamentis certis, superstruant eis aedificium, cum omnibus suis partibus; sic existimari posse, sceletum, ut fundamento, appensos, adnexosque musculos, viscera apposita, partesque alias: nervos deinde inter ea deductos, venasque, & arterias: caeteraque superaddita, quae praeterea ad fabricam corporis nostri pertinent. Itaque longe optime imitaturam artem hunc, quem natura praemonstret, modum. Quae res & ab Eustachio simile quid effectum in tabulis esse suis, cognoscendi ansam dedit.

Ergo relictis rudimentis illis primis, ut quae, quomodo faciendum sit, indicare, & docere tantum potuerint, non aliud quicquam agere, quam de sceleti figuris conficiendis cogitare. Quae ut bonae essent, ut esse fundamentum reliquorum possent, requirebatur, ut accuratae essent, talemque sceleti speciem plane exhiberent, qualis sit in vivo, illo statu, qui eligeretur. At vero, ut nulla ossium pars, in figuris exhibenda, cerni non posset, accurate purgarentur, atque adeo dissolverentur, necesse erat: dissoluta autem apte rursus componere, primum futurum non erat. Neque etiam futurum, ut certo sciretur, rectene composita sint, nec ne, nisi comparare cum ipsa naturali compositione daretur: quod qui daretur, non apparebat. Et si jam daretur, haud difficilis erat conjectura, fore, ut ad ejus normam componi in genere quidem possent; non autem accuratissime illa, qua velim, quae, ut reliqua recte apponendi facultas esset, requiratur. Accedebat eo, quod crustae cartilagineae, quibus partes ossium illae, quibus committuntur inter se, obtectae sunt, exquisitè purgando, aut pereant, aut certe vitentur; proptereaque, sic purgata si componerentur, minus apti articuli futuri essent. Quae quidem quo minus in iis, quae exstabant, laudare sceleti figuris poteram, eo magis quaerendum mihi ad ea remedium erat. Postquam aliquandiu non satis certa consilia fuerant, venit in mentem, sceletum ita è corpore aliquo erui, itaque purgare, ut vincula firmamenta commissurarum sola superessent: eoque, ut reddi velim, ita constituto, ac deinde exscripto, incidere, & detrahare vincula, quo illa, quae ab iis tegantur, addi figurae possent. Ad quem utique modum ipsa naturae ratio, quam optime possit, proponeretur. Sed animo praevidebam, rem fore operosam, sceletum ita erui: difficilemque, erutus qui esset, recte constituere. Et verendum erat, ne, cum appareret, exigui temporis rem non fore ejusmodi sceleti descriptionem, is interea, partim exsiccatione crustarum cartilaginearum, vinculorumque, partim corruptione plurimum vitaretur, & corruptio etiam officeret simul cum corpore animo. Quo magis visum est, tentare primum rem in separatis sceleti membris. In eorum autem aliis satis bene procedebat; ut in manibus, pedibus, coxis: in aliis multo quidem difficilius; ut in costis, & spina; sed tamen sic, ut difficultates superandi spes ostenderetur. Blandientibus igitur, quae degustaveram, exeunte anno quinto & vigesimo hujus seculi, corpus idoneum nactus, comparavi ex eo, qualem dixi sceletum. Qui cum natura caducus esset, eo quod mollioribus vinculis, iisque majorem partem laxè cohaereret, quomodo recte eum constituerem, fulciremque, considerandum fuit. Vincula quidem exsiccare, quo totus obrigesceret, nec conveniebat, ne vitaretur multorum ossium compositio, depravarenturque crustae cartilagineae articularum: neque, si convenisset, convenire prius, quam status sceleti, quo in figura redderetur, fuisset compositus, potuisset. Igitur ad eum constituendum, talem inii rationem. Cum sustinere pedes truncum nequirent, quod neque rigidi essent ipsi, neque super vertices femorum coxae inniti per se stabiliter possent; primum cogitare de ima parte trunci fulcienda fulcro firmo & stabili: & ita quidem, ut eam aliquantum inclinandi, ubi res posceret, & ut posceret, potestas foret. Hoc proposito tripodem efficiendum curare, pedibus modice disjunctis; à cujus summo, inde ubi pedum conjunctio sit, ferreum fulcrum surgat, mox in tria fissum brachia, modice divaricata: quorum unum brevius, duo reliqua aequalia sint inter se: omnia autem in summo ad extremum in cubitum primum extorsum flexa, ad sustinendum, quod imponeretur; indeque mox sursum, ad retinendum: tripodem toto altiore, quam ut pedes, cum sceletus ei trunco imo inniteretur, utcunque pendentes, plane ad imum tripodis, atque adeo ad mensam, cui is imponeretur, possent pertingere. Tripodem illum ponere super mensam humilem, quo facilius expingi ima sceleti, pedesque praecipue extremi possent: cum, si super solum positus esset, nimis se artifex ad ea recte cernenda inclinare cogeretur. Post imum truncum tripodis imponere, sic ut synchondrosis pubis summo brachio ejus breviori; imaque ossa ilium, ante sacrum, summis inniterentur brachiorum longiorum: quibus trunci partibus recipiendis, retinendisque, ut brachiorum illorum conveniret divaricatio, curaveram: utque brachium brevius tanto longioribus esset brevius, quanto fere demissius imum synchondrosis poni debere existimaveram, quam imas illas ilium partes, quae longioribus inniterentur. Quo posito funda-



## HISTORIA HUIUS OPERIS.

mento firmo, erigendus primum truncus erat, cum collo & capite. Erigendus primum truncus, utpote firmior & stabilior, quam collum cum capite. Itaque superiori parti spinae, infra collum, qua parte firmior est, & stabilior, funem alligo, eumque inde recta ad lacunar conclavis deduco, perque annulum, quem lacunari ibi loci affixeram, trajicio, posteaque demissum deduco ad uncinum parieti infixum, eique circumjicio, alligoque. Ejusque adductione funis erigo truncum, quantum possum; sic tamen, ut imum ejus tripodi inniteretur. Post fune alio sub utroque zygomate trajecto, extremorum altero sub dextro, altero sub sinistro, adductoque funis medio ad occipitum juxta cervicem, extrema supra caput colligare inter se anfae specie: eoque facto, anfae illi alligare funem alterum, eumque, sicut illum, qui spinae alligatus erat, deducere ad lacunar, ibique per annulum alterum, affixum juxta primum, trajicere, indeque ad uncinum parieti infixum deducere, eique alligare. Adducereque funem hunc, quantum fieri poterat, sed ne tamen funis ille alter, quo dorsum erexeram, laxaretur. Quo quidem modo truncus erectus erat, cum collo & capite: non potuerant autem sic erigi, ut nihil declinarent. Itaque funiculis aliquot trunco alligatis, eos inde quoquoque ad parietes deduco, infixisque eis uncinulis alligo: eorumque funiculorum adductione truncum ab omni ambitus parte aequaliter retineo. Alligaveram autem, ut funes illos duos, quibus truncum & caput erexeram, sic hos etiam funiculos, trunci stabiliori parti, hoc est, spinae, quae fundamentum trunci est, quamque costae sequuntur. Alligaveram spinae parti superiori, quo facilius totam iis spinam regerem. Mox autem infra collum alligaveram, quod stabilis ea parte est: nam collo si alligassem, id, eo quod facillime obsequatur, eorum adductione separatim curvassem. Jamque ad eum modum firmato trunco, ad brachia accedere. Funiculum subjicere, alligareque compagi claviculae cum scapulae processu superiore, ubi inter se committuntur: eoque funiculo compagem illam, quantum res poscebat, attollere, totumque de lacunari suspendere brachium. Et transversariis funiculis, ne scapula aut in priorem, aut in posteriorem partem declinaret, efficere. Ac sic primum utroque in universum firmato brachio, funiculum inferiori parti radii dextri alligare, eoque totum brachium a trunco deducere. Alium deinde inferiori parti ossis humeri sinistri; eoque brachium illud attollere. Alium ulnae sinistrae; eoque cubitum moderari. Pedes deinde firmare sic. Dextrum in rectum extendere, truncoque supponere: ac deinde calcaneo (qui plane mensam, supra quam positus tripus erat, non attingebat) calcaneo igitur mensaeque assulam interferere, talis crassitudinis, ut firmaret pedem, isque veluti insisteret, neque tamen ex tripode coxa, pede sursum nimis acto, attolleretur. Reliquo deinde pedis extremi assulas subjicere crassitudine pares, quo totus aequaliter insisteret. Funiculum denique imo femoris alligare, eoque retro ad parietem ducto, genu firmare. Ad eundemque fere modum firmare & pedem sinistram: flexo aliquantum genu, sublata calce, leviterque pede extremo, ea parte, quae juxta pollicis radicem est, insistente. Ac sic primum in universum constituto sceletum, perficienda deinde positus ratio fuit. Et partim quidem coxas tum inclinando, tum erigendo; partim funiculos tum adducendo, tum remittendo, aliosque addendo; partim denique assulas, chartulas, panniculos, aliaque, quae ad manus erant, alibi subjiciendo, alibi interferendo, alibi apponendo, quae non est operae singillatim referre, correctae sunt, quaecunque satis non placebant. Adhibui deinde hominem statura simillimum, eumque macilentum: quo adstante nudo, statu eodem, contuli cum eo sceletum, maxime coxas, spinam, thoracem, scapulas cum claviculis; ut quibus recte constitutis, reliqua non essent habitura multum difficultatis. Correctisque, quo paullo ante dictum est modo, quae corrigenda videbantur, per aliquot deinde sceletum dies considerare, & tum adductione levi, tum remissione funiculorum, aliisque modis perparum mutando, experiri, possintne aliquid perfectionis adjici. Quod cum esset factum, iterum cum adstante homine eodem comparare, emendaturus, si quid nimis curae severitate a recto discessem.

Cum vero constitutus sceletus, ut volebam, esset, proxima cura fuit, recte imitari eum pictura. Vaga, & incerta futura erat res, neque responsura instituto, si tantummodo ad adspicendum, ut solent pictores, exsisteretur. Pieri enim non potuissent, quin aberrasset artifex, atque adeo neque qualem optabam, sceleti figuram effecisset, neque talem, de qua non solum sperare, sed etiam confidere possem, fundamentum idoneum futuram, cui muscoli inscriberentur. Demetrii autem, & universum ambitum, & uniuscujusque partis positum, magnitudinem, figuram, res erat infinita, & quae ne quidem effici sine certa quadam errare non patiente norma poterat. Facile quidem erat, visum dioptra quadam adstringere, constante ex quatuor regulis ligneis in figuram quadrangulam compositis, spatio intermedio non minore quam sceletus, totoque per chordas intentas in spatiola quadrata, omnia paria inter se, aequaliter diviso: qua recte ante sceletum posita, tabulaeque, cui figura sceleti inscriberetur, per lineas, haud secus, quam dioptrae spatium per chordas, divisa, artifex eo ex loco, unde ad imitandum conspiceretur sceletum per dioptram esset, per fixum aliquod foramen, nec id valde magnum, conspiceret: cui admovens oculum, videret, quibus dioptrae chordis, quae sceleti partes, & quomodo respondeant; easque, ut respondeant, iisdem tabulae lineis inscriberet. Sed erat, quod obstabat. Quo recte & commodo cernere unamquamque sceleti partem artifex posset, oportebat, ut nimis magno ex intervallo loci non conspiceret: volebam autem, ut ex intervallo conspiceret non multo minore, quam pedum, quos nostrates vocant rhenolandicos, quadraginta; ne multas partes ejus conspiceret nimis oblique. At ex intervallo illo conspectum oculi non satis ferebant ad parvas particulas cernendas. Ut itaque & prope sceletum, quantum ad cernendum requiratur, consistere posset, & tamen conspiceret partes ejus omnes, ut ex intervallo pedum quadraginta, obscuritate, quam intervallum illud afferret, excepta, hac adstrictus est ratione. Dioptram, qualem dixi, quamque majorem vocabo, collocavi recte ante sceletum, sic ut chordarum contextus maxime eminentem sceleti partem contingeret. Ante hanc, quatuor pedum dirimente chordarum contextus intervallo, collocavi alteram, nisi quod spatiola ejus minora essent, similem; minorem ob id appellabo; effeceram autem decima parte

minora; quemadmodum illud pedum quatuor intervallum decima quoque pars illius erat, unde conspiciendum volebam. Itaque simul dioptras illas collocavi, ut chordarum contextus & aequaliter distarent inter se, & ad perpendicularum essent directi, alterque alteri chordis responderet, centro constituto contra medium sinistrae partis pectoris sceleti. Quibus sic constitutis, artifex in quo volebat loco propiore sceletum, sibi ad cernendum commodo, consistens, operam dabat, ut punctum aliquod decussationis chordarum dioptrae minoris, plane incidere videret in punctum decussationis respondentium chordarum majoris: eamque sceleti partem, quam tunc recta pone puncta illa cernebat, inscribebat tabulae suae, puncto decussationis respondentium linearum ejus; quippe quam per lineas transversarias & rectas, perinde ac per chordas spatium dioptrae majoris, divideram. Eoque modo per puncta decussationis chordarum omnia, pone quae sceleti pars aliqua cernebatur, eundo, designatas eis partes sceleti inscripsit respondentibus decussationis linearum tabulae punctis. Potuitque deinde partes sceleti illas, quae inter certa illa puncta intermediae erant, in tabula continuare, sic ut ob parvitatem spatiorum extra mensuram non aberraret, non certe adeo, ut in censum venire id deberet. Hac igitur ratione (quae ut instituto satisfaciebat, sic molestiam artifici incredibilem exhibebat) exscriptus primum a priori parte sceletus est, ut stabat: exscriptus igitur cum vinculis commissuras constrictas tenentibus. Quibus deinde incisis, & reductis vinculis, quantum, ut commissurae ossium cerni possent, satis erat, artifex eas figurae adjecit. Post, resolutis funiculis sceletum retinentibus, praeter duos illos funes, quorum altero a superiore parte spinae, altero a capite ad lacunar conclavis deducto, in universum erectus tenebatur, conversus cum tripode suo, quo pars posterior exhiberetur. Constitutusque, & descriptus, ut ante. Vincula autem articulorum sic incidi, ut, quamvis jam a priori parte incisa essent, superesset tamen, quod dissolvi articulos non fineret, ne, quo minus eundem sceletum a latere reddendum proponere deinde possem, impediret. Absoluta posterioris partis figura, sceletus, latus ut exhiberet, conversus: eoque facto, rursus, ut antea, constitutus, descriptusque.

Interea autem, dum tres illae sceleti figurae efficiebantur, cum, quanta etiam cuncte diligentia adhiberetur, non minore, quam mensium prope trium continuorum spatio absolvi potuerint, providendum fuit, ne quid exsiccatio sceletum vitaret, ne quid putredo detrimenti importaret, neque nobis aut non ferendi incommodi, aut noxae quiddam eadem afferret. Modo igitur, cum esset, quod nimis ficcicaretur, humectare aqua, incisisque vinculis commissurarum aquam infundere, crustarum cartilaginearum conservandarum causa: modo, cum reprimenda putredo esset, aceto aspergere; per noctem chartis, panniculisque aceto permadidis obvolvere; acetum, quibus locis poterat, infundere. Accidit, ut, dum prima figura describebatur, sceletus, acri superveniente gelu, totus congelasceret; quo nihil, tum ad firmandum eum, tum ad impediendum, ne putresceret, poterat juvare magis: facileque, si figura illa ante absolvi, quam regelasceret, potuisset, resolutis funiculis, rigidum ex congelatione, secundae figurae conficiendae causa, convertissem. Sed, cum citius, quam optaveram, regelasceret, simul citius corrumpi, eoque plus negotii exhibere. Officere etiam focus, qui necessario struendus juxta fuit, eo tempore, quo nudus homo adstitit, ut qui adstare, nisi frigoris molestia aliquantum sedata fuisset, nec voluisset, nec potuisset.

Tribus autem illis figuris status quidem sceleti, omniumque ossium positus, ac totius syntaxis compositio, expressa accurate erant: sed figura ossium, speciesque, non nisi in universum. Impediverant autem vinculorum commissuras continentium reliquiae, aliaque, a quibus purgari ossa non facile potuerant. Neque omnino consultum fuisset, etiam si purgari perfecte planeque potuissent, tempus, cujus equidem multum impendendum fuisset, iis rebus terere, cum deinde, ossibus commodo meo purgatis, ex iis absolvi figurae, cum vellem, possent. Itaque dissoluto sceletum, proximus labor fuit, singula ossa accurate ita purgare, ne quid alicubi vitarentur. Cum purgaveram, usque eo tamen figuras sceleti ex iis absolvere distuli, quoad singulorum separatim figuras in aere juxta magnitudine incisas habui. Ideo autem distuli, ut, cum esset in animo, curare singulorum illas, earum confectioe artifex se praepararet. Eoque factum, ut anno demum tertio & trigesimo ad sceleti figuras redierim. Cum redii, primum curavi, ut ex juxta statura ad eam, qua his in tabulis sunt, redigerentur brevitatem. Artifex deinde, singulis ossibus eo positu, quo in figuris exstabant, consideratis, supplevit, quae in figuris deficiebant, emendavitque, quae minus laudabilia erant. Ac tunc ego in vulgandi consilio, quod inter principia curandarum illarum figurarum, si totae ad animum responderent, ceperam, confirmari: & cupere etiam, in aere eas incidi, quod sperare licebat, futurum, ut eo expolirentur magis. Incisae: ad ipsaque potissimum ossa; quo melius, & concinnius redderentur.

Exhibent erecto stantem corpore, habita simul pulchritudinis ratione. Status, positusque memborum, tales elegi, quibus & sceleti, & musculorum syntaxis in universum optime appareat, & si pergere velim, etiam viscera apparerent, & arteriae, venae, nervi, alia. Primae & secundae, quarum illa priorem, haec posteriorem partem exhibet, status idem. Respondetque altera alteri: quo fit, ut totius ambitus continuatio apparere ex iis possit. Addita figura tertia, lateris rationem exhibens plenius. Haec autem statu differt ab illis, ut ad latus exhibendum accommodatius visum est. Jam quod ad status rationem attinet, de ea animadvertenda sunt haec. Stat sceletus, quem figura prima & secunda exhibet, pede dextro firmiter, sinistro non nisi leviter insistente. Stat autem pes dexter calcaneo, praetereaque capitibus prioribus ossium metatarsi omnium: quorum capitum illo stat maxime, quod metatarsi pollicis est; intervenientibus tamen sesamoideis. Digtisque deorsum curvatis, terram veluti prehendit: eoque firmat se magis. Pes extremus extrorsum naturaliter versus, eo positu, quo statum maxime firmat. Dextrum genu rectum. Patella femori supra sinum illum affidet, cum quo, inter condylos medio, caeteroqui committitur: affidet, quemadmodum rectum genu cum obfirmatum, adducta a Recto Vastisque cum Cru-raeo. Crus super pedem extremum, flexo articulo tali cum calcaneo, extrorsum



## HISTORIA HUIUS OPERIS.

trorsum aliquantum inclinatum: quo fit, ut & recte pes extremus terrae innitatur, & calcaneus in eadem linea perpendiculari sit, in qua caput; ad status firmitatem. Ad quod juvat & femoris, quamvis modica, eandem in partem inclinatio; sic conveniente cum tibia femore, ut angulum cum ea, sed perquam patulum, efficiat, eumque in quam dixi partem patulum. Pes sinister, à dextro in latus simul & in priora aliquantum deductus, solo capite anteriore ossis metatarsi pollicis, intervenientibus sesamoideis, insistit; leviter autem. Genu sinistrum modice flexum: eoque patella sinui suo, inter condylos femoris medio, insidet. Itaque coxarum compagem pes dexter vertice suo sustinet solus. Cujus compagis obliquus positus est: demissiore parte sinistra, quia pes sinister à dextro, ut dictum est, deductus, & tamen ad terram usque demissus. Et quoniam pes sinister in anteriora aliquantum prolatus, in anteriora quoque pars compagis ejusdem sinistra ultra dextram aliquantum acta. Super illam compagem qui erectus truncus reliquus, dextrorsum recurvatus, quantum ad aequilibrium requiritur. Tota igitur in dextrum latus curvata est spina. Eadem & in sinistrum, praeterquam qua parte in collo est, aliquantum veluti torta, ut, cum coxarum compagis sinistra pars sit in priora ultra dextram acta, pectus tamen recta antrorsum dirigatur. Collum contra dextrorsum tortum, atlasque cum capite eodem conversus, quantum, ut facies aliquantum directa eo sit, necessarium est. Praeterea autem sic posita coxarum compages est, ut tota ora, qua pelvis à superiore parte terminata, oblique posita sit, & maxime quidem sursum directa, sed simul etiam insigniter in priora. Itaque os sacrum à lumbis se demittens, retrorsum aliquantum directum: à quo coccyx in priora tendit, eam se simul in partem curvans. Ab osse sacro surgentes lumbi, primum insigniter curvati, mox rectiores, retrorsum se modice inclinant, in posteriore partem cavi: eoque thoracem melius sustinent. Inde qua parte spina in dorso est, retrorsum se quoque inclinans, leviter à summo inflexa est, contra autem, quam lumbi: quo fit, ut thorax ad priora nimium non inclinet. A dorso se in priora collum erigit, modice reflexum, caput sic sustinens, ut facies in priora, quantum satis, promineat. Cum spina thorax in dextrum latus modice incurvatus. Ex quo costae dextrae adductiores inter se; superioribus aliquantum deorsum actis, inferioribus sursum. Contra diductae sinistrae; sursum actis superioribus, inferioribus deorsum. Itaque & externus thoracis ambitus per altitudinem in sinistro latere totus gibbus est: in dextro, infra medium modice cavus. Ex quo & dextri lateris costae inferiores, utpote magis erectae, quam sinistra, extremis suis prioribus distant à spina magis. Brachium dextrum fere pendet, permodice sublatum. Ex quo scapula recta, clavicula propemodum plane transversa. Modice autem retrorsum acta scapula, cum eaque, qua parte scapulam sustinet, clavicula: quo fit, ut pectus apertius sit. Brachium sinistrum altius sublatum: quo fit, ut clavicula, ea parte, cui scapulae processus superior innixus, simul cum eo furgat, scapulae aliquantum versa sit, sic ut angulus ejus inferior in latus sinistrum sit directus. Caeterum cubitus dexter rectus, rectusque, sicut ulna, radius: dextraque manus pendet aperta. Sinister autem cubitus aliquantum flexus: radiusque circum ulnam, quantum potest, conversus; cum eoque conversa manus. Haecenus de statu figurae primae & secundae.

In tertia tabula comparatus habitu veluti incedentis. Stat quoque pede dextro: sinistri extremo tantum pollice innitens in terram, ob id nonnihil sursum flexo, sicut in incedente, cum in eo est, ut pedem posteriorem in priora transferat. Et stat pes dexter calcaneo, capiteque priore ossis metatarsi pollicis, intervenientibus innitente sesamoideis: & his quidem maxime stat: praeterea autem capitibus prioribus ossium metatarsi digitorum parvorum. Rectum genu dextrum, ut figurae primae: similiterque, & eandem ob causam, patella sursum acta, sic ut inferiore tantum parte sui insideat sinui femoris inter condylos medio; superiore affideat femori, supra sinum illum. Genu sinistrum modice flexum: quam ob rem patella sinui femoris, qui inter condylos medius, superiore parte sui insidet: inde illam tibiae eminentiam versus mucrone suo directa, cui ligamentum, à mucrone illo procedens, affixum. Coxarum compages, aequae atque in figura prima & secunda, soli pedi dextro innixa: demissiorque pars sinistra. Quae supra hanc compagem spina, in dextrum latus aliquantum torta: ex quo thorax priore parte sua eodem aliquantum directus. Magis directa facies, cum quia collum magis tortum, tum maxime, quia atlas cum capite eo insigniter conversus. Caeterum sic coxarum posita compages, ut summa pelvis ora sursum simul & in priora, sicuti in primis figuris, directa sit. Cumque inferiore parte sacri in priora coccyx recurvatus. Jam & lumbi ab osse sacro primum insigniter curvati, mox rectiores, retrorsum modice inclinant, in posteriora cavi. Ab iisque quod spinae per dorsum pertinens est, retrorsum inclinat, leviterque à summo inflexum est, cavum in priora. Inde se collum in priora erigit, modice reflexum. Brachium sinistrum quia sublatum, scapula aliquantum conversa, sic ut pars superior aliquantum retrorsum directa sit, angulus inferior antrorsum. Dextrum autem quia pendet, & simul retrorsus actum est, sic fit, ut scapulae dextrae basis aliquantum à costis deducta sit; maxime angulo inferiore. Sed de positus ratione satis: quod enim tum in hac, tum in duabus primis figuris reliquum est, id ex iis ipsis haud difficulter cognoscitur. Articuli autem omnes pleniores sunt, & quam aptissimi: quippe crustae cartilagineae eorum non neglectae.

Post haec sequitur exponendum, qualem, quem exprimendum curarem, sceletum elegerim. Ex aetatibus elegi illam, qua ossa ad plenum incrementum suum, plenamque simul perfectionem pervenerint; hoc est, cum epiphyyses jam plane sint ossibus suis continuatae, quorum sunt portiones: neque enim ante, quam continuatae sunt, absoluta dici ossa possunt. Ex sexibus elegi virilem. Ex staturis justam, in qua simul ossium communis justas habeant symmetriarum rationes. Elegi, qui simul perfectior sit, nec, quod tum ad ipsa ossa, tum ad compositionem eorum attineat, vitiosi aliquid habeat. Cumque non aetate solum, & sexu, & statura, ossiumque perfectione,

sceleti differant inter se, sed roboris etiam notis & indiciiis, specieque praeterea tota, & habitu; elegi, qui & robur virile significet, & agilitatem: cujus partium omnium expressa sit species, neque tamen praeter modum; ut neque juvenilem foemineamve habeant hebetudinem & exilitatem, neque sint impolitae: quarum denique pulchrior sit species, & gravior. Juvabat quippe naturae exemplum ex natura optima sumere. Sed cum illi etiam sceleti, qui optimi haberi possunt, dissimiles sint inter se, & tamen unum tantum aliquem exhibere vellem, is, qui exhibitus, in exemplum caeterorum propositus à me est. Non possum autem non laudare fortunas meas, qui in corpus inciderim, quod cum promitteret, etiam contineret, qualem quaerebam sceletum. Neque tamen ita absolutus fuit, quin occurreret aliquid, quod minus laudabile esset. Ut igitur pictores, cum pulchram imitantur faciem, reddunt eam, si qua in ea menda sit, pictura, quo pulchrior efficiatur imago, emendatorem; sic, quae probari satis non poterant, emendata in figuris: & quidem, ut probatiora ostendebant exemplaria, sic emendata; adhibita cura, ne quid à vero discederetur. Ac sceleti haec figurarum ratio, & historia. Ex quibus facile, puto, intelligi potest, potuisse illo modo naturae rationem, quam minimum aberrando, exprimi: sed non posse sceletum aliquem, sicut hae figurae exhibent, oculis re ipsa proponi: non certe, ut equidem videtur, ita facile. Immo vero, quinam sit ille, qui, ossibus perfecte purgatis, atque adeo & vinculis, quibus ut conjuncta tenentur, sic plus minus obteguntur, detractis, servatis autem cartilagineis articularum crustis, sic compositum proponat, ut omni ex parte & vera sit, & concinna compositio?

Postea autem, quam figurae illae descriptae erant, plus accessit animi, ad musculos iis, postquam in aes incisae forent, inscribendos, periclitandumque, & amore operis, & rei anatomicae pro virili parte consulendi causa, si, quod animo conceperam, efficere re ipsa possem. Ad quod tamen deinde non accessi imparatus. Et sane, cum silva quaedam sit musculorum, cum toto corpore pertinens implicatio: cumque, si non sic obiter, sed plene, & accurate rimari omnes velis, multae identidem occurrant difficultates: cum multae, & magnae eorum in aliis aliisque sint diversitates: cum pauca corpora idonea sint naturam quaerenti optimam; conveniret autem, inter expingendum quam quidem minimum possit retardari: idcirco erat maxime necessarium, quicquid provideri poterat, providere. Itaque ex quo tempore prima sceleti schemata curavi, quotannis, cum auditorum gratia musculos persecutus sum, & quoties fuit praeterea occasio, annotare positum eorum, nexum, figuram, crassitudinem, partes. Et prout alia aliaque corpora ostendebant, aut confirmare, quae annotaveram, aut adjicere, quae discrepabant. Atque ita eundem in singulos annos orbem volvere. Et quoniam praestat, res ipsas, quam ex annotationibus cognoscere, oculis, cum usus est, subjicere; conservare etiam, quae conservari poterant, sic ut adjumento olim esse possent. Et praefertim quidem ossa, illaque, ad quae, praeterquam ad ossa, muscoli pertinent, cum adnexis extremis eorum, quibus aut oriri dicuntur, aut inferi, eaque ex optimis corporibus lecta, conservare in humore ad id idoneo, ne quid vitii, quod officere posset, contraherent: ad quae, quoties opus esset, recurrendi potestas foret. Cumque sparsas annotationes bene multas jam haberem, digerere eas, ut haberem omnia in promptu. Quo facto, componere ex iis Historiam musculorum, illis potissimum electis, quae frequentius inveneram, institutoque naturae maxime respondere existimabam. Et, quanquam nihil aliud, quam quod ipse naturae liber mihi obtulerit, inferere Historiae illi volebam, tamen è re fore putare, si adirem anatomicorum quoque libros, & non solum probatorum, sed etiam caeterorum, quos nancisci possem; ut admonerem, si quid dignum memoria, ab iis annotatum, praetermiserim. Nec deinde desii, corpori illi myologiae, quamvis edito, adjicere, quae corpora hominum fuggererunt.

Sic paratus, & consilio certiore, & spe minus dubia, ad musculos figuris sceleti inscribendos, anno aggredi octavo & trigésimo. Ad quod lineares sceleti adhibere conveniebat: nam illuminatae, quia umbrae obscurarent ea, quae inscriberentur, minus erant futurae idoneae. Hic vero vitium quoddam, in conficiendis tabulis sceleti à me animadversum, oportuit praecavere. Ut commode, recteque figuram super tabulam aeneam ex charta, depictam continente, scalptores transferant, primum chartae illius partem averfam pulvere cerussae respergunt, illiniuntque: eaque deinde eam parte tabulae aeneae scite imponunt, ad eamque, ut positus figurae requirit, aptant; firmannt denique. Post acum per figurae lineas ducentes, leviterque simul, & quantum satis est, tabulae imprimentes, efficiunt, ut, sublatà deinde charta, lineae illae inscriptae tabulae sint, impressa cerussa. Absolutà autem figurà, cum tabula excuditur, fit, ut, quae dextra sunt in tabula aenea, ea in figura, quae chartae per eam impressa est, sint sinistra: & perinde, quae sinistra sunt in illa, dextra sint in hac. Si igitur linearibus sceleti figuris, chartae per tabulas aeneas impressis, inscripta musculorum syntaxis fuisset, eaeque deinde syntaxis illius figurae à scalptore, quo dictum est modo, fuissent super tabulas aeneas incidenti causà translatae; non respondissent dextra sinistraeque syntaxis musculorum dextris sinistrisque sceleti. Quod quidem facile erat vitare, si, quo solent scalptores modo, primum linearis sceleti tabula excuderetur, eoque impressa chartae figura sceleti, quam archetypam vocabo, statim, ut impressa esset, imprimeretur chartae alii, ut sic haberetur in ea figurae illius, quod ad dextra sinistraque attineat, contraria: adhibereturque contraria illa (antitypam appellabo) ad musculos inscribendos: iisque inscriptis, effecta ex eo figura super tabulam aeneam transferretur, in eamque incideretur; ex quo impressa per tabulam illam figura, contraria futura esset antitypae sceleti, atque adeo, quod quaerebatur, respondens archetypae. Sed hic occurrebat, quod impedimentum afferebat. Ut bene excudantur tabulae, necesse est, ut maceratione praemollita charta sit, quae adhibetur. Cum vero sic praemollitae chartae, quarum alteri archetypa recens impressa, alteri antitypa imprimenda per archetypam illam est, simul prelo subjiun-



## HISTORIA HUIUS OPERIS.

tur, fit, ut translatione inter duos se mutuo versus circumactos cylindros, (quo nimirum preli genere ad excudendas tabulas utuntur) non solum premantur, sed simul etiam extendantur, eoque impressae figurae reddantur majores, & ita quidem, ut se ad justam, cum exsiccantur chartae, non contrahant mensuram. Itaque, si antitypas sceleti tales ad musculorum syntaxem inscribendam adhibuissim, figurae illae ejus fuissent figuris sceleti majores. Quod impedimentum ut praecaveretur, tum ad archetypas sceleti, tum ad antitypas excudendas, chartam siccam curavi adhibendam: ex quo male quidem, & imperfecte excusae erant, maximeque antitypae; at non sic tamen, quin proposito sufficerent. Antequam autem vitium illud antityparum, ad quas excudendas praemollitae adhibitae fuerant chartae, animadverteram, musculi antitypae tali sceleti secundi inscripti fuerant; eoque factum est, ut justam figurae lineares, quae posteriores ordines syntaxis musculorum exhibent, magnitudinem aliquantum excedant. Quod ferre poteram in iis, utpote ad figuras, quae lumine umbrisque distinctae sunt, intelligendas, simplicitate designationis, & notis inscriptis, tantummodo comparatas. Correxì autem in figuris illuminatis, antequam in aes inciderentur: nam post lineares illuminatae incisae omnes sunt, & quaeque lineares in tabulas aeneas, in quas incidendae, quarum sunt lineares, illuminatae erant, translatae sunt. Et hoc quidem correxì modo. Ad archetypas linearium illarum, quibus syntaxis musculorum ordines posteriores exhibiti sunt, excudendas, chartam curavi adhibendam siccam: ad antitypas autem, praemollitam. Ex quo, cui archetypa imprimebatur, ea charta, quia sicca erat, vi preli non extendebatur, atque adeo, cum primum antitypa impressa erat, magnitudo tum ejus, tum archetypae erat, quae figurae in tabulam aeneam incisae, qua impressa archetypa fuerat: quae autem antitypam continebat charta, ea, quia praemollita erat, se, cum exsiccabatur, contrahebat, simulque cum ea, quam continebat figuram. Itaque, saepe tentando, macerationem chartae, quae antitypis illis excudendis destinabatur, temperavi, ut tantum se, postquam excusae illae erant, exsiccatione charta contraheret, quantum requirebatur, ut figurae impressae justam adipiscerentur mensuram. Eoque quas correxeram antitypas modo, ad posteriores illos syntaxis musculorum ordines in tabulas aeneas, *figurarum illuminatarum incidendarum* causa, transferendos, adhibui. Quanquam tamen deinde cognovi, quod, cum tabulae jam absolutae excuduntur, ut in manus hominum dentur, vix possit praecaveri, quin, quamvis figurae in omnibus tabulis aeneis magnitudine sint pares, fere tamen sint in exemplaribus, quae excusa sunt, plus minus impares: prout enim charta, cui tabulae imprimuntur, per se laxior est, aut strictior, & prout magis minusve laxata est maceratione, ita se, cum exsiccat, magis minusve contrahit.

Ita autem ad illas, de quibus dixi, linearium sceleti antitypas relati musculi sunt, ut sceletum in corpore demortui apposti cernebantur, affixique. Membraque illa alia, ad quae musculi, pariter atque ad sceletum, pertinent; ut os hyoides, larynx, lingua, caetera; pari modo ad sceleti figuras relata sunt: ad eaque relati musculi. Simul autem adhibui Historiam musculorum, & adjectas ei, postquam edita fuit, annotationes; identidem quoque recurrens ad illa, quae de musculis mandasse me condita vetustati, supra memoravi. Nec tamen, nisi ex corporibus ipsis, quicquam sumtum. Et quibus rebus manifeste, & insigniter ab iis, quae frequentius animadverteram, discrepant, eae res ex corporibus suppletae sunt aliis. Quod cum ab initio, quamvis minus quidem expedite, tamen ex sententia procederet, ecce nova difficultas. Non poteram certe ex uno eodemque corpore musculorum plethorumque figuras consequi, nedum omnium: immo vero satis apparebat, aliquot fore impendendos annos, corporaque adhibenda multa. Jam vero referri quidem ex quibuscunque corporibus ad sceleti figuras musculi poterant: sed cum corpora alia aliis sint torosiora, neque sperandum esset, satis similia primo adipiscendi facultatem fore; difficile intellegebatur, quomodo secundum decentem aequalitatem, omniumque inter se competentiam, ex corporibus inter se torositate discrepantibus petiti, & congesti, modificarentur. Ad quod sceletus juvare solus non poterat. Itaque praeter eum, praeterea aliud aliquid, quod certum esset, rependum erat: ex sola enim opinione fingere, neque satis tutum erat, nec omnino placebat. Et quidem pro magnis crassisque musculis rependum praecipue erat: praesertim pro illis eorum, qui in trunco & collo, potissimumque, qui siti sunt in artubus. Opera igitur data est, ut exteriorem trunci, collique, & artuum à musculis effectum ambitum ex primo corpore consequeretur: intra quem deinde, simul & ad sceleti figuram ordinati sunt, qui ex aliis petendi fuerunt corporibus; quamvis tamen ad tales musculos corpora adhibuerim quam maxime similia. In exteriore deinde ordine describendo, quam positus rationem, qui ad eum pertinent musculi, in comparatione ad sceletum habeant, invenire, eo quod iis maximam partem contextus sceletus est, difficile fuit. Quamvis igitur cura magna adhibita fuerat, postea tamen, ut interiores ordines, sceletum in iis magis denudato, faciendum esse demonstrarunt, corrigendi exteriores fuerunt. Etenim ad musculos sceleti figuris accurate apponendos, separatim unusquisque eorum apponendus iis fuisset: quod si fecissem, facile non fuisset, in syntaxem eos componere. Ad syntaxem reddendam, ab exterioribus incipiendum erat: quod cum feci, difficile, ut dictum est, fuit, exteriores illos, quod sceletum fere totum contegunt, recte ei apponere: difficile etiam, apponere illos, qui magna parte sui subiecti sunt aliis. Utrique occursum difficultati, incipiendo ab ordine exteriore, ab eoque ad interiores interioresque progrediendo: ac post exteriores, ut interiores faciendum demonstrabant, corrigendo.

In musculis eruendis, & proponendis, opera data, ut ne quicquam vitarentur. Quod quo minus fieret, corporibus, ubi opus fuit, usus sum obaeulis, in quibus musculi à pingui sustinentur; cujus non plus detraxi, quam quantum detrahendum necessario erat, ut, quod exprimendum erat, ostenderetur: reliquo, ut sustineret, intacto. Multos per partes, & persequi

necesse fuit, & exscribere: maximeque eos, quorum, si totos denudare, & proponere aggressus essem, evitari depravatio, aut difficulter, aut nullo modo potuisset. Nec raro alia aliaque adminicula circumspicere necesse fuit. Ut figuram coracohyoidei, quae est quinta & trigesima tabulae undecimae, exhiberem, primum denudata pars ejus exterior, expressaque: deinde principii pars interior; ad quam proponendam, ab ea pingue subtiliter, nihilque vitando detraxi, relicto tamen, quod neque concidere principium illud sineret, neque impedimento esset. Diaphragmatis tum concava pars, tum gibba, ut in tabula quarta, & in quarta decima exstant, sub uno adpectu poni in corpore nequeunt. Nam ad concavam cernendam, removenda sunt, quae, quo minus cerni possit, impediunt, viscera abdominis: ad gibbam, aperiendus thorax. Cum vero, aut exentis thorax visceribus abdominis aperitur, aut aperto hoc, illa eximuntur, diaphragma laxatum, in vitiosam se figuram transfert. Itaque visceribus abdominis exentis, concavam primum proposui partem: eaque expressa, reposui viscera, ut sustinerent; apertoque thorace, gibbam partem figurae addidi; ad quam deinde absolvendam, corpus adhibui aliud, cujus thoracem primum aperui, abdomine integro, ejusque adeo visceribus diaphragma sustinentibus. Multa excogitanda fuerunt, ut sedes musculi, maximeque pharyngis, palati mollis, uvulae, faciei, recte exhiberentur. Ac sic effectum est, ut non pauca ad veritatem, ni fallar, exhibita sint, quorum alia difficulter, alia ne ullo quidem modo in corporibus ipsis ita plene cernas. Esset autem longum, quot quibusque modis in praecavenda omni depravatione usus sim, referre.

Corpora adhibita adutorum: eorumque, quae maxime erant idonea. Musculi autem, quales frequentius occurrerant, tales exhibiti. Potissimumque electi, quos absolutiores simul & laudatioris esse, licebat existimare. Erat autem infinitum, dissimilitudines illas, quibus, ut lineamentorum qualitate, corpora differunt, persequi. Et etiam si, praeteritis levioribus, non nisi insigniores, notabilioresque persequi voluissim varietates, non tamen facile finem reperissem. Nec vero conveniebat, multas universali huic musculorum iconographiae interfere, tametsi memorabiles, tametsi etiam frequentiores. Insertae nonnullae. Inserti, qui rarius occurrerunt, pauci; ut *psoas parvus*. *Insertus, qui perraro à me visus, vesicae musculus*. Et quanquam accurate omnes, pleneque, & subtiliter annisum sum rimari, talesque etiam reddendos curare; praeterea tamen leviora quaedam. Sic sunt, qui, tametsi in principio, extremum, tendinei quid habuerunt, tamen non habent in figuris. Neque indicatae fissurae quaedam, per quas arteriae, venaeque, & nervi penetrant minores: ejusque generis non indicata alia, quae partim quidem non ita magni momenti esse visa sunt, partim formam, ductumque generalem musculorum plus minus fuisse obscuratura; minus certe simplicitati illi, quam quaerebam, putavi convenire. Et convenit sane, ejusmodi in rebus, ubi ratio postulat, modum adhibere, & quoddam judicium. Situs, figura, magnitudo, origo, insertio, cohaesio, carnea tendineaque natura, generalis fibrarum ductus, ad quem referri decursus earum potest, in considerationem potissimum venerunt.

Duo autem tabularum genera sunt, quibus totam rem comprehendì. Alterum, quod per totum corpus pertinentem musculorum syntaxem continet: alterum, quod singulorum imagines. Syntaxis, perinde ut sceletus, à fronte, & à tergo, & à latere exhibita est. Perque ordines exhibita est: primo exteriore; post sequentibus interioribus, aliis post alios. Et subsequens quisque praecedentis cujusque continuatio est. Quoniam vero priora corporis, posterioraque, pleniora sunt; certe in universum: & collatis utrisque, quae sit laterum ratio, fere potest judicari; propterea ab iis partibus ordinum series exhibita. His tamen additus lateris ordo exterior, quo plenius, quam intelligi ex comparatione partis prioris cum posteriore potest, appareat: id quod positus musculorum postulare visus est. Primum autem illum putavi sufficere, quippe cum ex eo syntaxis ratio in universum satis cognoscatur; praesertim si simul conferantur ordines priores & posteriores, praetereaque etiam, ubi opus sit, singulorum figurae musculorum. Sed eorum, qui in collo, & sub capite siti sunt, quoniam neque in ordinibus prioribus, neque in posterioribus, neque omnino positi alio, melius poterant exhiberi, aliquot à latere exhibiti sunt ordines. Additi etiam ob eandem causam ordines in planta pedis, itemque in cavo osseo oculi sitorum. Caeterum, cum pro varietate status, positusque membrorum, proque varietate adpectus, syntaxis etiam alia se, aliaque specie offerat, eaque infinitae sint varietates; multiplicari quoque sine fine figurae possent. Elegi autem positum prae caeteris convenientem. Cumque nullus inveniatur, quo, quae minus plene appareat, pars non sit ulla; elegi, quo syntaxis in universum ut optime possit, ostendatur. Ac sic & ordines effici multo plures potuissent. Sed quia pauci illi, quos exhibeo, syntaxi in universum proponendae, ut equidem arbitror, sufficiunt, & si quae praeterea desiderantur, ea haud difficulter ordinum cum singulorum musculorum figuris suppeditabit comparatio; ideoque malui modum adhibere. Dataque etiam opera paucitati studui, ne multitudo obrueret. Fuitque res operosior, in paucos ordines totam referre cum ratione syntaxem, quam ordinum illa futura fuisset multiplicatio. Sed quoniam musculi in ordinibus illis toti comparere, praeter paucos, nequeunt, necessarium fuit, plenas singulorum figuras adjicere. Et si jam multiplicassem ordines, sic ut non inveniatur musculus, qui non in aliquo eorum totus nudus esset, tamen non tam recte omnes, certe non tam facile promteque cognosci ex iis potuissent, quam ex figuris cognoscuntur singulorum; in quibus nihil officit, nihil obscurat aliorum musculorum vicinitas. Adde quod syntaxis figurae non nimis magnae esse debuerint, quo sub uno adpectu poni, tractarique possent; atque adeo vix majores illis, quae his tabulis continentur: cum videri jam & ipsae possint modum excedere. Quae quidem magnitudo ad plerosque, etiam parvos musculos, satis, quod ad syntaxis rationem perspicendam sufficiat, exprimendos idonea fuit. Eademque satis quidem ad singulos plenius cognoscendos exprimi musculi potuissent



## HISTORIA HUIUS OPERIS.

potuissent majores, multique etiam parvorum: sed non pauci, aut ob parvitatem, aut ob compositionis rationem, non potuissent. Et luminis quoque, umbrarumque in syntacticis ratio, ea linearum simplicitate, quae indicando fibrarum ductui accommodatior est, quaque singulorum figurae redditae sunt, absolvi, perinde atque decussatis absoluta lineis est, non facile potuisset. Superfuit igitur, ut syntacticas figuras ad quam possem paucos ordines redigerem, in suoque genere perficerem: praeter eas autem singulos musculos exhiberem separatim.

In singulorum figuris, figuras, ubicunque potui, secutus sum syntacticas. Atque hoc propterea feci, ut ad syntacticas perspicendas juvare singulorum figurae possent, ex iisdemque intelligerentur, tum quae, ob alia vel adjacentia, vel incumbentia, in syntacticis minus plene sunt, aut plane non conspicua; tum quae minus exprimi in iisdem potuerunt. Adde quod hoc pacto omnia melius inter se cohaereant. Ubi autem ex syntacticis petitus positus non suffecit, adjeci, positu, qui convenit, expressos alio. Quidam, quorum in syntacticis minus idoneus est positus; nonnullique, qui in syntacticis nulla ex parte possunt comparere, tali positu, qui maxime convenit, exhibiti. Multiplicare autem praeterea figuras potuissim, si unumquemque omni ex parte voluissim exhibere: ab exteriori, interiori, lateralibus; ut usu venisset. Sed potius visum est adhibere iudicium quoddam, ab iisque duntaxat partibus eos exhibere, quibus instituto huius operis satisfiat. Jam vero duplo effectae majores singulorum sunt figurae, quam in syntaxem compositorum: quo nimirum aptiores essent, cum ad omnia, tum ad ea praecipue, quae parva sunt, plenius, magisque perspicue exprimenda. Et quanquam id magni musculi non postulabant, tamen, quo una omnium magnitudinis ratio esset, nihil ab ea in magnis placuit discedere. Sed qui vocantur auris internae, quoniam tam parvi sunt, magnitudine expressi sunt naturali. Omnesque figurae integrorum sunt, nisi quod, ut ad notabilia quaedam proponenda necesse fuit, truncatorum nonnullae adjectae sint. Compositionem autem, & quae, si interiora eorum perscrutaremur, sese offerrent, ea huic volumini, cuius satis jam crevit magnitudo, inferenda esse, non sum arbitratus.

Caeterum non solum accurationi figurarum studui, sed etiam perspicuitati, & pulchritudini. Itaque artificem adhibui hoc in genere excellentem, qua exprimendi, qua scalpendi arte. Qui & ipse, raro exemplo, earum rerum exprimendarum amore flagrabat: in eoque etiam identidem confirmatus est, quod de mercede, quam petiit, nihil unquam detraxi. Qui per multos antea annos paucis, praeter mihi, addixit operam suam: per hos postremos decem (quos quidem, praeter intercurrentia quaedam tempora, his in tabulis consumpsit) mihi fere soli. Meoque is omnia ductu & descripsit, & incidit. Operam primum identidem dedi, ut, quantum quidem posset, intelligeret id, quod reddendum erat: adfuique deinde, cum descripsit, de unaquaque re, quomodo describenda sit, praecipiens, juvenisque describentem, ac descripta emendans. Atque ita formandus à me, ducendusque, & plane regendus fuit, tanquam si ejus ministerio figuras ipse efficerem. Et post, cum incidit, multa etiam adhibenda cura fuit, ne quid imitando in aere figuras aberraret: nec raro consultandum, quo quaeque modo incidere conveniret. Ac cum vel sic praecaveri, ne aberraretur, nequiverit, recensui figuras, postquam in aes incisae erant; mendasque, quas animadverti, exculpsit, refinxitque ad veritatem. Praecipuaque cura fuit, omnia ex vero, & quantum posset, perspicue exprimere. Artifex praeterea studuit arti, tum in extremis rerum lineis, tum in lumine umbrisque, tum etiam in symmetriarum ratione, in ipsa denique rerum specie. Dignitati in lineis extremis. Distinctioni, ac vi, & gratiae, in lumine & umbris, simul & harmoniae decenti, ut & plene omnia ostenderentur, & simul tota, quamvis è multis in unum conjunctis partibus constans figura, nullibi, quantum quidem cuiusque ratio ferat, interrupta esset. In symmetriis, congruentiae cuidam, & aequalitati, qua inter se omnes partes consentirent. In specie rerum, distinctioni ac dissimilitudini ossis, carnis, tendinis, cartilaginis, caeterorum. In totis denique figuris, etiam lepori cuidam. Figuris autem syntacticis parerga adjecit, non solum ut occurreretur inanitati spatiosioris amplitudinis tabularum, & ut aspectus blandior esset; sed etiam, ut earum rerum, quae juxta expressae sunt, luminis & umbrarum temperamento, lumen & umbrae figurarum custodirentur, ipsaeque figurae melius eminent è tabulis, extraque eas esse viderentur; & cum è multis partibus constent, eoque veluti contractae sint, solidae tamen apparerent. Quod quidem artis est non mediocris, & cum in omnibus illis tabulis non ita facile fuit, tum in iis praecipue, quae sceletos continent. An vero praestitum ea in re aliquid sit,

optime cognoscet, qui tabulas è justo intervallo conspiciet, manu oculo ita admota, ut ne quid luminis circumfusi vis aciei officiat. Neque facile, spero, cuiquam, ad manum, & non plane oscitanter intuenti, quo secius ea, quae figuris ipsis reddita sunt, promte internoscant, impedimentum parerga illa afferent.

Quibus laudibus artis ne plurimum decederet, abstinendum fuit à notis inscribendis, quibus quaeque res designentur in explanatione. Quae praeterquam quod figuras veluti commaculassent, multas etiam res obscurassent, & non paucas plane delevisent, cum multae tam parvae sint res, ut aut totas, aut prope totas, notae illae implevisent. Ipsaeque quae in umbris ponendae fuissent notae, pleraeque difficilius, non paucae vix ullo modo cerni potuissent. Quibus remedium inventum est additis figuris linearibus, inscriptisque eis notis illis. Ex quo & hoc commodi, ut in linearibus rerum omnium ambitus, terminique, promte, & aperte noscantur; eoque, si quid in illuminatis aut parvitas, aut inevitabilis umbrarum sculpturaeve ratio afferat dubii, id tollant lineares. At singulorum musculorum figuris ipsis inscriptae notae illae sunt: quippe cum fere singulos exhibeant separatim, eosque majores, ipsaeque uno linearum tractu scalptae sint; & inscribi notae facile potuerunt, & cerni inscriptae possunt, inveniri. Neque adeo officiant figuris illis, ut quibus tot artis adminicula adjungere necesse visum non est. Quin & ossa, aliaque, quae cum musculis, quo cognoscatur, quibus appositi sint, adnexique, exhibita sunt, non nisi extremis indicata sunt lineis, non solum quia proposito id sufficit, sed quod ea ratione musculorum ambitus terminique appareant apertius. Nec tamen musculi ipsi in figuris illis, tum quod ad terminos, quibus circumscripti sunt, attinet, tum quod ad lumen & umbras, tum quod ad carnea tendineaeque naturae distinctionem, arte effecti sunt minore. Inest & alius, quam in syntacticis, sculpturae modus, aliaque simul commendatio, quod uno linearum tractu, non superadditis decussantibus, expressae sunt. Qua simplicitate ad ductum fibrarum purius designandum uti placuit. Is vero tantummodo in universum designatus est. Neque visum est faciendum, ut fibras, habitumque compositionis earum exequeretur subtiliter. Praeterquam enim quod veri quadam tantum specie reddi hoc potuisset, praeterea summam decursus fibrarum rationem in universali hac iconographia quaerendam potius esse, existimavi.

Ad notas autem incidendas sculptorem assumpsi peritum, qui id cum iudicio sciret facere, sic ut iis accurate, quoad fieri posset, inscriberentur locis, quibus deberent, iisque rebus, quibus inscribendae essent, & magnitudine, & plenitudine responderent; quo & accurate designarent eas, & conspicuae essent ipsae, neque tamen officerent, parvasque praesertim res non nimis obscurarent. Curavique deinde, ut tabulae quam possint optime excuderentur: quod quanti momenti sit, non tantum ad puritatis elegantiam, sed etiam ad artis vim, gratiamque exhibendas, non ignorant artis gnari. Itaque & chartam adhibui maxime idoneam, in qua plurimum situm est: & excusorem intelligentem, & exercitatum. Quod vero ad explanationes attinet, breves, indicis in modum, putavi sufficere: quarum tamen aliquanto pleniores sunt, quae pertinent ad figuras singulorum. Caetera Historia musculorum dabit.


Haec sunt, quae de ratione huius operis putavi dicenda. Quanquam tamen eam, & cuiusnam res molis fuerit, is optime omnium, qui in eandem palaestram descenderit, perspiciet, discetque. Videri autem possit, singillatim differendum fuisse de illis, quae praeter ea, quae ab eximiis illis, laudatissime hominibus, ante me prolata sunt, omni me hoc conatu, illoque & labore, sumtuque (qui quidem certe opinione majores infumti) consecutum esse, promitti posse putem. Sed sane quod ad commodum eorum, qui haec studia amant, coluntque, attinet, satis equidem, si, quae de ratione operis rettuli, expenderint, quid praestitisse velim, intelligent. Quod si cui volupe fuerit scire, quid, praeterquam quod ad normam illam, quam dixi, directa omnia sint, à superiorum anatomicorum figuris, atque scriptis, rebus ipsis discrepem, quidque aut emendatum sit, aut adjectum, quandoquidem, si comparaverit, cognoscet, praeterire id me posse putavi. Utcunque sit, poterit fortasse, quae impendenda à me esset opera, quae profecto, in illa rerum copia, multa esset, melius collocari. Si qui autem erunt, qui existiment, supervacuam, eo quod in usu necessaria non sit, esse illam, quae praeterea tanta contentione quaesita sit, accurationem, & perfectionem: hi velim considerent, quid praeter utilitatem necessariam, magnitudo mereatur rei, & dignitas. Nec dubito futurum, ut minus mirentur, quod has tabulas hoc laudabiliores fore existimaverim, quo non solum veriores, sed etiam meliores, sed absolutiores fuerint.

Lugduni Batavorum, CIOCCCXLVIII.





TAB. I.









# TABULAE ANATOMICAE PRIMAE SCELETI HOMINIS EXPLANATIO.

**P**Rima haec Tabula continet figuram Sceleti hominis à priori maxime parte. Addi tum ligamenta quaedam, tum cartilagines, sine quibus syntaxis haec ossium interrupta esset.

In capi-  
te, & ipi-  
na.

A Os frontis.  
B. B Foramina superciliorum; quorum finistrum integrum est, dextrum ex parte deficit.  
C D Sutura coronalis. C pars ejus, quae futura vera: D pars, quae squamosa.  
E Os verticis finistrum.  
F Sutura squamosa, quae fit ex conjunctione ossis verticis cum squamoso.  
G Sutura squamosa, quae fit ex conjunctione ossis verticis cum processu laterali maximo ossis multiformis.  
H Sutura squamosa, quae fit ex conjunctione ossis frontis cum processu laterali maximo multiformis.  
I Processus lateralis maximus ossis multiformis.  
K Sutura communis ossi squamoso cum processu laterali maximo multiformis.  
L Ossis temporis pars squamosa.  
M Offeus auris introitus.  
N Processus mammillaris ossis temporis.  
O Processus zygomaticus ossis temporis.  
P Sutura communis ossi jugali cum processu zygomatico ossis temporis.  
Q. Q Offa jugalia.  
R. R Suturae communes ossi frontis cum jugalibus, juxta caudas superciliorum.  
S. S Suturae, quae in malis fiunt ex conjunctione ossium jugalium cum maxillaribus superioribus.  
T. T Ossium jugalium partes ad foramina oculorum pertinentes.  
Inter T & W Sutura quae in foramine oculi fit è conjunctione ossis jugalis cum maxillari superiore.  
Inter T & c: T & c Suturae communes ossibus jugalibus cum offe frontis in foraminibus oculorum.  
Inter T & Y: T & Y Suturae communes ossibus jugalibus cum processibus lateralibus maximis multiformis.  
V. V Fissurae in fundis foraminum oculorum.  
W X Ossis maxillaris superioris pars ad fundum foraminis oculi pertinens.  
Inter W & X Sutura decurrens secundum canalem, qui per fundum foraminis oculi porrectus. Quae futura etiam oram foraminis illius circumit, pertinetque ad exitum canalis supradicti, qui exitus est infra oram illam in gena.  
Inter X & d Sutura communis ossi maxillari superiori cum plano.  
Inter X & e Sutura communis ossi maxillari superiori cum offe unguis.  
Y. Y Processuum lateralium maximorum multiformis partes, quae pertinent ad foramina oculorum.  
Inter Y & c: Y & c Suturae communes processibus lateralibus maximis multiformis cum offe frontis in foraminibus oculorum.  
Z Foramen, quo è calvariae cavo exeunt, foramenque oculi intrant tertius nervus cerebri, quartus, sextus, primus ramus quinti, &c.  
a Processus tenuis ossis multiformis.  
b Foramen, quo è calvariae cavo exit, oculique foramen intrat nervus opticus una cum ramo arteriae carotidis internae.  
Inter a & c Sutura communis processui tenui multiformis cum offe frontis in foramine oculi.  
Inter a & d Sutura communis processui tenui multiformis cum offe plano in foramine oculi.  
c. c Ossis frontis partes ad foramina oculorum pertinentes.  
Inter c & d Sutura communis ossi frontis cum plano.  
Inter c & e f Sutura communis ossi frontis cum offe unguis.  
d Os planum.  
Inter d & e Sutura communis ossi plano cum offe unguis.  
e f Os unguis. f sinus ad canalem nasalem pertinens.  
Inter f & g Sutura communis ossi unguis cum processu nasali ossis maxillaris superioris.  
g. g Processus nasales ossium maxillarium superiorum.  
Inter g & k: g & k Suturae communes processibus nasalibus ossium maxillarium superiorum cum ossibus nasi.  
h Sutura communis processui nasali ossis maxillaris superioris cum offe frontis.  
i. i Suturae communes ossibus nasi cum offe frontis.  
k. k Offa nasi.  
Inter k & k Sutura communis ossibus nasi.  
l Pars interior processus nasalis ossis maxillaris superioris, ad nasum pertinens.  
m. m Offa spongiosa inferiora.  
Inter l & m dextri lateris, futura, quae fit ex conjunctione ossis spongiosi inferioris cum maxillari superiore.  
n o Lamina ossis cribriformis, quae pertinet ad septum narium. o extremitas ejus, cui continuatur cartilaginea pars septi.  
p Vomer.

Inter n & p Suturae species, facta ex connexionione vomeris cum lamina ossis cribriformis.  
q Ossis maxillaris superioris pars, quae ad inferiora narium pertinet.  
r Sutura ossibus maxillaribus superioribus communis.  
s. s Offa maxillaria superiora, qua in malis sunt.  
t. t Foramina, quae sunt exitus canalium, qui per fundum foraminum oculorum deducuntur.  
u Processus aliformis ossis multiformis.  
w x y z Maxilla inferior. x foramen, quo exit nervus cum vasis è canali maxillae. y processus coronoideus. z collum, in cujus summo capitulum, quo maxilla cum offe temporis committitur.  
α Lamella cartilaginea, interjecta articulo maxillae cum offe temporis.  
β. γ. δ. ε. ζ. η. θ. ι. β. γ. δ. ε. ζ. η. θ. ι. Dentes finistri in utraque maxilla. β. β incisores primi. γ. γ incisores secundi. δ. δ canini. ε. ε molares primi, ζ. ζ secundi, η. η tertii, θ. θ quarti, ι. ι quinti. Ex iis dextri, qui respondent, intelliguntur.  
x Corpus atlantis, qua parte in epistrophaeo innixum, & caput sustinet.  
λ Corpus epistrophaei, qua parte atlantem sustinet.  
μ Processus obliquus inferior vertebrae colli quintae.  
ν ξ ο π Quarta colli vertebra. ν processus obliquus superior. ξ processus obliquus inferior. ο processus transversus. π corpus.  
ς Foramen inter quartam & tertiam.  
σ. σ &c. Ligamenta, quae inter corpora vertebrarum intercedunt, aliaque aliis alligant.  
τ υ φ φ χ Tertia colli vertebra. τ corpus. υ. υ processus transversi. φ. φ obliqui superiores. χ obliqui inferior.  
ψ ψ ω ω Γ Secunda colli vertebra. ψ. ψ processus obliqui superiores. ω. ω transversi. Γ corpus.  
Δ Δ Θ Θ Λ Λ Ε Prima colli vertebra. Δ. Δ processus obliqui superiores. Θ. Θ transversi. Λ. Λ obliqui inferiores. Ε corpus.  
Π Π Σ Φ Φ Ψ Duodecima dorsi vertebra. Π, Π processus obliqui superiores. Σ transversus. Φ. Φ obliqui inferiores. Ψ corpus.  
Ω α α β β Undecima vertebra dorsi. Ω corpus. α. α processus obliqui superiores. β. β transversi.  
c Processus transversus sextae dorsi.  
d d e e Tertia vertebra dorsi. d d corpus. e. e processus transversi.  
f g g Secunda vertebra dorsi. f corpus. g. g processus transversi.  
h Primae vertebrae dorsi corpus.  
i k k Quinta lumborum. i corpus. k. k processus transversi.  
l m m n Quarta lumborum. l corpus. m. m processus transversi. n obliquus superior.  
o p p Tertia lumborum. o corpus. p. p processus transversi.  
q q r r s Secunda lumborum. q. q processus obliqui superiores. r. r transversi. s corpus.  
t t u u v v w Prima lumborum. t. t processus obliqui superiores. u. u transversi. v. v obliqui inferiores. w corpus.  
x xy y z z z z z A A A A Os sacrum. x. x processus obliqui superiores primae ejus vertebrae. y. y latera sacri. z. z. z: z. z. z foraminum anteriorum tria prima ab utroque latere. A. A. A. A corpora quatuor superiora: inter quae lineae osseae, quae fuerant olim ligamenta.  
B Coccygis ossiculum quartum.  
C D E F Sternum. C os superius. D medium. E inferius, sive cartilagineis mucronatae. F cartilago mucronata.  
G. H Ligamenta, quibus ossa sterni inter se colligata. G quo os medium cum inferiore, H quo medium cum superiore.  
I K L M. I K L M Costae primae. K capitulum, quo commissa cum processu transverso vertebrae duodecimae dorsi. L pars prima, qua commissa cum corpore ejusdem duodecimae. M extremum cartilagineum, quo continuata sterno.  
N N O P. N N O P Costae secundae. O pars prima, qua committit se cum corporibus undecimae & duodecimae vertebrarum dorsi. P extremum cartilagineum.  
Q Q Q R. Q Q Q R Costae teriae. R extremum cartilagineum.  
S S S T. S S S T Costae quartae. T extremum cartilagineum.  
V V V V W X. V V V V W Costae quintae. W extremum cartilagineum, X hac parte latefcens, alligatumque cartilagini, ad quam pertinet, costae septimae.  
Y Y Y Y Z Γ. Y Y Y Y Z Γ Costae sextae. Z extremum cartilagineum, Γ latefcens hac parte, & alligatum costae septimae cartilagini, ad quam pertinet.

In spina,  
thorace,  
clavicu-  
lis, sca-  
pulis, hu-  
meris.



# TABULAE Sceleti primae explanatio.


$\Delta \Delta \Delta \Theta \Lambda$ .  $\Delta \Delta \Delta \Theta \Lambda$  Costae septimae.  $\Theta$  extremum cartilagineum,  $\Lambda$  quod hac parte latefcit & alligatur cartilagini costae octavae.  
 $\Xi \Xi \Xi \Pi \Sigma$ .  $\Xi \Xi \Xi \Pi$  Costae octavae.  $\Pi$  extremum cartilagineum,  $\Sigma$  hac parte in aliquibus latefcens, pertinenſque ad cartilaginem costae septimae, eidemque alligatum.  
 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Psi$ .  $\Phi \Phi \Phi \Psi$  Costae nonae.  $\Psi$  extremum cartilagineum.  
 $\Omega \Omega \Omega \Omega \Omega \alpha$ .  $\Omega \Omega \Omega \Omega \Omega \alpha$  Costae decimae.  $\alpha$  extremum cartilagineum.  
 $\beta \beta \beta \beta \gamma$ .  $\beta \beta \beta \beta \gamma$  Costae undecimae.  $\gamma$  extremum cartilagineum.  
 $\delta \epsilon$ .  $\delta \epsilon$  Costae duodecimae.  $\epsilon$  extremum cartilagineum.  
 $\zeta \eta$ .  $\zeta \eta$  Claviculae.  $\eta$  caput ſterno innixum.  $\iota$  caput ad ſcapulae proceſſum ſuperiorem pertinens.  
 $\theta$ .  $\theta$  Cartilagineſ interjeſtae articulis clavicularum cum ſterno.  
 $\kappa$ .  $\kappa$  Cartilagineſ interjeſtae articulis clavicularum cum proceſſibus ſuperioribus ſcapularum.  
 $\lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \mu \nu \xi \omicron \pi$ .  $\lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \mu \nu \xi \omicron \pi$  Scapulae.  $\mu$  ſpina.  $\nu$  proceſſus coracoideus.  $\xi$  proceſſus ſuperior.  $\omicron$  cervix.  $\pi$  cartilaginea cruſta, qua cervix augetur.  
 $\rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega \alpha \beta$ .  $\rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega \alpha \beta$  Offa humerorum.  $\rho$  caput laevi cartilagine cruſtatum.  $\sigma$  tuber inaequabile majus capitis ſuperioris.  $\tau$  tuber inaequabile minus ejuſdem. Inter haec tubera ſinus, per quem delabitur tendo capitis longioris Bicipitis brachii.  $\phi$  ſinus, qui recipit caput ſuperius radii, quo tempore cubitus flexus, quantum poteſt.  $\chi$  ſinus, qui recipit poceſſum ulnae, quo tempore cubitus quantum poteſt flexus.  $\psi$  Rotula laevi cartilagine cruſtata; qua rotula committitur cum ulna.  $\omega$  tuber laevi cartilagine cruſtatum, quo committitur cum radio.  $\alpha$  condylus minor.  $\beta$  major.  
 $c d e f g$ .  $c d e f g$  Ulnae.  $d$  caput ſuperius, in eoque ſuperficies inaequabilis, cui ſe Brachialis internus inferit.  $e f$  capitulum, quo radium ſuſtinet; in eoque  $f$  ambitus laevi cartilagine cruſtatus.  $g$  proceſſus ſtyloides.  
 $h i n o p q$ .  $h k l m$  Radii.  $i$  capitulum ſuperius.  $k$  ambitus capituli ſuperioris, laevi cartilagine cruſtatus.  $l$  capitulum, ad cujus partem poſteriorem Bicipitis brachii tendo deſinit, ad priorem inſeſcitur cum manus in primum vertitur.  $m$ .  $n o p q$  capita inferiora.  $n$  ſinus, per quem delabuntur tendines Abductoris longi pollicis & Extenſoris minoris.  $o$  ſinus, per quem tendo Radialis externi longioris.  $p$  ſinus, per quem tendo Radialis externi brevioris.  $q$  ſinus, per quem tendo Extenſoris majoris pollicis.  
 $r s t$ .  $r s$  Offa navicularia carporum.  $s$  tuber, quo cum radio committitur, laevi cartilagine cruſtatum.  $t$  tuber, quo cum multangulis committitur, laevi cartilagine cruſtatum.  
 $u w$ .  $u$  Offa lunata.  $w$  tuber laevi cartilagine cruſtatum, quo cum radio committitur.  
 $x$ .  $x$  Offa triquetra. In dextro cruſta laevis cartilaginea, qua cum lunato & cum cubito committitur.  
 $y$  Os ſubrotundum.  
 $z A A B$ .  $z A$  Offa cuneiformia carporum.  $A A$  pars laevi cartilagine cruſtata, qua committitur cum triquetra & lunato.  $B$  proceſſus unciformis.  
 $C D$ .  $C D$  Offa capitata.  $D$  caput laevi cartilagine cruſtatum, quo committitur cum lunato & naviculari.  
 $E$ .  $E$  Offa multangula minora.  
 $F$ .  $F$  Offa multangula majora.  
 $G H$ .  $G H$  Offa metacarpi pollicum.  $H$  caput inferius laevi cartilagine cruſtatum, qua parte committitur cum offe primo pollicis, & cum ſefamoideis.  
 $I K$ .  $I K$  Offa ſefamoidea appoſita ad articulum pollicis cum metacarpo ſuo.  
 $L M$ .  $L M$  Offa prima pollicum.  $M$  caput inferius cartilagine laevi cruſtatum, qua parte committitur cum offe ultimo.  
 $N$  ſefamoideum, appoſitum ad articulum pollicis offis primi cum ultimo.  
 $O$ .  $O$  Offa ultima pollicum.  
 $P Q R S T$ .  $P Q R S T$  Metacarpi manuum.  $P$  os metacarpi indicis,  $Q$  medii,  $R$  annularis,  $S$  auricularis.  $T$  caput inferius, quo cum digito

committitur, laevi cartilagine cruſtatum: eodemque modo in reliquis.  
 $V W$  Officula ſefamoidea, in aliquibus inventa.  
 $X Y Z \Gamma \Delta$ .  $X Y Y Z Z \Gamma \Delta$  Offa primi ordinis digitorum manuum.  $X$  indicis,  $Y$  medii,  $Z$  annularis,  $\Gamma$  auricularis.  $\Delta$  caput inferius, quo cum offe ſecundi ordinis committitur, cruſta cartilaginea laevi opertum: quemadmodum in reliquis quoque digitis.  
 $\Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma$ .  $\Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma$  Offa ſecundi ordinis digitorum manuum.  $\Theta$  indicis,  $\Lambda$  medii,  $\Xi$  annularis,  $\Pi$  auricularis.  $\Sigma$  caput inferius, quo cum offe tertii ordinis commiſſum, laevi cartilagine cruſtatum: ſic & in reliquis digitis.  
 $\Phi \Psi \Omega \alpha$ .  $\Phi \Psi \Omega \alpha$  Offa tertii ordinis digitorum manuum.  $\Phi$  indicis,  $\Psi$  medii,  $\Omega$  annularis,  $\alpha$  auricularis.  
 $\beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu$ .  $\beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu$  Offa coxarum.  $\beta \gamma \delta$  <sup>In coxis & pedibus.</sup>  $\epsilon \zeta$  ilium.  $\gamma$  criſta offis ilium.  $\delta$  tuberculum, à quo oritur Rectus cruris.  $\epsilon \zeta$  iſchion.  $\zeta$  ſinus, per quem delabitur Iliacus internus cum Pſoa magno.  $\eta$  acutus proceſſus iſchii.  $\theta$  tuber iſchii.  $\iota \kappa \lambda$  os pubis.  $\mu$  ſpina offis pubis, à qua oritur Peſtineus.  $\lambda$  tuberculum, cui inſeritur tendo inferior idemque exterior illorum, in quos ſe findit aponeuroſis Obliqui externi abdominis.  $\mu$  foramen magnum.  
 $\nu$  Cartilago pubis offibus interjeſta, eaque connectens inter ſe.  
 $\xi \omicron \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi$ .  $\xi \omicron \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \chi \psi \psi$  Offa femorum.  $\xi$  caput laevi cartilagine cruſtatum.  $\omicron$  collum.  $\pi$  trochanter major.  $\rho$  eminentia inaequabilis, cui affixum ligamentum, quod articulum coxae continet.  $\sigma$  trochanter minor.  $\upsilon$  condylus exterior,  $\phi$  interior.  $\chi$  ſinus laevi cartilagine cruſtatus, ad articulum patellae pertinens.  $\psi$  huc uſque pertinens cruſta cartilaginea laevis, quae condylos, qua cum tibia committuntur, operit.  
 $\omega$ .  $\omega$  Patellae.  
 $a b$ .  $a b$  Cartilagineſ ſemilunares interiores articularum genuum.  $b$ .  $b$  ad poſtremum in ligamenta vertuntur, iſque inſertae tibiis.  
 $c d$ .  $c d$  Cartilagineſ ſemilunares exteriores,  $d$ .  $d$  ad poſtremum in ligamenta verſae, quae tibiis inſertae.  
 $e f g h i k l$ .  $e f g h i k l$  Tibiae.  $e$  caput ſuperius.  $f g$  cruſtae cartilagineae laeves, operientes verticem tibiae, quibus is partibus ad genu articulum pertinens eſt.  $h$  tuberculum, cui affixum ligamentum à patella procedens, eamque tibiae alligans.  $i$  ſpina.  $k l$  caput inferius.  $l$  malleolus internus.  
 $m n o$ .  $m n o$  Fibulae.  $m$  caput ſuperius.  $n$  ſpina.  $o$  caput inferius, quod eſt malleolus externus.  
 $p q r$ .  $p q r$  Tali.  $q$  cruſta cartilaginea laevis, qua inteſtum tuber ejus, quo cum crure committitur.  $r$  cruſta ſimilis, qua tectum caput ejus.  
 $s t$ .  $s t$  Calcanei.  $t$  pars, quae cervicem tali ſuſtinet.  
 $u$ .  $u$  Offa navicularia tarſorum.  
 $v$ .  $v$  Offa cuneiformia majora tarſorum.  
 $w$ .  $w$  Offa cuneiformia minora tarſorum.  
 $x$ .  $x$  Offa cuneiformia media tarſorum.  
 $y$  Os cubiforme.  
 $z A B C D E$ .  $z A B C D E$  Metatarſorum offa.  $z$  digiti quarti parvorum,  $A$  tertii,  $B$  ſecundi,  $C$  primi,  $D$  pollicis.  $E$  cruſta cartilaginea laevis, qua inteſtum caput cum primo offe pollicis commiſſum: cui ſimiles in reliquis digitis.  
 $F G$ .  $F G$  Offa ſefamoidea, quae appoſita ad articulos pollicum cum ſuis metatarſi offibus.  
 $H$ .  $H$  Offa prima pollicum.  
 $I$ .  $I$  Offa ultima pollicum.  
 $K L M N$ .  $K L M N$  Offa primi ordinis digitorum parvorum.  $K$  primi,  $L$  ſecundi,  $M$  tertii,  $N$  quarti.  
 $O P Q R$ .  $O P Q R$  Offa ſecundi ordinis digitorum parvorum.  $O$  primi,  $P$  ſecundi,  $Q$  tertii,  $R$  quarti.  
 $S T V W$ .  $S T V W$  Offa tertii ordinis digitorum parvorum.  $S$  primi,  $T$  ſecundi,  $V$  tertii,  $W$  quarti.






TAB. II.









# TABULAE ANATOMICAE SECUNDAE SCELETI HOMINIS EXPLANATIO.



DEM Sceletus ab averfa parte expreffus, ftatu eodem. Pariterque, ut continua  
effet syntaxis, addidi ligamenta quaedam & cartilagine, quibus in locis neceffa-  
rium fuit.

In capi-  
te & fpina.

a. a Offa verticis.  
b. b Foramina verticalia.  
c Sutura fagittalis.  
d d Sutura lambdiformis.  
e Os occipitis.  
f Sutura fquamofa, facta ex conjunctione offis fquamofi cum offe verticis.  
g. g Suturae verae, factae ex conjunctione offium mammiliarium cum offi-  
bus verticis.  
h Os fquamofum.  
i i. i i Suturae lambdiformis additamenta.  
k. k Foramina per quae rami venarum jugularium internarum penetrant ad  
finus laterales durae meningis.  
l. l Processus mammillares offium temporum.  
m Os frontis.  
n Sutura, facta e conjunctione offis jugalis cum offe frontis juxta caudam  
supercilii.  
o Sutura, facta e conjunctione processus zygomatici offis temporis cum offe  
jugali.  
p p Os jugale.  
q Processus zygomaticus offis temporis.  
r Os maxillare superius.  
Inter r & proximam p, futura, quae fit ex conjunctione offis jugalis cum  
maxillari superiore.  
s Lamella cartilaginea, interjecta articulo maxillae inferioris cum offe temporis.  
t u u u u Maxilla inferior. t capitulum, quo committitur cum offe temporis.  
w. w Offa maxillaria superiora, quibus partibus ad palatum pertinent.  
In maxillis dentes apparent per fe.  
x. x Processus ftyliformes offium temporum.  
y y z A B C D D E Atlas. y. y processus transversi. z foramen processus  
transversi. A Arcus, qui in quibusdam invenitur : is cum finu, per quem  
arteria vertebralis pone atlantis corpus fe flectit, efficit foramen B, per  
quod arteria illa penetrat in specum vertebrarum, ut alias per finum, qua-  
lis C in parte finiftra. C finus in poftica parte corporis atlantis, qua cor-  
pus illud caput fuffinet ; per quem finum fe flectit arteria vertebrales, in  
specum vertebrarum penetratura. D. D partes inferiores corporis, quibus  
epiftrophaeo innixus. E eminentia afperula, quae fpinae loco eft, & a  
qua oriuntur Recti capitis poftici minores.  
F G H H I I K K L Epiftrophaeus. F axis. G pars corporis interior.  
H. H duo corporis vertices, quibus atlantem fuffinet. I. I processus  
transversi. K. K processus obliqui inferiores. L fpina.  
M. N Vertebrae colli, M quinta, N quarta.  
O P P Q Q R R Vertebra colli tertia. O fpina. P. P processus obliqui fu-  
periores. Q. Q processus obliqui inferiores. R. R processus transversi.  
Ex hac reliquarum colli partes intelligi quoque poterunt.  
S. T Vertebrae colli, S fecunda, T prima.  
V. W. X. Y Dorfi vertebrae, V duodecima, W undecima, X decima, Y nona.  
Z Z a a b b y Dorfi vertebra octava. Z. Z processus obliqui superiores.  
a. a processus transversi. b. b processus obliqui inferiores. y fpina. In-  
telligi ex hac una partes dorfi reliquarum poterunt.  
d. e. z. n. b. i Vertebrae dorfi. d feptima. e sexta. z quinta, n quarta, b ter-  
tia, i fecunda.  
x l l m m m Vertebra dorfi prima, cujus l. l processus transversi, veluti  
reflexi pone articulos processuum obliquorum superiorum vertebrae hujus  
cum obliquis inferioribus fecundae. m m m corpus.  
v Quinta lumborum vertebra.  
z o o p p e e s s s Quarta lumborum. z fpina. o. o processus obliqui fupe-  
riores. p. p processus transversi. e. e processus obliqui inferiores. s s s cor-  
pus. Reliquarum vertebrarum lumborum partes non difficile erit ex hac  
intelligere.  
t. v. f Lumborum t t tertia, v fecunda, f prima.  
x. x &c. Ligamenta, quae intercedunt inter corpora vertebrarum, eaque  
colligant inter fe.  
p p o o o o o o f f f f f f f Os facrum. p. p processus obli-  
qui superiores. o. o. o. o. o. o. o. o foramina pofteriora. f. f. f fpi-  
nae. d. d processus obliqui inferiores, cum quibus committuntur obliqui  
superiores primi officuli coccygis. e corpus quartae vertebrae illarum e  
quibus os facrum conftat. Inter e & f pars offea corporibus quartae &  
quintae interjecta & continuata, quae fuerat olim ligamentum. f cor-  
pus quintae vertebrae offis sacri.  
Inter f & e Ligamentum inter corpus imum sacri & coccygis summum  
intercedens, eaque colligans inter fe.

e p z Coccygis os primum. - e corpus. p processus transversus : qualis  
etiam in altero latere. z processus obliquus superior : qualis in altero quo-  
que latere.  
Inter e & f Ligamentum, quo coccygis primi & fecundi corpora colliga-  
ta inter fe.  
f. p. o Coccygis officula, f secundum, p tertium, o quartum.  
a a b b Sternum.  
c c d d. c c d d Costae primae. d d pars cartilaginea.  
e e e f. e e e f Costae fecundae. f pars cartilaginea.  
g g h. g g g h Costae tertiae. h pars cartilaginea.  
i i k. i i k Costae quartae. k pars cartilaginea.  
l l m. l l m Costae quintae. m pars cartilaginea.  
n n n n o. n n n n o Costae sextae. o pars cartilaginea.  
p p p p q q. p p p p q q Costae feptimae. q pars cartilaginea.  
r r r s. r r r s Costae octavae. s pars cartilaginea.  
t t t u. t t u Costae nonae. u pars cartilaginea.  
w x x. w x x x Costae decimae. x pars cartilaginea.  
y z. y z Costae undecimae. z pars cartilaginea.  
A B. A B Costae duodecimae. B pars cartilaginea.  
C C C C. C C C Claviculae.  
D. D Lamellae cartilagineae, quae interjectae articulis claviculae cum  
processibus superioribus fcapularum.  
E E F G H I. E E F G H I Scapulae. F fpina. G processus superior.  
H cervix. I cartilago finum cervicis in crustans.  
K L M N O P. K L M N O P Offa humerorum. K caput laevi cartila-  
gine crustatum, quo cum fcapulae finu committitur. L tuber inaequa-  
bile majus capitis superioris. M finus, per quem arteria, vena, & nervus  
incedunt. N finus, qui cum extenditur cubitus, recipit olecranon. O con-  
dylus minor. P condylus major.  
Q R S T. Q R S T Ulnae. R olecranon. S capitulum, quo radium fuf-  
tinet. T processus ftyloides.  
V V W X. V X Y Z a b Radii. W X capitulum superius. X ambitus  
capituli laevi cartilagine crustatus, quo mobile est in ulnae finu. Y finus,  
qui continet tendines Abductoris longi pollicis, & Extensoris minoris.  
Z finus, qui continet tendines Radialium externorum. a finus, qui ten-  
dinem Extensoris majoris pollicis. b finus, qui tendines Extensoris com-  
munis digitorum, Extensoris digiti auricularis proprii, & Indicatoris.  
y d e. y Offa navicularia carporum. d capitulum laevi cartilagine crustatum  
quo cum radio committitur. e capitulum laevi cartilagine crustatum, quo  
cum multangulis committitur.  
z. z Offa lunata. In dextra manu, qua cum radio committitur, crusta  
cartilaginea laevi tectum.  
n b. n Offa triquetra. b superficies laevi cartilagine crustata, qua cum cu-  
neiformi committitur.  
i. i Offa subrotunda.  
x l. x l Offa cuneiformia carporum. l superficies laevi cartilagine crusta-  
ta, qua committitur cum triquetra.  
m v. m Offa capitata. v caput laevi cartilagine crustatum, quo cum navicu-  
lari & lunato committitur.  
z. z Offa multangula minora.  
o. o Offa multangula majora.  
p e. p Metacarpi pollicum. e caput inferius crusta cartilaginea laevi oper-  
tum, qua parte committitur cum offe primo pollicis, & cum fefamoideis.  
Idem in pollice finiftro.  
s. s Offa fefamoidea appofita ad articulum pollicis cum metacarpo suo.  
t v. t v Pollicum offa prima. v crusta cartilaginea laevis, qua tecta capitis  
inferioris pars illa, cum qua os ultimum committitur.  
f. f Offa ultima pollicum.  
x. p. o. f d. x. p. o. f d. Offa metacarporum ; x indicis, p medii,  
o annularis, f d auricularis. d crusta cartilaginea, qua opertum est ca-  
put inferius, qua parte committitur cum offe primi ordinis. Talis & in  
reliquis.  
e. l. e. p z. e. l. e. p Digitorum offa primi ordinis ; e auricularis,  
l annularis, e medii, p z indicis. z crusta cartilaginea integens caput  
inferius, qua parte ad articulum cum offe fecundi ordinis pertinet : qualis  
in reliquis quoque digitis.  
f. p. o. a b. f. o. a Digitorum offa fecundi ordinis ; f indicis, p me-  
dii, o annularis, a b auricularis. b pars capitis inferioris ad articulum cum  
offe tertii ordinis pertinet, laevi cartilagine crustata. Similis in digitis  
reliquis.

In thora-  
ce, clavi-  
culis,  
fcapulis,  
brachiis,  
manibus.



## TABULAE Sceleti secundae explanatio.

In coxis  
& pedi-  
bus.

c. d. e. f. c. d. e. f. Digitorum ossa tertii ordinis.  
g h i k l m m. g h i k l m Ossa coxarum. g h os ilium, h crista. i ischion.  
k processus acutus ischii. l tuber ischii. m os pubis.  
n o p q r s t u w x. o p q r s t u w x Ossa femorum. n caput, quod in acetabulum coniectum, laevi cartilagine crustatum est. o collum. p trochanter major. q trochanter minor. r aspera eminentia per longitudinem partis posticae femoris porrecta. s t condylus exterior, cujus t pars ad articulum genu pertinens, laevi cartilaginea crusta operata. u w condylus interior; ejus w pars, quae pertinet ad articulum genu, laevi cartilagine crustata. x sinus inter condylos.  
y. y Cartilagines femilunares exteriores, quae insertae articulis genuum z. z in ligamenta abeunt, quae ad postremum affixa condylis interioribus.  
A. A Cartilagines femilunares genuum articulis insertae interiores; B. B affixae tibiis, extremis in ligamenta versis.  
C D E F G. C D E F G Tibiae. D. E capitis superioris partes ad articulum genu pertinentes, laevi cartilagine crustatae. F malleolus internus. G sinus per quem incedit tendo Tibialis postici & Flexoris longi digitorum pedis.  
H I K L. H I K L Fibulae. I caput superius, quo cum tibia committitur. K malleolus externus. L sinus, per quem incidunt tendines Peroneorum, longi & brevis.


M N O P. M N O P Tali. N O cartilago laevis, qua crustatum est tuber ejus, tum N qua parte committitur cum imo tibiae, tum O qua cum fibula. P caput.  
Q R. Q R Calcanei. R eminentia, ad quam se flectit tendo Peronei longi.  
S. S Ossa navicularia tarforum.  
T. T Ossa cuneiformia minora tarforum.  
V. V Ossa cuneiformia media tarforum.  
W. W Ossa cubiformia.  
X. Y. Z.  $\alpha$ : X X. Y. Z.  $\alpha$  Ossa metatarforum; X digiti primi parvorum, Y secundi, Z tertii,  $\alpha$  quarti.  
 $\beta$ .  $\gamma$ .  $\delta$ .  $\epsilon$ :  $\beta$ .  $\gamma$ .  $\delta$  Ossa primi ordinis digitorum parvorum;  $\beta$  quarti,  $\gamma$  tertii,  $\delta$  secundi,  $\epsilon$  primi.  
 $\zeta$ .  $\eta$ :  $\zeta$  Ossa secundi ordinis digitorum parvorum;  $\zeta$  quarti,  $\eta$  tertii.  
 $\theta$ .  $\iota$ .  $\kappa$ :  $\theta$  Ossa tertii ordinis digitorum parvorum;  $\theta$  quarti,  $\iota$  tertii,  $\kappa$  secundi.  
 $\lambda$  Os primum pollicis.  
 $\mu$  Os metatarsi pollicis.  
 $\nu$  Os cuneiforme majus tarsi.  
 $\xi$ .  $\circ$  Ossa sesamoidea, quae apposita ad articulum pollicis cum suo metatarso.  $\xi$  interius,  $\circ$  exterius.













# TABULAE ANATOMICAE TERTIAE SCELETI HOMINIS EXPLANATIO.



UNDEM etiam haec Sceletum exhibet, à latere expressum; sed statu alio. Atque huic quoque ad syntaxin continuam efficiendam, ligamenta & cartilagine quibusdam in locis addidi, ut poscebat necessitas.

In cipi-  
te de spina.

A. A Offa verticis.  
B Sutura sagittalis.  
C. C Foramina verticalia.  
D D Sutura lambdiformis.  
E Os occipitis.  
F G. G Processus mammillares ossium temporum. F eminentia, à qua Biventer maxillae oritur.  
H Foramina, alterum in osse mammillari juxta suturae lambdiformis additamentum: alterum in illo ipso additamento; per quod foramen vena penetrat ad finum lateralem durae matris.  
I Additamentum suturae lambdiformis.  
K Sutura vera, facta è conjunctione ossis mammillaris cum osse verticis.  
L Os mammillare.  
M Offeus auris introitus.  
N Processus zygomaticus ossis temporis.  
O Os squamosum.  
P Sutura squamosa, facta è conjunctione ossis squamosi cum osse verticis.  
Q R S Sutura coronalis. Q hac parte sutura vera est. R S hac squamosa, qua ossi frontis subit R os verticis, S multiforme.  
T Os frontis.  
V Sutura squamosa, facta è conjunctione ossis multiformis cum osse verticis.  
W Sutura, facta è conjunctione processus lateralis maximi multiformis cum osse squamoso.  
X Processus lateralis maximus ossis multiformis.  
Y Sutura communis ossi frontis cum jugali juxta caudam supercilii.  
Z Ossis jugalis pars, quae est in cavo temporis.  
Infra Z Sutura communis ossi jugali cum maxillari superiore in cavo temporis.  
Inter Z & X Sutura communis ossi jugali cum processu laterali maximo multiformis.  
a Os maxillare superius.  
Inter a & X Fissura, quae inter os maxillare superius, jugale, & multiforme relinquitur.  
b Ossis jugalis pars exterior.  
c Sutura communis ossi jugali cum processu zygomatico ossis temporis.  
d Os maxillare superius.  
e f g g. Maxilla inferior. e processus coronoideus f condylus, quo committitur cum osse temporis.  
Mox supra f Lamella cartilaginea, quae interjecta articulo maxillae.  
h i Pars concava processus pterygoidei sinistri ossis multiformis. i hamulus, qui sustinet & retinet tendinem Circumflexi palati.  
k l Os maxillare superius. k pars, quae gingivam efficit. l pars, quae in palato est.  
m m m Dentis in utraque maxilla.  
n o o p p q Atlas. n pars corporis sinistra, qua processum coronoideum ossis occipitis excipit, & caput sustinet articulo mobili. o. o corporis partes duae inferiores, quibus in epistropheum innixus articulis mobilibus.  
p. p processus transversus. q pars inaequalis, quae spinae loco est; à qua parte oriuntur Recti capitis postici minores.  
r r s t u Epistropheus. r. r corporis partes duae, quibus atlantem sustinet mobilibus articulis. s processus transversus, in quo foramen pro arteria & vena vertebrali. t processus obliquus inferior. u spina, extremo bifida.  
v w x y z Quinta vertebra colli. v corpus. w processus transversus. x processus obliquus superior. y processus obliquus inferior. z spina.  
α. α. &c. Ligamenta, quae inter corpora vertebrarum intercedunt, aliaque aliis alligant.  
β. γ. δ ε Colli vertebrae, β quarta, γ tertia, δ secunda, ε prima. Partes earum intelligentur ex partibus quintae.  
ζ η θ Vertebra duodecima dorfi. ζ corpus. η processus transversus. θ spina.  
ι κ λ Undecima dorfi vertebra. ι processus transversus. λ spina.  
μ Processus transversus vertebrae decimae dorfi.  
ν. ν. &c. Viae inter vertebrae paratae pro nervis spinalibus, &c.  
ξ. ο. π. ς. σ Spinae vertebrarum dorfi, ξ decimae, ο nonae, π octavae, ς septimae, σ sextae.  
τ υ Quinta vertebra dorfi. τ spina. υ corpus.  
φ χ ψ Quarta vertebra dorfi. φ corpus. ψ spina.  
ω Γ Δ Tertia vertebra dorfi. ω corpus. Γ processus obliquus inferior. Δ spina.  
Θ Λ Ζ secunda vertebra dorfi. Θ Θ corpus. Λ processus obliquus superior. Ζ spina.

Π Σ Φ Prima vertebra dorfi. Π corpus. Φ spina.  
Ψ Ψ Ω Quinta lumborum vertebra. Ψ Ψ corpus. Ω spina.  
Α Α ΑΕ Β C C D Quarta vertebra lumborum. Α Α corpus. ΑΕ process- In spina.  
sus obliquus superior. Β transversus. C C obliquus inferior. D spina.  
Ε F G H I Tertia vertebra lumborum. Ε corpus, F processus transversus.  
G processus obliquus superior. H spina. I processus obliquus inferior.  
K secunda vertebra lumborum. Partes ejus intelligentur ex tertia.  
L M Prima lumborum vertebra. L processus obliquus superior. M spina.  
N O P Os sacrum. N lateris pars inaequalis infra os ilium. O spina tertia.  
P Processus obliquus inferior, qui cum superiore primi officuli coccygis committitur.  
Q R Coccygis officulum primum. Q processus obliquus superior. R corpus.  
S. T Coccygis officula, S secundum, T tertium.  
V W X Costa sinistra prima. V pars prima, qua corpori vertebrae duo- In thorac-  
decimae dorfi inhaeret. W capitulum, quo commissa cum processu trans- ce, sca-  
verso ejusdem vertebrae. pulis, clavi-  
cula.  
Y Z a b Costa sinistra secunda. Y pars prima, qua inhaeret sinui com-  
muni corporibus vertebrarum dorfi duodecimae & undecimae. Z capitu-  
lum, quo committitur cum processu transverso vertebrae dorfi undecimae.  
b extremum cartilagineum.  
c Costa dextra secunda.  
d d e Costa sinistra tertia. e extremum cartilagineum.  
f f Costa dextra tertia.  
g h Costa sinistra quarta. h extremum cartilagineum.  
i i k Costa dextra quarta. k extremum cartilagineum.  
l m Costa sinistra quinta. m extremum cartilagineum.  
n n o o Costa dextra quinta. o o extremum cartilagineum.  
p p q Costa sinistra sexta. q extremum cartilagineum.  
r r s s Costa dextra sexta. s s extremum cartilagineum.  
t t u Costa sinistra septima. u extremum cartilagineum.  
v v w w Costa dextra septima. w w extremum cartilagineum.  
x y Costa sinistra octava. y extremum cartilagineum.  
z z z i. i Costa dextra octava. i. i extremum cartilagineum.  
2. 3 Costa sinistra nona. 3 extremum cartilagineum.  
4. 4. 4. 5. 5 Costa dextra nona. 5. 5 extremum cartilagineum.  
6. 6. 7 Costa sinistra decima. 7 extremum cartilagineum.  
8. 8. 9 Costa dextra decima. 9 extremum cartilagineum.  
10. 10. 11 Costa sinistra undecima. 11 extremum cartilagineum.  
12. 12. 13 Costa dextra undecima. 13 extremum cartilagineum.  
14. 15. 15. 16 Costa sinistra duodecima. 14 pars prima, qua inhaeret cor-  
pori vertebrae dorfi primae. 16 extremum cartilagineum.  
17 Scapula dextra ex interiore parte.  
18. 19. 20. 21. 22 Scapula sinistra. 19 cervix. 20 pars cartilaginea, qua cer-  
vix augetur, tegiturque sinus, qui cum humero committitur. 21 spina.  
22 processus superior.  
23 Clavicula sinistra.  
24. 24. 24 Os pectoris.  
A B C D E F. A F G H Offa humerorum. A in sinistro, eminentia, ad In bra-  
qua definit Deltoïdes. B C D caput superius. B capitis superioris tuber chis, &  
inaequabile minus. C capitis superioris tuber inaequabile majus. Inter manibus.  
B & C, sinus, quo continetur tendo capitis longioris Bicipitis brachii.  
D crusta cartilaginea laevis, qua operta capitis pars, quae cum sinu sca-  
pulae committitur. E condylus minor. F caput laevi cartilagine crusta-  
tum, cum quo radius committitur. G rotula laevi cartilagine crustata,  
cum qua committitur ulna. H condylus major.  
I K L. I K L M Ulnae. I olecranon. L capitulum laevi per ambitum  
cartilagine crustatum, cum quo committitur radius. M processus styloïdes.  
N O P Q Q. N O P R S Radii. O caput superius. P tuberculum, ad  
cujus partem posteriorem definit tendo Bicipitis brachii, ad priorem idem  
ille se inflectit, cum manus in primum vertitur. Q Q. R S capita infe-  
riora. R sinus, per quem incedunt tendines pollicis manus Extensoris  
minoris & Abductoris longi. S sinus, rursus distinctus in duos, per quem  
incedunt tendines Radialis externorum.  
T V. T Offa navicularia carporum. V caput laevi cartilagine crustatum,  
quo cum multangulis committitur.  
W. W Offa lunata.  
X Y Os triquetrum. X pars laevi cartilagine crustata, qua parte committi-  
tur cum cubito, interveniente ligamento, quod ab imo capituli ulnae  
deductum ad imum radium, qua parte is cum ulna committitur.  
Z. Z Offa subrotunda.  
a. a Offa multangula majora.  
b. b Offa multangula minora,



## TABULAE SCELETI TERTIAE EXPLANATIO.

- c. c c Offa capitata.
- d. d e f Offa cuneiformia carporum. e pars laevi cartilagine crustata, qua parte committitur cum triquetro. f processus unciformis.
- g. g h Offa metacarporum pollicum. h crusta cartilaginea, qua caput inferius, qua parte cum eo os primum & sesamoidea committuntur, operum. Idem in dextro pollice.
- i. i Offa sesamoidea, quae apposita ad articulum pollicis cum metacarpo suo.
- k. k l Offa prima pollicum manuum. l crusta cartilaginea, qua intectum caput inferius, qua parte cum eo os ultimum committitur.
- m. m Offa ultima pollicum manuum.
- n n. p. q. r: n o. p. r Offa metacarporum manuum; n indicis, p medii, q annularis, r auricularis. o crusta cartilaginea laevis, qua tecta capitis inferioris metacarpi indicis pars illa, cum qua os primi ordinis committitur: quales & in reliquis utriusque manus.
- s. t. u. v: s. t. u. v. w Offa primi ordinis digitorum manuum: s auricularis, t annularis, u medii, v indicis. w crusta laevis cartilaginea, qua tectum caput inferius, qua parte cum eo committitur os secundi ordinis: cui similes in reliquis.
- x. y. z. Γ: x. y. z. Γ. Δ Offa secundi ordinis digitorum manuum; x indicis, y medii, z annularis, Γ auricularis. Δ caput inferius laevi cartilagine crustatum, qua parte pertinet ad articulum cum osse tertii ordinis: sic & in reliquis.
- Θ. Λ. Ξ. Π: Θ. Λ. Ξ Offa tertii ordinis digitorum manuum. Θ indicis, Λ medii, Ξ annularis, Π auricularis.
- Σ Φ Ψ Ω a b Os coxae finistae. Σ Φ Ψ os ilium, Φ crista, Ψ tuberculum, à quo oritur Rectus cruris. Ω a ischion, a acutus ischii processus. b os pubis.
- c d e f f Os coxae dextrae. c crista ossis ilium. d tuberculum, à quo Rectus cruris oritur. e acutus ischii processus. f f os pubis.
- g h i k l m Os femoris finistri. g caput laevi cartilagine crustatum, quo cum acetabulo committitur. h collum. i trochanter major. l condylus exterior. m huc usque pertinens crusta cartilaginea laevis, qua tecta pars condyli ad articulum genu pertinens.
- n n o p p Os femoris dextri. o condylus interior. p p huc usque pertinens crusta cartilaginea laevis, qua condyli pars illa crustata, cum qua committitur tibia & patella.
- q r. q r Patellae. r hac parte, quae ad articulum genu pertinet, tecta crusta cartilaginea laevi.
- s. s Cartilagine femilunares interiores, interfertae articulis genuum.
- t Cartilago femilunaris exterior, interferta articulo genu.
- u v v w x y z. u v w x y z Tibiae. u caput superius, v hac parte, qua ad articulum genu pertinet, tectum crusta cartilaginea laevi. w eminentia, ad quam definit ligamentum à patella procedens, eamque tibiae alligans. y z caput inferius, z malleolus internus.
- A B C. A B C Fibulae. B caput superius. C malleolus externus.
- D E F G. D E G Tali. E hac parte ad articulum cum crure pertinet, laevique cartilagine crustatus est. F sinus, per quem incedit tendo Flexoris longi pollicis pedis. G crusta cartilaginea, qua tectum hoc caput ejus.
- H. H I K Calcanei. I tuber, quo incipit; ad cujus posteriorem & eandem inferiorem partem tendo achillis cum Plantaris tendine definit; ad posteriorem eandemque superiorem inflectitur, cum articulum cruris cum pede extremo flectimus in priorem partem. K pars eminens, quae caput tali sustinet.
- L. L Offa cubiformia.
- M. M Tarforum ossa navicularia.
- N Tarfi os cuneiforme medium.
- O. O Tarforum ossa cuneiformia minora.
- P. P Tarforum ossa cuneiformia majora.
- Q. R. S. T. V: Q. S. T. V: W Offa metatarforum: Q pollicis, R digitorum parvorum primi, S secundi, T tertii, V quarti. W metatarfi pollicis caput laevi cartilagine crustatum, qua parte ad articulum cum osse primo & cum sesamoideis pertinet. Idem in reliquis metatarfi.
- X Offa sesamoidea, quae apposita ad articulum pollicis cum suo metatarfi osse.
- Y. Z. α: Y. Z. α. β. γ: Δ Offa primi ordinis pollicum pedum, digitorumque parvorum: Y pollicis, Z parvorum primi, α secundi, β tertii, γ quarti. Δ caput laevi cartilagine crustatum, qua parte pertinet ad articulum cum osse proximo. Eodem modo in digitis reliquis.
- ε: ε. ζ. η. θ Offa secundi ordinis digitorum pedum parvorum, ε primi, ζ secundi, η tertii, θ quarti.
- ι ι Pollicum pedum ossa ultima.
- κ κ: κ. λ. μ. ν Offa tertii ordinis digitorum pedum parvorum, κ primi, λ secundi, μ tertii, ν quarti.

F I N I S.





TAB. I.









# TABULAE ANATOMICAE PRIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

**H**AC Tabula exhibeo Musculos primos, ut per totum ab hac parte Corpus post integumenta communia, vaginaeque tendinosas, positi sunt; una cum quibusdam ligamenti ad eos pertinentibus, Sceletique, itemque aliarum partium, ut nasi, auris, pudendorum, partibus, quae nudae sunt à Musculis.

In capite, collo, trunco.

aaabbbccdefghdefghijklEpicranius. a a a aponeurosis media inter Occipitales & Frontales. b b &c. Frontales. b b mucrones, quibus incipiunt. c conjunctio Frontalium per mediam frontem. d-e. d-e his partibus Frontales definunt ad Orbiculares palpebrarum. e-f. e-f his se secundum supercilia flectunt ad angulos majores oculorum, ad speciem Orbicularium. g. g mucrones, qui se in angulos majores curvant. h. h portiones, quae accedunt ad Levatores labii superioris alarumque nasi. i pars, per glabellam nasumque excurrunt. k l ejus conjunctio cum Compressoribus narium; quibus k hac parte implicata, l hac continuata.  
m m n o o p q r. m o o p Orbiculares palpebrarum. m m pars per ambitum orbis foraminis oculi ducta. n pars à Corrugatore supercilii accedens. o o pars, qua palpebrae obductae. p implicatio filorum, quae ex palpebris venientia, conveniunt juxta angulum minorem. q r ortus à ligamento, quo palpebrarum commissura in angulo majore alligata naso. s Ligamentum, quo palpebrarum commissura in angulo majore alligata naso, & ibi quidem parti ejus illi, quae fit ab osse maxillari superiore.  
t u Compressor naris. t pars carnea. u aponeurosis, qua se dexter sinistrique per dorsum nasi conjungunt.  
w x y. y Levatores labii superioris alarumque nasi. x pars, quae per latus nasi ad alam procedit. y extremum, quod per labium superius evanescit extenuatum.  
z A. z Levatores labii superioris. A extremum extenuatum, quo per labium superius excurrunt evanescit.  
B. B Portiones ab Orbicularibus palpebrarum procedentes ad labium superius.  
C. C Zygomatici minores; qui per labium superius extenuati evanescunt.  
D D. D Levatores angulorum oris. D D partim se continuat Depressori anguli, partim circum angulum oris se ad labium inferius flectit, atque ibi exteriorem partem Orbicularis oris efficit.  
E F G. E Zygomatici majores. F ortus ab osse jugali. G extremum, Depressori anguli oris continuatum.  
H. H Nafales labii superioris. Indicatus ortus ex naso, modusque, quo se ad Orbicularem oris adjungunt.  
I Orbicularis oris pars, quae est in labio superiore. Ubi angulum oris circumit, accipit partem à Levatore anguli, una circumeuntem.  
K K Orbicularis oris pars, quae est in rubro margine labiorum.  
L. L Fasciculi subtiles, qui procedunt partim à Zygomaticis majoribus, huc procurantibus; partim à Depressoribus angulorum oris veluti abluunt. Decussant subiacentium Depressorum labii inferioris fasciculos.  
M. M N Depressores labii inferioris. N hic decussant se.  
O P Levatores menti. P fasciculi, quos immiscet pingui menti.  
Q R R S. Q Depressores angulorum oris. R R ortus à maxilla inferiore. S continuatio Zygomatico majori.  
T Buccinator.  
V W X Y. V Masseteres. V pars prior eademque exterior. W ortus partis illius ab osse jugali. X pars posterior, quae nuda à priore. Y partis hujus ortus ab osse jugali, & à processu zygomatico ossis temporis.  
Z Anterior auriculae.  
Γ Δ Attollens auriculam. Γ principium tendineum, quo ab Epicranio abscedit. Δ carnea pars.  
Θ Major helix.  
Λ Tragicus.  
Ξ Minor helix.  
Π Antitragicus.  
Σ Biventer maxillae.  
Φ Sternomastoideus cum Cleidomastoideo, in unum conjuncti.  
Ψ. Ψ Cucullares.  
Ω α α α β β γ γ δ ε ε ζ η θ. Ω α α α ζ η θ Latissimi colli. α α α principium, è tenuibus magnamque partem sparsis fasciculis constans. β β β fasciculi, qui in quibusdam hominibus in latere colli accedunt. γ γ fasciculi sparsi, quibus in mala evanescentibus definit. δ fasciculus, qui per priorem partem Depressoris anguli oris porrectus angulum illum versus. ε ε eminentes sub Latissimo maxilla inferior. ζ. η. θ eodem modo sub Latissimo eminentes ζ Sternomastoideus, η Cleidomastoideus, θ clavicula.  
ι. ι Sternohyoidei.  
κ Aspera arteria.  
λ μ. μ Sternomastoidei. μ principium tendineum, à sterno oriens.  
ν. ν Sternothyreoidei.  
ξ ο ο π ρ ρ σ. ξ ο ο π ρ ρ σ Pectorales. ο ο ortus à sterno, π à costae sextae cartilagine, ρ à septimae, principio aliquandiu tendineo tenui. σ cohaesio cum aponeurosi Obliqui externi abdominis. ρ portio ab aponeurosi Obliqui externi abdominis accedens; hic tendinea & tenuis, in aliis carnea & crassior, aliisque atque aliis se habens modis.

σ σ Teres major.

τ υ φ. τ υ φ Latissimi dorsi. υ. φ capita, orientia υ à costa decima, φ nona.

χ ψ ω α β γ δ ε ζ η θ. χ ψ ω α β γ δ ε ζ η θ Serrati magni. χ caput oriens à costa quinta, ψ à sexta, ω septima, α octava, β nona. γ γ γ γ ipsa capitum à costis origo.

defghikkkklmmnoopprrrrstuvwxyz. defghikkkklmmnoopprrrrstuvwxyz, Obliqui externi abdominis. d pars carnea. e caput oriens à costa sexta, f septima, g octava, h nona, i decima. k ipsa à costis capitum origo. l l l m m n o o o p p p p q r r r r s t u v v w x aponeurosis. m m hic sub ea eminent caro Obliqui interni. n hic sub eadem, simul & sub aponeurosi Obliqui interni, caro Transversi. o o o hic Recti. p p p p hic per aponeurosem apparent lineae tendineae Recti. q hic sub eadem eminent Pyramidalis. r r r r linea alba, in qua Obliquorum externorum aponeuroses se decussant, continuantque, & cum subiectis conjungunt. f aponeurosis inserta ossi pectoris. s haec pars aut dici potest ad Obliqui externi aponeurosem pertinere, aut ad Pectoralem: itaque aut inferi cartilaginis costae septimae, aut ab ea oriri. t foramen in linea alba, per quod in embryone exibant arteriae umbilicales, vena umbilicalis, urachus. u imus margo tendineus, à crista ilium pertinens ad pubem. v v. w w. duae partes, in quas aponeurosis se findit, inde ad pubem usque distinctae, tendinum specie: ex quo fissura fit, per quam elabitur funiculus vasorum spermaticorum cum Cremastere. x pars tenuior, ab altero illorum tendinum ad alterum pertinens, eosque connectens inter se. Sub qua parte funiculus spermaticorum vasorum decurrit leviter eminent, per eamque conspicuus. Infraque eam, juxta ipsam pubem, funiculus elabitur per anulum Obliqui hujus; qui parvus est, relinquiturque inter partem x, tendines v v. w w & os pubis. Caeterum fila aponeurosis, quae carnearum in modum porrecta sunt, decussant fila tendinea alia, subtilia, rara; quod ex icone satis apparet: ab iisque fit pars x, ab altero tendine per alterum excurrentibus.

y. y Funiculi spermaticorum vasorum nudi.

z. z Cremastere.

A. A Glutei magni.

B. B Graciles.

C. C Adductores magni femorum.

D. D Adductores longi femorum.

E. E Pectinei.

F. F Psoae magni.

G. G Iliaci interni.

H I. H I Sartorii. I principium extrinsecus tendinosum, oriens à crista ilium.

K L. K Glutei medii. L ortus à crista ilium.

M N O. M N O Tenfores vaginarum femorum. N ortus à crista ilium.

O extremum, unde rescissa pars tendinea, quam adjungit vaginae femoris.

P Q R S. P Q R S Vasti externi. Q pars tendinosa. R extremum tendineum, S insertum patellae.

T V W X. T V W X Recti crurum. V tendo, patellae insertus. W locus ubi se inserit patellae. X aponeurosis, quae à tendine Recti excurrit per priora patellae, posteaque se priori parti ligamenti adjungit, quod à patella ad tibiam pertinet.

Y Z Γ. Y Z T Vasti interni. Z tendo extremus, Γ patellae insertus.

Δ Θ Λ. Δ Θ Λ Ligamenta à patellis ad tibias pertinentia. Θ locus ubi à patella oritur. Λ tota hac parte subtus tibiae insertum.

Ξ Π Σ. Ξ Π Σ Bicipites crurum. Π Σ tendo extremus, Π pars ejus praecipua, fibulae capiti inserta; Σ pars, qua ad tibiam pertinet.

Φ Ψ Ω. Φ Ψ Ω Sartorii. Ψ tendo, Ω tibiae insertus.

α. α Semitendinosi.

β γ δ. β γ Gemelli. γ pars tendinosa. δ tendo.

ε ζ η. ε ζ η Solei. ζ ζ ortus à tibia. η superficies tendinosa.

θ ι κ. θ ι κ Flexores longi digitorum pedum. ι ι ortus à tibia. κ tendinis principium.

λ. λ Tendines Tibiales posteriores.

μ. μ Plantarium tendines.

ν. ν Tendines Achillis.

ξ. ξ Solei.

ο π ρ. ο π ρ Peronei longi. π ortus à capite fibulae. ρ tendo, ex parte exteriore carnis nascens.

σ. σ Peronei breves.

τ υ. τ υ Extensores longi digitorum pedum cum Peroneis tertiis in unum conjuncti. υ ortus à tibia.

φ χ χ. φ χ χ Peronei tertii. χ χ tendo, in crure pedeque.


ψ ω α β γ. ψ ω α β γ Extensores longi digitorum pedum. ψ tendo. ω α β γ

In femoribus, cruribus, pedibus.

















In femo-  
ribus,  
cruribus,  
pedibus  
extremis.



# TABULAE MUSCULORUM SECUNDAE EXPLANATIO.

$\delta \epsilon \epsilon \zeta \eta \theta$ .  $\delta \epsilon \epsilon \zeta \eta \theta$  Vasti externi.  $\epsilon \epsilon$  ortus ab osse femoris.  $\zeta$  pars principii tendinosa.  $\eta \eta$  tendo,  $\theta$  insertus patellae. Juxta Cruralem infigne vestigium huic Vasto à Recto cruris impressum: confer Tab. I.  
 $\lambda$ .  $\lambda$  Rectorum crurum truncati tendines.  $\kappa$  locus ubi se inserit patellae.  $\lambda$  aponeurosis, quae à tendine Recti per priorem patellae partem excurrit ad ligamentum, quod à patella ad tibiam pertinet: posteaque se adjungit priori parti ligamenti illius.  
 $\mu \nu \xi$ .  $\mu \nu \xi$  Ligamenta à patellis ad tibiae pertinentia.  $\nu$  locus ubi à patella oritur.  $\xi$  hac parte tota tibiae subtus insertum.  
 $\pi$ .  $\pi$  Tendines Gracilium,  $\pi$  tibiis inserti.  
 $\sigma$ .  $\sigma$  Semitendinosorum tendines, tibiis inserti.  
 $\tau$ .  $\tau$  Poplitei.  
 $\varsigma \varsigma \tau$ .  $\varsigma \varsigma \tau$  Bicipites crurum.  $\varsigma \tau$  tendo extremus,  $\varsigma$  pars ejus praecipua, fibulae capiti inserta;  $\tau$  pars, quae ad tibiam pertinet.  
 $\upsilon$ .  $\upsilon$  Solei.  
 $\phi \chi \psi$ .  $\phi \chi \psi$  Peronei longi.  $\chi$  ortus à capite fibulae.  $\psi$  tendo, è parte exteriori carnis nascens.  
 $\omega$ .  $\omega$  Peronei breves.  
A B C D E. A B C D E Extensores longi digitorum pedum cum Peroneis tertiis. A communis caro Extensoris & Peronei; B ortus ejus à tibia. C Peroneus tertius, D tendo ejus. E tendo Extensoris longi digitorum; qui se in quatuor tendines dividit, ad quatuor digitos parvos pertinentes; quorum qui digiti minimi est, citius, ipsoque in crure oritur; reliqui demum, ubi ex ligamento q Tab. 1. emerfurus est. Extensori & Peroneo, quia conjuncti sunt, vestigium notabile impressum à Tibiali antico: confer Tab. I.  
F G G. F G G Tibiales pollicis. F pars, quae à fibula procedit. G G ortus à tibia.  
H I K L M. H I K L M Extensores proprii pollicum pedum. I tendo, K insertus ossi ultimo pollicis. L M tendinis ramus, quem aliquoties invenit, M insertus ossi primo pollicis.  
N O O P. N O O P Solei. O O ortus à tibia. P superficies tendinosa, quae tendo incipit.  
Q R R S. Q R R S Flexores longi digitorum pedum. R R ortus à tibia. S tendinis principium.  
T. T Plantarium tendines.  
V V W X. V V W X Tendines Tibialium posticorum. W extremum insertum ossi naviculari, partimque X procurrans ad os cuneiforme majus.  
Y. Y Tendines Achillis.  
Z. Z Tendines Flexorum longorum digitorum pedum.  
a b. a b Capita, quae ad Flexores longos digitorum pedum in plantis accedunt, b ortus à calcaneo.  
c d. c d Flexores breves digitorum pedum. d ortus à calcaneo.  
e. e Flexoris brevis pollicis pedis cauda exterior.  
f f g. f f Tendines Flexorum longorum pollicum pedum. g hic vagina contentus est, fissà in cornua duo.  
h. h Interossei primi digitorum minorum primorum.  
i k l. i k Extensores breves digitorum pedum. i portio ad pollicem pertinet. k portio decurrens ad digiti primi parvorum latus illud, quod pollicis obversum; aliquoties inventa. l portio pertinet ad primum parvorum.  
m n o p q. m Tendo communis Extensoris longi & brevis digitorum pedis, insertus ossi secundi ordinis. n tendinis communis Extensoris longi & brevis portio, ad os tertium procurrans. o tendo ad os tertium procurrans, qui procedit ab Extensore brevi digitorum pedis p duarum ad os tertium pertinentium portionum commune extremum, ossi tertio insertum q aponeurosis ad tendinem m accedens, procedensque partim à capsula articuli digiti cum metatarso, partim ab Interosseo hujus lateris, partim à Lumbricali, partim à latere ossis primi ordinis. Eadem in caeteris digitis parvis utriusque pedis: sed ad digiti minimi tendinem nulla portio accedit ab Extensore digitorum brevi.  
r s. r s Supraspinati. s tendo tuberi magno & inaequali ossis humeri insertus.  
t. t Communis Coracobrachialis & capitum breviorum Bicipitum brachiorum ortus à processibus coracoideis scapularum.  
u. u Coracobrachiales. v v. v v hac parte conjuncti cum capitibus brevioribus Bicipitum brachiorum.  
w x y z a b g. w x y z a b g Bicipites brachiorum. w x caput brevius, w pars extrinsecus tendinosa, x carnea. y z caput longius; y tendo, quo incipit, decurrens super caput ossis humeri, & deinde per finem, qui inter ejus duo tubera. z pars carnea. a venter communis. b aponeurosis, quam dat vaginae tendineae cubiti, truncata. g tendo, quo se radio inserit.  
 $\delta \epsilon \zeta \eta$ .  $\delta \epsilon \zeta \eta$  Tricipites brachiorum.  $\delta$  caput, quod Brevis dicitur.  $\epsilon$  quod Longus.  $\zeta$  quod Brachialis externus.  $\eta$  tendo, qui è superficie Brachialis externi ortus, ad humeri condylum posteriorem pertinet.  
 $\theta \theta \iota \kappa$ .  $\theta \theta \iota \kappa$  Brachiales interni.  $\iota$  pars depressior, cui Supinator longus adjacet.  $\kappa$  superficies tendinosa.  
 $\lambda \mu$ .  $\lambda \mu$  Radialis externus longior dexter.  $\mu$  tendo.  
 $\nu \xi \pi \rho$ .  $\nu \xi \pi \rho$  Radialis externus longior sinister; hic se in duos dividens, qui singuli in tendinem abeunt.  $\xi$  tendo praecipuus, partis praecipuae.  $\pi$  tendo partis minoris, qui se cum altero conjungit in tendinem  $\pi$  communem,  $\rho$  insertum ossi metacarpi indicis.  
 $\sigma \varsigma$ .  $\sigma \varsigma$  Radiales externi breviores.  $\varsigma$  tendo, insertus ossi metacarpi indicis & medii.  
 $\tau \tau \upsilon \phi$ .  $\tau \tau \upsilon \phi$  Supinatores breves.  $\tau \upsilon$  extremum insertum,  $\tau$  radici tuberculi radii,  $\upsilon$  radio infra tuberculum illud.  $\phi$  pars posterior.  
 $\chi$ .  $\chi$  Profundi.  
 $\psi$ .  $\psi$  Pronator teres truncatus.  
 $\omega$ .  $\omega$  Communia principia. Ulnarium internorum & Sublimium, orientia à condylis majoribus humerorum; eaque tendinosa.  
A. A A B Ulnares interni. B tendo insertus ossi subrotundo.  
C D E F G H I K L M N N O O P Q Q. C D E F H I M N Sublimes.  
D pars crassior, oriens à condylo majore humeri. E portio exili tendine


oriens ab ulna, juxta finem Brachialis interni. F G pars tenuior, à radio oriens, G ortus à radio. H I I portio ad digitum tertium pertinens, I tendo ejus. K L portio ad digitum auricularem pertinens, L tendo ejus. M N N portio ad digitum medium pertinens, N N tendo ejus. O O P Q Q portio ad indicem pertinens, P tendo ejus, Q Q cornua duo, in quae se tendo findit, inserta ossi secundi ordinis indicis. Eodem modo in cornua se dividunt, inferuntque tendines I. L. N.  
R Profundi tendo ad indicem pertinens.  
S T. S T V W Flexores longi pollicum. T V tendo, V hac parte per longitudinem quodammodo fissus, W insertusque ossi ultimo pollicis.  
X. X Supinatorum longorum truncati tendines.  
Y Pronator quadratus.  
Z b d. a b c d Abductores longi pollicum manuum. a pars superior. b tendo partis superioris, cujus c portio truncata, quam dat Abductori brevi pollicis. d tendo partis inferioris.  
e f. f Extensores minores pollicum manuum. f tendo.  
g g Extensor major pollicis manus.  
h. h i Communes tendines pollicum Extensorum majorum & minorum. itendo communis insertus ossi ultimo pollicis.  
k Extremum recisi Abductoris brevis pollicis manus.  
l m n o p Ligamentum carpi, quod cum sinu carpi canalem efficit, qui continet & coërcet tendines à cubito ad digitos pollicemque procedentes, Sublimis, Profundi, Flexoris longi pollicis. m ortus ejus ab osse subrotundo carpi, n à multangulo majore, o à naviculari. p canalis, per quem penetrat tendo Radialis interni.  
q r s t Opponens pollicis. r ortus ab osse multangulo majore, s à ligamento carpi. t extremum ossi metacarpi pollicis insertum.  
u v w Pars Flexoris brevis pollicis manus, quae pro pollicis Abductore brevi altero haberi potest. v ortus ejus à ligamento carpi. w extremum tendinosum insertum ossi primo pollicis.  
x Cauda posterior Flexoris brevis pollicis manus.  
y Adductor pollicis manus.  
z Interosseus prior indicis.  
 $\alpha \beta$  Abductor indicis.  $\beta$  extremum tendineum, quo insertus ossi primo indicis.  
 $\gamma \delta \epsilon$  Lumbricalis primus.  $\delta$  ortus ejus à tendine Profundi ad indicem pertinente.  $\epsilon$  tendo, qui se conjungit cum communi tendine Extensorum indicis, & dein ad indicis os tertium pertinet.  
 $\zeta \eta \theta$  Lumbricales,  $\zeta$  secundus,  $\eta$  tertius,  $\theta$  quartus. In tendines abeunt ut primus, quibus notas ob angustiam locorum non inscripsi. Conjungunt se tendines cum tendinibus Interosseorum priorum.  
 $\iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega$  Tendines Profundi, per longitudinem quodammodo fissi.  
 $\kappa \kappa \kappa \kappa$  inserti ossibus tertii ordinis.  
 $\lambda$  Interosseus posterior indicis cum tendine suo.  
 $\mu$  Interosseus prior digiti medii.  
 $\nu$  Tendo communis Lumbricalis secundi & Interossei prioris digiti medii.  
 $\xi$  Interosseus posterior digiti medii cum tendine suo.  
 $\theta$  Interosseus prior digiti annularis.  
 $\pi$  Tendo communis Lumbricalis tertii & Interossei prioris digiti annularis.  
 $\rho$  Tendo Interossei posterioris digiti annularis.  
 $\sigma$  Tendo Interossei prioris digiti minimi.  
 $\varsigma$  Tendo communis Lumbricalis quarti & Interossei prioris digiti minimi.  
 $\tau \upsilon$  Flexor parvus digiti minimi manus.  $\upsilon$  ortus à ligamento carpi.  
 $\phi$  Tendo communis Flexori parvo digiti minimi manus cum Abductore ejusdem.  
 $\chi \chi$  Adductor ossis metacarpi digiti minimi.  
 $\psi \omega$  Abductor digiti minimi manus,  $\omega$  oriens ab osse subrotundo & à ligamento carpi.  
 $\Gamma$  Opponens pollicis manus.  
 $\Delta$  Aponeurosis ambiens capsam articuli pollicis cum metacarpo, innexaque capsae illi, & adjuncta tendini communi Extensorum pollicis.  
 $\Theta$  Cauda posterior Flexoris brevis pollicis manus.  
 $\Lambda$  Aponeurosis, quam cauda posterior Flexoris brevis pollicis dat tendini communi Extensorum pollicis.  
 $\Pi$  Adductor pollicis manus.  $\Pi$  extremum tendineum, insertum ossi primo pollicis.  
 $\Sigma$  Abductor indicis.  
 $\Phi$  Interosseus prior indicis.  
 $\Psi$  Tendo Indicatoris.  
 $\Omega$  Interossei prioris digiti medii caput ab osse metacarpi medii oriens.  
1 Interossei posterioris digiti medii caput ab osse metacarpi annularis oriens.  
2 Interossei posterioris annulares caput ab osse metacarpi auricularis oriens.  
3 Recisus tendo communis Extensorum digiti minimi manus, per dorsum ejus incedens.  
4 5 Recisi Extensoris communis digitorum tendines, qui ad digitum 4 annularem, & 5 medium, pertinent, ac deinde 6. 6 per dorsum digitorum illorum decurrunt cum aponeurosis, quas accipiunt.  
7 Recisus Extensoris communis digitorum manus tendo ad indicem pertinens  
8 9 Communis Indicatoris & Extensoris communis digitorum manus tendo, ad indicem pertinens. 9 extremum ejus, insertum ossi secundo indicis.  
10 Aponeurosis, quae partim orta à Lumbricali primo, partim ab Abductore indicis; adjungit se communi tendini Extensorum indicis.  
11 Tendo Lumbricalis primi.  
12 Tendo Lumbricalis primi, accepta à tendine communi Extensorum indicis portione auctus, decurrens ad os tertium indicis.  
13 Tendo Interossei posterioris indicis, qui accepta à tendine communi Extensorum indicis portione auctus, decurrit ad os tertium indicis.  
14 Extremum tendineum commune, insertum ossi tertio indicis. Quod extremum fit ex tendinibus 12 & 13 confluentibus in unum.  
15 Tendo Interosseo priori digiti medii & Lumbricali secundo communis: qui tendo accepta portione ab Extensoris communis tendine auctus, decurrit ad os tertium digiti medii.  
In interiore parte digitorum indicati tendines Sublimis & Profundi.

In brachio, & cubitis.

In manu dextra.

In manu sinistra.











# TABULAE ANATOMICAE TERTIAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

**R**URSUS remotis plerisque partibus primis figurae, quae Tabula secunda continetur; proximum Musculorum ordinem, pariter cum quibusdam ligamentis hac tertia figura exhibeo, & Sceleti quoque, magis autem denudati, partes.

Remota: à capite, Temporalis, Masseteres, Corrugatores supercilio-  
rum, Levatores palpebrarum superiorum, ligamenta quibus palpebrarum  
commiffurae in angulis majoribus alligatae processibus nasalibus offium maxil-  
larium superiorum, palpebrae ipsae una cum Orbicularium palpebrarum con-  
tinuationibus quae palpebrarum oris ductu continuo circumductae, Nafales  
labii superioris, Levatores angulorum oris, Depreffores labii inferioris. A  
collo, Sternomastoidei cum Cleidomastoideis, Levatores scapularum, Co-  
rachyoidei, Sternohyoidei, Biventer maxillae, Stylohyoideus. A trun-  
co, Subclavii, Serrati antici, Serrati magni, Recti abdominis, Pyramida-  
les, Obliqui interni, Cremafteres una cum testibus. A femoribus, Glutei  
medii, Pectinei, Adductores longi femorum, Rectorum crurum principia  
& extrema, Vasti interni & externi cum Cruralibus. A cruribus pedibus-  
que extremis, ligamenta à patellis ad tibias pertinentia, Semitendinosorum  
tendines, Extensores proprii pollicum pedum, Extensores longi digitorum  
pedum praeter extrema tendinum ad digitorum parvorum primos tres per-  
tinentium, Peronei tertii, Plantarium tendines, Solei, tendines Achillis,  
Flexores breves digitorum pedum, Flexoris brevis pollicis pedis cauda exte-  
rior, vagina tendinem Flexoris longi pollicis pedis continens juxta os pri-  
mum pollicis. Ab humeris, Supraſpinati, Bicipites brachiorum, Longi,  
Breves. A cubitis manibusque, Sublimes, Ulnares interni, extrema Supi-  
natorum longorum, Abductores longi pollicum, Extensores minores pol-  
licum. A manu dextra, extremum Abductoris brevis pollicis, pars Flexoris  
brevis pollicis quae pro ejus Abductore brevi altero haberi poteſt, Opponens  
pollicis, Abductor indicis, Flexor parvus & Abductor digiti minimi. A  
cubito praeterea manuque ſiniſtra, Indicatoris tendo, Extensor major pol-  
licis, communis tendo Extensoris pollicis majoris & minoris una cum ad-  
juncta aponeuroſi ambiente caſam articuli pollicis cum metacarpo, Op-  
ponens pollicis, Abductor indicis una cum aponeuroſi, quam adjungit ten-  
dini communi extensorum indicis.

In capite, a. a Oculorum globi.

& collo.

b Cartilago orbiculi, per quem tendo Obliqui superioris oculi tranſit: quae  
cartilago tendinem illum ſuſtinet, & continet.  
c d Tendo Obliqui superioris oculi. c pars ejus, ſecundum internum latum  
foraminis oculi ad orbiculum incedens. d pars, quae, poſtquam ex orbi-  
culo exiit, recurrit ad globum oculi.  
e e Recti attollentes oculorum, ſcleroticis innexi.  
f Rectus adductor oculi, ſcleroticæ innexus.  
g Rectus abductor oculi, ſcleroticæ innexus.  
h h Recti depreſſores oculorum, ſcleroticis innexi.  
i i k Obliqui inferiores oculorum. k origo ab offe maxillari ſuperiore in  
fundo foraminis oculi, juxta oram ejus, inter futuram offis illius pro-  
priam, & os unguis.  
l l m Depreſſores alarum naſi, m extremum circum radicem alae inſertum.  
n o p p Orbicularis oris pars, quae in labio ſuperiore eſt. o pars, quae in  
rubro margine labii, p. p hinc reſecti Depreſſores angulorum oris, qua  
abeunt in exteriorem partem Orbicularis oris, qua is labium ſuperius ab  
angulis oris juxta os ambit.  
q r s t t Orbicularis oris pars, quae eſt in labio inferiore. q pars, quae in  
rubro margine labii eſt. s hic ſubit faſciculum z, & continuatur Buccinatori  
partique Levatoris anguli oris & Zygomatici majoris, ad eum accedentibus.  
t. t portiones, quae ad Orbicularem oris accedunt, procedentes à maxilla  
inferiore, & ſe cum Orbiculari conjungentes: poſt ſubeunt Buccinatorum  
portiones z, & cum Buccinatoribus ſe conjungunt.  
u Sinulus, ſive ſpatium inter Buccinatoris faſciculum z, & portionem t, quae  
ad Orbicularem oris accedit: in quo ſpatio aliquot glandulae collocatae.  
v. v w x y z a Buccinatores. w pars, quae abit in Orbicularis oris partem,  
quae eſt in labio ſuperiore. x hic adjungit ſe ei Levatoris anguli oris pars  
una cum parte Zygomatici majoris. y pars, quae abit in Orbicularis par-  
tem, quae eſt in labio inferiore. z faſciculum, qui ad labium ſuperius pro-  
cedit, acceditque ibi ad interiorem partem Orbicularis oris. a hic conti-  
nuat ſe portioni t ad Orbicularem oris accedenti.  
β. β γ δ Levatores menti, γ hac parte continuati inter ſe. δ faſciculi,  
quos pingui menti immiſcent.  
ε ε Pterygoideus externus, extremum tendinoſum habens.  
ζ Pterygoideus internus.  
η Mylohyoidei, inſerti offis hyoidis baſi.  
θ Baſiogloſſus, oriens à baſi & à cornu hyoidis.  
ι Ceratogloſſus, oriens à cornu hyoidis.  
κ λ λ Os hyoides. κ baſis. λ. λ cornua.  
μ ν Larynx. μ cartilago thyreoidea: inter χ ψ & ω proceſſus ejus ſupe-  
rior. ν cartilago cricoidea.  
ξ Aſpera arteria.

ο. ο Cricothyreoidei. ο pars prior, à cartilagine cricoidea oriens: ac mox  
infra partem illam, pars poſterior.

π π ς σ. π π ς σ ς Sternothyreoidei. ς portio accedens ſeparata. σ extre-  
mi pars inſerta eminentiae cartilaginis thyreoideae, quae per latum ejus  
externum oblique excurrit: ς pars, quae ſe jungit poſteriori margini Hyo-  
thyreoidei, & cum eo pertinet ad cornu hyoidis.

ς τ υ φ. ς τ υ φ Hyothyreoidei. τ ortus à cornu & à baſi hyoidis. υ φ  
extremum, inſertum υ imo margini cartilaginis thyreoideae, ante eminen-  
tiam, quae per latum ejus externum oblique excurrit; φ eminentiae illi.

χ Communis extremi, in quod ſe conjungunt Stylopharyngeus & Palato-  
pharyngeus cum Salpingopharyngeo, pars à Stylopharyngeo producta.

ψ Ligamentum, quod à proceſſu ſuperiore cartilaginis thyreoideae pertinet  
ad extremum cornu hyoidis.

ω Conſtrictor inferior pharyngis.

Γ. Γ Recti interni majores capitis.

Δ Θ Longus colli. Θ extremum, ad proceſſum tranſverſum vertebrae colli  
ſecundae à dorſo pertinens; cujus extremi pars tendinoſa eſt: vide Tab. IV.

Λ. Λ Intertranſverſarii colli priores primi.

Ξ. Ξ Levatores coſtarum primarum.

Π Σ Φ Ψ Ω. Π Σ Φ Ψ Ω Scaleni priores. Σ ortus à coſta prima. Φ Φ. Ω  
extrema tria, quorum Φ pertinet ad proceſſum tranſverſum vertebrae  
colli à dorſo ſecundae; Φ ad tertiae; Ω ad quartae.

Α Β C D E. Α C D E Scaleni medii. Β origo à coſta prima. C. D. E Extre-  
ma, quorum C pertinet ad proceſſum tranſverſum vertebrae colli à dorſo  
primae; D ad quintae; E ad ſextae & ſeptimae.

Ε Trachelomastoideus.

Ε Complexus.

Æ Obliquus ſuperior capitis.

Φ Φ. Φ Φ & inter π & ς Pleurae.

Γ Η Ι Κ Κ. L. M. N. O. P. Q. R. S: Γ Η Ι Κ Κ. L. M. N. O. P. Q. R. S In trunco  
Intercoſtales externi. Γ Η Ι Κ Κ primus, L ſecundus, M tertius, N quar-  
tus, O quintus, P ſextus, Q ſeptimus, R octavus, S nonus. Primus  
oritur Ι à cartilagineo extremo coſtae primae, Η ab offea parte: Κ Κ in-  
feritur offeae parti ſecundae. Sic ſequentes ab offea parte coſtae ſuperio-  
ris oriuntur, offeae inferioris inferuntur.

Τ Υ V W X. Y. Z. a. b. c. d. e. f: Τ Υ V W X. Y. Z. a. b. c. d. e. f In-  
tercoſtales interni. Τ Υ V W X primus, Y ſecundus, Z tertius, a quar-  
tus, b quintus, c ſextus, d ſeptimus, e octavus, f nonus. Primus ori-  
tur Υ à cartilagineo extremo coſtae primae, V à ſterno: inſertus W of-  
ſeae parti coſtae ſecundae, X extremo cartilagineo. Sic apparet in ſe-  
quentibus, quomodo ab extremo cartilagineo & ab offea parte coſtae ſu-  
perioris oriantur; pariterque cartilagineo extremo & offeae parti inferioris  
inferantur. g. h. i. k: h Intercoſtalium illorum partes extremis cartilaginibus  
harum coſtarum interfertae, ultra conjunctiones illarum cartilaginum.

l m n o p p q q r. l m n o p p q q r Tranſverſi abdominis. l pars carnea.  
m aponeuroſis. n ortus à cartilagineo extremo coſtae undecimae. o ortus  
à criſta ilium. p p margo, qui procedit à margine tendineo Obliqui exter-  
ni abdominis. q q hinc reſciſſa aponeuroſis pars illa, quae ante Rectum  
& Pyramidalem abdominis incedit. r imus margo aponeuroſis partis ſuperio-  
ris, quae pone Rectum incedit, ac peritoneum proxime complectitur.

s t t t. s t t t Lamellae poſteriores aponeuroſium Obliquorum internorum  
abdominis, Tranſverſorum aponeuroſibus ſuperinductae. t t t hinc re-  
ſectae, qua ſe primum cum aponeuroſibus Tranſverſorum conjungunt  
u v w. v w Hic aponeuroſes Tranſverſorum, cum ſuperinductis lamellis  
poſterioribus aponeuroſium Obliquorum internorum ſe inferunt, u priori  
parti cartilaginis mucronatae non longe ab ipſius mucrone: v. v margini-  
bus cartilaginis illius; w. w offeae partis.

x Triangularis ſterni cum Tranſverſo abdominis conjunctus, & cum eo in-  
fertus. Sic & in altero latere.

y y Linea alba. z foramen in ea, per quod in embryo exhibant arteriae  
umbilicales, vena umbilicalis, urachus.

α α. α α Hinc reſciſſae aponeuroſes Obliquorum externorum abdominis,  
una cum lamellis prioribus aponeuroſium Obliquorum internorum.

β β β β β γ δ δ Peritoneum. γ δ δ veſtigia, γ ligamenti, quod ura-  
chus fuerat; δ δ ligamentorum, quae fuerant arteriae umbilicales.

ε ζ η θ. ε ζ η θ Funiculi vaſorum ſpermaticorum. ε. ζ duae venae: η arteria:  
venae cum arteria infra Tranſverſum abdominis per peritoneum procedunt  
ad ſuperiorem partem offis pubis: ad eas adjungit ſe θ vaſ deferens, ex  
pelvi veniens; unaque deinde per inguen ad ſerotum delabuntur.

ι Synchronroſis offium pubis, ligamenti ſuis conſtricta.

κ Penis truncatus. Vide Tab. IV.



# TABULAE MUSCULORUM TERTIAE EXPLANATIO.

λ Sphincter ani externus.  
 μ Accelerator. Idem in altero latere.  
 ν Erector penis. Idem in altero quoque latere.  
 ξ ο π ρ σ. ξ ο π ρ σ Glutei minores. ο ortus ab ossē ilium. π tendo, ρ infertus radici trochanteris majoris. σ pars musculi prior.  
 ς ς ς Iliaci interni. ς origo à crista ilium.  
 τ υ. τ υ Psoae magni. υ tendo, cui se adjungit caro Iliaci interni.  
 φ χ. φ χ Obturatores externi. χ ortus ob ossē pubis.  
 ψ ω Γ. ψ ω Γ Adductores breves femorum; quibus vestigia ab Adductoribus longis, & à Pectineis impressa: confer Tab. II. ω caput extrinsecus tendinosum, oriens ab ossē pubis juxta synchondrosē. Γ extremum tendinosum ab hac parte.  
 Δ Δ Δ Δ Δ. Δ Δ Δ Δ Δ Adductores magni femorum. Δ Δ pars spinæ ossis femoris inserta. Δ Δ Δ pars altera, ad condylum ossis femoris pertinet: Δ superficies tendinosa, in Δ tendinem abeuns.  
 Π Σ Φ. Π Σ Φ Semimembranosi. Σ superficies tendinosa, in tendinem abeuns. Φ portio tenuior, quam tendo emittit, pertinet ad marginem internum tibiae.  
 Ψ Ω Α Β. Ψ Ω Α Β Graciles; quibus vestigia ab Adductoribus longis femorum impressa: confer Tab. II. Ω origo à ligamento synchondrosē pubis constringente. Α tendo, Β tibiae infertus.  
 C D E F. C D E F Bicipitum crurum capita breviora. D E F tendo extremus, cujus Ε pars præcipua, fibulae capiti inserta; F pars ad tibiam pertinet.  
 G H I K L. G H I K L Peronei longi; quibus ab Extensoribus longis digitorum pedum vestigia impressa: confer Tab. II. H principii superioris ortus à capite fibulae. I à tibia. K K principii inferioris ortus à spina fibulae. L tendo, è carnis parte exteriorē nascens.  
 M N N. M N N O Peronei breves; quibus vestigia ab Extensoribus longis digitorum pedum impressa: conf. Tab. II. N N ortus à fibula. O tendo.  
 P Q Q R R S S T U. P Q Q R R S S T U Tibiales postici. Q Q ortus à tibia, R R à spina fibulae. S S T U tendo, qui partim infertus T ossi naviculari, partim U procurrit ad os cuneiforme majus.  
 V W. W W Flexores longi pollicum pedum. W tendo.  
 X Y Y Z a. X Y Y Z a Flexores longi digitorum pedum. Y Y ortus à tibia. Z tendinis principium, a tendo.  
 b c. b c Capita, quae ad Flexores longos digitorum pedum in plantis accedunt. c ortus à calcaneo.  
 d Flexoris brevis pollicis pedis cauda interior, hoc est, digitis parvis propior.  
 e f g h i k l. e f g h i k l Extensores breves digitorum pedum, qui se in quinque portiones dividunt. f portio ad pollicem pertinentis tendo, g infertus ossi primo. h tendo portionis, quae aliquando invenitur, decurrens ad digitum primi parvorum lateris illud, quod pollicis obvertit. i tendo portionis ad digitum primum parvorum pertinentis, k ad secundum, l ad tertium.  
 m m. m Interossei primi digitorum pedum parvorum primorum.  
 Inter i & k fin. Interosseus secundus digitorum pedum parvorum primi.  
 Inter k & l fin. Interosseus secundus digitorum pedum parvorum secundi.  
 n. o. p fin. Extensorum longorum digitorum pedum tendines rescissi. n qui ad digitum primum parvorum pertinet, o qui ad secundum, p qui ad tertium. Ac sic quoque in pede dextro.  
 q Tendo communis Extensoris longi & brevis digitorum pedis, infertus ossi secundi ordinis. r ejusdem portio, ad os tertium procurrens. s tendo ad os tertium procurrens, qui procedit à tendine Extensoris brevis digitorum pedis. t duarum ad os tertium pertinentium portionum commune extremum, ossi tertio infertum. u aponeurosis ad tendinem q accedens, procedensque partim à capsula articuli digiti hujus cum metatarso, partim ab Interosseo hujus lateris, partim à Lumbricali, partim à latere ossis primi ordinis. Eadem in secundo & tertio digitorum parvorum pedis hujus, & in tribus primis sinistri.  
 v w x y. v x Subscapulares. w x extremi pars tendinea, x inserta tuberi inaequali minori capitis superioris ossis humeri. y extremi pars carnea, inserta ipsi humero, infra tuber illud.  
 z α. z Teretes majores. α extremum tendineum ossi humeri infertum.  
 β γ δ ε ε. β γ δ ε ε Caput breviorum Bicipitum brachiorum partes, extrinsecus tendinosae; γ γ hic refectae; δ δ hic communem ortum cum Coracobrachialibus habentes à processibus coracoideis scapularum; ε ε hic conjunctae cum Coracobrachialibus.  
 ζ η. ζ η Coracobrachiales. η Hac parte divisi sunt, penetrante nervo.  
 θ ι. θ ι Brachiales externi. ι tendo, qui ex ejus superficie ortus, ad humeri condylum posteriorem pertinet.  
 κ λ μ ν ξ ο. κ λ μ ν ξ ο Brachiales interni. λ μ bicornae principium, quo ab ossē humeri oritur. ο ortus à margine ossis humeri. ξ pars depressor, cui Supinator longus adjacet. ο superficies tendinosa.  
 π ρ. Radialis externus longior dexter. ρ tendo.  
 σ ς ς τ υ. Radialis externus longior sinister, qui hic se in duos dividit. ς tendo partis praecipuae, qui praecipuus & ipse. ς tendo partis minoris, qui se cum altero conjungit, ex quo fit tendo τ communis, υ infertus ossi metacarpi indicis.  
 φ χ. φ φ χ χ ψ Radiales externi breviores. χ χ tendo, ψ infertus ossibus metacarpi duobus, indicis & medii.  
 ω Γ Δ Θ. ω Γ Δ Θ Supinatores breves. Γ Δ extremum, quod infertum Γ radici tuberculi radii, Δ radio infra illud tuberculum. Θ pars posterior.  
 Α Pronatoris teretis rescissi extremum.  
 Ε Ε Pronator quadratus.  
 Π Π Σ Σ Φ Ψ Ω Α Β. Π Φ Ψ Ω Flexores longi pollicum manuum. Σ Σ origo à radio. Φ Ψ portio, quae ad eum accedit, oriens à condylo majore humeri, rarius occurrens: quae in Ψ tendinem abit; qui ad carnem Flexoris se adjungit, efficitque primum initium tendinis ejus Ω Α Β; cuius Ω pars carni Flexoris inhaerens, Α pars secundum metacarpum pol-

In cruribus & pedibus extremis.

In scapulis humeris cubitis manibus.


licis, pollicemque incedens, ubi per longitudinem quodammodo fissus est; B extremum ossi ultimo pollicis infertum.  
 C C D E F G H H I I K K L L M M M M. C C D E F I K L Profundi. In manu dextra.  
 D ortus ab ulna. E. F. G tres tendines ex carne orientes, inter quos caro. Quorum primus E abit in H H tendinem indicis; secundus F in I I tendinem medii, tertius G in duos K. L, quorum alter K K digiti annularis est, alter L L auricularis. Qua tendines illi per manum digitosque decurrunt, per longitudinem quodammodo fissi sunt, ad postremum M. M. M. M infertus ossibus tertii ordinis.  
 N O P Q R Ligamentum carpi, quod cum sinu carpi canalem efficit, qui continet & coeret tendines à cubito ad digitos pollicemque procedentes, Sublimis, Profundi, Flexoris longi pollicis. O ortus ejus à carpi ossē naviculari, P ab eminentia interna ossis multanguli majoris, Q à subrotundo, R à processu incurvo cuneiformis. S canalis, per quem tendo Radialis interni penetrat.  
 T Ligamentum, quod ab ossē subrotundo pertinet ad metacarpi manus quartum.  
 V U W X Y Adductor ossis metacarpi digiti minimi. V origo ejus à processu incurvo ossis cuneiformis, W à ligamento carpi. X Y his partibus infertus ossi metacarpi minimi.  
 Z Z a Flexor brevis pollicis manus. a extremum tendineum, infertum pollicis sesamoideo illi, quod ab indice remotius.  
 b b Adductor pollicis manus.  
 c d d e f Lumbricalis primus. d d ortus ejus à tendine Profundi ad indicem pertinente: & quidem à crassiore parte duarum illarum, in quas per longitudinem fissus quodammodo est. e aponeurosis, quam conjungit cum aponeurosi Abductoris indicis, unaque cum ea adjungit communi tendini Extensorum indicis. f tendo, qui se conjungit cum communi tendine Extensorum indicis, & deinde ad indicis os tertium pertinet.  
 g h i Lumbricalis secundus. h i origo ejus, h à tendine Profundi ad digitum medium pertinente, & quidem crassiore parte earum, in quas per longitudinem fissus quodammodo est: i à tendine Profundi ad indicem pertinente, tenuiore autem parte ejus. Tendinem suum adjungit tendini Interossei prioris digiti medii.  
 k l m Lumbricalis tertius. l m origo ejus, l à tendine Profundi ad digitum medium pertinente, & quidem à tenuiore parte earum, in quas per longitudinem fissus quodammodo est: m à tendine Profundi ad digitum annularem pertinente, crassiore autem parte ejus. Tendinem suum adjungit tendini Interossei prioris digiti annularis.  
 n o Lumbricalis quartus. o origo à tendine Profundi ad auricularem pertinente: à crassiore parte illarum, in quas per longitudinem fissus quodammodo est. Tendinem suum adjungit tendini Interossei prioris auricularis.  
 p Tendo communis Lumbricali quarto cum Interosseo priore digiti auricularis: qui tendo se conjungit cum tendine Extensoris communis, pertinetque ad os tertium digiti hujus.  
 q Tendo Interossei posterioris digiti annularis, quo is se conjungit cum tendine Extensoris communis, pertinetque ad os tertium digiti hujus.  
 r Interosseus prior digiti annularis.  
 s Tendo communis Lumbricali tertio cum Interosseo priore digiti annularis: qui tendo se conjungit cum tendine Extensoris communis, pertinetque ad os tertium hujus digiti.  
 t u Interosseus posterior digiti medii. u tendo, quo se conjungit cum tendine Extensoris communis, pertinetque ad tertium os digiti hujus.  
 v Interosseus prior digiti medii.  
 w Tendo communis Lumbricali secundo cum Interosseo priore digiti medii: qui tendo conjungit se cum tendine Extensoris communis, pertinetque ad os tertium digiti medii.  
 x y Interosseus posterior indicis. y tendo, quo se conjungit cum tendine communi Extensorum indicis, ac deinde ad os indicis tertium pertinet.  
 z Interosseus prior indicis, extremo tendineo infertus ossi primo indicis.  
 a b Flexor brevis pollicis manus. b aponeurosis, quam emittit, conjungitque cum aponeurosi, quae ambit capsam articuli pollicis cum metacarpo suo; unaque cum ea adjungit tendini communi Extensorum pollicis.  
 c d Adductor pollicis manus. d extremum tendineum, infertum ossi primo pollicis.  
 e f Interosseus prior indicis, oriens ab ossē metacarpi indicis, & f extremo tendineo infertus ossi primo indicis.  
 g Interossei prioris digiti medii caput ab ossē metacarpi medii oriens.  
 h Interossei posterioris digiti medii caput ab ossē metacarpi annularis oriens.  
 i Interossei posterioris annularis caput ab ossē metacarpi auricularis oriens.  
 k Recifus tendo Indicatoris.  
 l Recifus tendo Extensoris communis digitorum ad indicem pertinens.  
 m Communis Indicatoris & Extensoris communis digitorum manus tendo, ad indicem pertinens; n extremo suo infertus ossi secundi ordinis indicis.  
 o p q Lumbricalis primus. p tendo. q aponeurosis, quam tendo ille producit, conjungitque cum aponeurosi Abductoris indicis, unaque cum ea adjungit tendini communi Extensorum indicis. r tendo hujus Lumbricalis conjunctus cum tendine communi Extensorum indicis, acceptaque ab eo portione auctus, s decurrens ad os tertium indicis.  
 t Tendo Interossei posterioris indicis, qui accepta à tendine communi Extensorum indicis portione auctus, decurrit ad os tertium indicis.  
 u Extremum tendineum commune, factum è tendinibus s & t confluentibus in unum; infertumque indicis ossi tertio.  
 v. w Recifi Extensoris communis digitorum tendines, qui ad digitos, v medium, & w annularem, pertinent; ac deinde per dorsum digitorum illorum decurrunt, cum aponeurosis, quas accipiunt.  
 x Recifus tendo communis Extensorum auricularis, per dorsum ejus incedens.  
 y Tendo Interosseo priore digiti medii & Lumbricali secundo communis: qui tendo accepta portione ab Extensoris communis digitorum manus tendine, qui digiti medii est, auctus, conjungit se cum z tendine Interossei posterioris digiti ejusdem, aucto pariter portione, quam ab Extensoris communis digitorum manus tendine, qui ejusdem illius digiti est, accipit: ex qua conjunctione natum extremum tendineum commune, ad os tertium digiti illius pertinet.

In manu dextra.


In manu sinistra.



TAB. IV.









# TABULAE ANATOMICAE QUARTAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

**I**N hac figura, quarti Musculorum ordinis exhibendi causa, non modo remotae figurae proxime superiores partes exteriores pleraeque: sed etiam ex cavis oculorum offeis quaecunque in iis praeter musculos sunt; à collo, cum larynge & aspera arteria pharynx tota & stomachus; è thorace aperto, quaecunque supra Diaphragma sunt, Pulmones, Cor, pericardium, pleurae; praeterea peritoneum totum cum visceribus abdominis quae continet, & quicquid etiam lumbis ab hac parte praeter musculos adjacet.

A figura tertia remota: à capite, Globi oculorum cum extremis musculorum ipsis insertorum, Cartilago orbiculi per quem tendo Obliqui superioris oculi transit, Depressores alarum nasi, Orbicularis oris, Buccinatores, Levatores menti, Pterygoideus externus. A collo, Mylohyoidei, Basioglossus, Ceratoglossus, Os hyoïdes, Larynx, Aspera arteria, Cricothyreoidei, Sternothyreoidei, Hyothyreoidei, communis extremi, in quod se conjungunt Stylopharyngeus & Palatopharyngeus cum Salpingopharyngeo, pars à Stylopharyngeo producta; Ligamentum quod à processu superiore cartilaginis thyreoideae pertinet ad extremum cornu hyoïdis, Constrictor inferior pharyngis, Recti interni majores capitis, Scalenii priores, Trachelomastoïdes, Complexus, Pleurae. A trunco, Intercostales externi sinistri, extrema anteriora costarum quaratarum, quintarum, sextarum, septimarum, octavarum, nonarum, decimarum, una cum inferiore parte ossis pectoris, & musculis Intercostalibus intermediis; Transversi abdominis una cum lamellis posterioribus aponeurosum Obliquorum internorum abdominis, Triangulares sterni, Linea alba, Funiculi vasorum spermaticorum, Peritoneum. A coxis, Glutei minores. A femoribus, Adductores breves femorum, Semimembranosi, Graciles, Bicipites crurum. A cruribus pedibusque extremis, Peronei longi, Flexores longi pollicum pedum, Flexores longi digitorum pedum, Capita quae ad Flexores longos digitorum pedum in plantis accedunt, Extensores breves digitorum pedum, Extensorum longorum digitorum pedum tendines, una cum reliquis tendinibus, & cum aponeurosis, per dorsum digitorum pedum porrectis: praeterea à pede extremo sinistro, Flexores brevis pollicis pedis cauda interior. A scapulis, Teretes majores. Ab humeris, Coracobrachiales una cum capitibus brevioribus Bicipitum brachiorum, Brachiales externi, Brachiales interni. A cubitis manibusque, Radiales externi longiores, & breviores, Flexores longi pollicum manuum, Profundi: & à cubito dextro, Pronatoris teretis rescissi extremum. Praeterea à manu dextra, Ligamentum carpi interius, Ligamentum quod ab osse subrotundo pertinet ad metacarpi manus quartum, Adductor ossis metacarpi digiti minimi, Lumbricales. A manu sinistra, omnes musculi, tendines, aponeuroses, praeter Adductorem pollicis & Flexorem brevem.

In capite, collo, trunco.  
a b b. b' Levatores palpebrarum superiorum. b b extremum truncatum.  
c d Obliquus superior oculi. c origo ejus ab interno latere marginis foraminis optici. d hic, ubi orbiculum suum intraret, truncatus.  
e f f Recti attollentes oculorum. e origo, partim à superiore parte marginis foraminis optici, partim inter idem illud foramen, & quod infra illud sequitur. f extremum truncatum.  
g h Rectus adductor oculi. g origo à margine foraminis optici, à parte nasi. h extremum truncatum.  
i l. k l Recti abductores oculorum. i origo ab inferiore parte marginis foraminis illius, quod infra opticum sequitur; qua foramen illud rotundum est, juxta rimae, in quam abit, initium. l extremum truncatum.  
m n. n Recti depressores oculorum. m origo ab inferiore parte portionis ossae, quae foramen opticum illudque quod mox infra sequitur, discriminat.  
o p q. o q Obliqui inferiores oculorum, ibi ubi se globis inferunt, rescissi. p origo à margine orbis oculi. q pars interior.  
r Pterygoideus internus.  
s Obliquus superior capitis.  
t u v w x y z α. t u v w x y z α Longi colli. t u v w x pars praecipua, quae ad corpora vertebrarum pertinet; cujus haec u pars tendinosa. v. w. x capita, à principio tendinea, quae oriuntur à processibus transversis vertebrarum colli: v quod à quartae, w à tertiae, x à secundae. y z α pars, quae ad processum transversos pertinet; cujus z α cauda pertinet ad processum transversum vertebrae colli secundae, α hac parte tendinea.  
β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν. β δ ε ζ η θ ι κ λ Scalenii medii. γ origo à costa prima. δ ε cauda pertinet ad processum transversum vertebrae colli primae, ε extremo tendinoso. ζ η cauda, ad secundae, η extremo tendineo. θ ι cauda, ad tertiae, ι extremo tendineo. κ λ cauda, ad quartae, λ extremo tendinoso. μ cauda, ad quintae. ν haec pars abit in caudas duas postremas.  
ξ. ο. π. ς. π. ς Intertransversarii colli priores. ξ quartus, ο tertius, π secundus, ς primus.  
σ. σ Levatores costarum primarum, costis illis inserti.

ς ς. ς ς. τ τ. υ. φ. χ. ψ. ω. A Intercostales externi. ς ς primus, &c. Sinistri remoti.  
B. C C. D. E. F. G. H. I. K. L L. B. C C C. D. L L L Intercostales interni. B. B primi, &c. L L. L L L undecimi.  
M M N N O O P P Q Q R R S T U U V W X Y Z Γ Δ Θ Λ Ξ Π Π Σ Σ Σ Φ Ψ Ω a b c c d e f g h i k k k k l l l l m m n n o o Diaphragma. M M N N O O P P Q Q R R S T U U V W X Y Z Γ Δ Θ Λ Ξ Π Π Σ Σ Σ Φ Ψ Ω a b c c pars, quae abdomen respicit. d e f g h i k k k k l l l l m m n n o o pars, quae thoracem respicit. M N O p. M N O p capita prima: M. M tenuitates tendineae, quae nascentes è ligamentis, quae per superficiem corporum vertebrarum lumborum excurrunt, ad haec capita extrinsecus accedunt: N. N hic subtus ab inferiore parte corporis vertebrae lumborum tertiae oriuntur, tendine O crassio: P. P carnes, in quas tendines illi abeunt. Q. Q capita secunda. R. R capita tertia. S caput quartum sinistrum. T principium, quod aliquoties inveni, enascens è superficie Quadrati lumborum. U. U Diaphragmatis carnea partes primae, è caput conjunctione natae. V capitis primi sinistri portio accedens ad carnem partem primam dextram, posteaque excurrunt per marginem dextrum foraminis, quo stomachus exit. W capitis primi dextri pars, quae post portionem V incedens, eam decussat, & ultra eam abit in carnem primam sinistram. X foramen, quo stomachus exit. Y Z Γ Δ tendinis medii pars sinistra: cujus Y pars è carne prima nata, abit Z in carnem partem secundam sinistram; Γ pars supercandit praecedentem, decussans eam; Δ pars proximam Γ supercandit, decussans eam, & abit in carnis sinistrae secundae inferiorem partem. Θ pars carnea sinistra secunda; Λ Ξ ejus extremum, quod insertum costae duodecimae, Λ ossae parti, Ξ cartilagineae: Π Π ejusdem truncatus margo, ubi continuabatur Transverso abdominis, inter costas duas postremas. Σ Σ Σ Φ pars carnea secunda dextra, Φ hic primam supercandens & decussans eam, mox tendinea. Ψ Ω portio, qualis aliquando in uno, aliquando in utroque latere invenitur, faciens inferiorem Diaphragmatis ab hac parte marginem; quae hic (alias autem aliter) oritur à processu transverso quartae lumborum vertebrae, itemque à quintae, & primum Ψ tendinea, (pariter autem alio alioque in aliis modo) deinde Ω carne, adjungit se carnea parti secundae, Σ postea conjungit cum ea; inferitque b cartilagini costae duodecimae. c c truncatus margo, qui continuatus erat Transverso abdominis inter costas duas postremas. d tendo medius, in quo fasciculi tendinei se decussant. e. f partes carnea, dextra & sinistra. g extremum carneum medium, quod ad cartilagineum mucronatam pertinet, à qua h rescissum. i. i extrema, quae se peritonaeo innectunt. k k. k k extrema, quae rescissa ab inferiore parte costarum septimarum. l l. l l quae ab octavarum. m. m quae à nonarum. n. n quae à decimarum. o. o quae inserta undecimis.  
p q q. p q q Quadrati lumborum. q q origo à crista ossis ilium, principio extrinsecus tendinoso.  
r s Psoas parvus. s tendo. Sinister non exhibitus.  
t u v w x. t u v w x Psoae magni. u caput tertium, ejusque origo ab inferiore parte corporis vertebrae lumborum quartae, & à ligamento, quod inter corpus illud corpusque tertiae intercedit. v caput quartum, ejusque origo ab inferiore parte corporis vertebrae lumborum tertiae, & à ligamento inter corpus illud corpusque secundae intercedens. w caput quintum, ejusque origo ab inferiore parte corporis vertebrae lumborum secundae, & à ligamento inter corpus illud & corpus primae intercedens. x tendo, ad quem se caro Iliaci interni adjungit.  
y z z z. y z z z Iliaci interni. z z z origo à crista ossis ilium.  
α β. α β Obturatores externi. β origo ab osse pubis.  
γ δ δ ε Penis truncatus. δ. δ corpora spongiosa majora. ε corpus spongiosum minus cum urethra.  
ζ. ζ Erectores penis.  
η. η Acceleratores.  
θ Sphincter externus ani.  
ι. ι Transversi perinaei.  
κ λ μ ν ξ ο. κ λ μ ν ξ ο Adductores magni femorum. κ origo ab osse pubis. λ. μ. ν partes leviter, & maxime fibrarum decursu distinctae inter se; quae simul efficiunt extremum superius, femoris lineae posteriori per longitudinem insertum. ξ ο pars magis distincta, abeunt deinde in extremum in-

In trunco, femoribus, cruribus, pedibus extremis.



## TABULAE MUSCULORUM QUARTAE EXPLANATIO.

- ferius, quod ad condylum anteriorem pertinet: o tendo, è carne nascens.
- π ρ σ τ υ υ φ φ χ ψ. π ρ σ τ υ υ φ φ χ ψ Tibiales postici. ρ principium quod à tibia oritur. σ σ origo à tibia. τ principium quod à fibula oritur. υ υ origo à fibula. φ φ χ ψ tendo, χ insertus ossi naviculari, & ψ excurrrens etiam portione tenuiore, ad os cuneiforme magnum.
- ω Γ Γ Δ. ω Γ Γ Peronei breves. Γ Γ origo à fibula. Δ tendo.
- Θ. Θ Interossei primi pedum digitorum secundorum, orientes ab ossibus metatarsi digitorum illorum.
- Λ. Λ Interosseorum secundorum pedum digitorum secundorum capita, quae oriuntur ab ossibus metatarsi digitorum tertiorum.
- Ξ. Ξ Interosseorum secundorum pedum digitorum tertiorum capita, quae oriuntur ab ossibus metatarsi digitorum quattorum.
- Π. Π Interosseorum secundorum pedum digitorum quattorum capita, quae oriuntur ab ossibus metatarsi digitorum quattorum.
- Σ Adductor pollicis pedis.
- Φ Ψ Ω a. Φ Ψ Ω a Subscapulares. Ψ extremi pars tendinea, Ω inserta tuberi inaequabili minori capitis superioris ossis humeri: a pars carnea inserta ossi humeri infra tuber modo dictum.
- b c d d e e f. b c e f Supinatores breves. c tendo, quo incipit. d d insertio circum tuberculum radii, & e e radio infra tuberculum. f pars posterior, inter ulnam & radium conspicua.
- g. g h i k k Pronatores quadrati. h superficies tendinosa. i ortus ab ulna. k k insertio radio.
- l m n o p q. l r Flexores breves pollicum manuum. m origo ab ossè multangulo minore, n à capitato, o à cuneiformi. p cauda altera, extremo tendineo inserta sesamoideo, quod ab indice remotius. q altera, extremo pariter tendineo inserta & sesamoideo quod indici propius, & proximae parti ossis primi pollicis. r aponeurosis, quam Flexor brevis producit, quae se cum aponeurosi ambiente capsam articuli pollicis cum metacarpo suo conjungit, unaque cum ea adjungit extremo communi tendinum Extensorum pollicis, à quo extremo resecta.
- s t u. s u Adductores pollicum manuum. t origo ab ossè metacarpi digiti medii. u extremum tendineum, ossi primo pollicis insertum.
- v w Interosseus prior indicis, w extremo tendineo insertus ossi ejus primo.
- x Interosseus posterior indicis. y tendo ejus, qui accepta à tendine extensorum indicis portione auctus, decurrit ad indicis os tertium.
- z Interosseus prior digiti medii.
- α Lumbricalis secundi tendo, truncatus.
- β Tendo Lumbricali secundo & Interosseo priori digiti medii communis, qui tendo accepta à tendine Extensoris communis, ad digitum medium pertinente, portione auctus, decurrit ad os tertium digiti illius medii.
- γ Interosseus posterior digiti medii. δ tendo ejus, qui accepta à tendine Extensoris communis, ad digitum medium pertinente, portione auctus, decurrit ad os tertium digiti illius medii.
- ε ζ Interosseus prior digiti annularis. ζ origo ab ossè metacarpi digiti illius.
- η Lumbricalis tertii tendo, truncatus.
- θ Tendo Lumbricali tertio & Interosseo priori digiti annularis communis, qui tendo accepta ab Extensoris communis tendine, ad digitum annularem pertinente, portione auctus, decurrit ad os tertium digiti illius annularis.
- ι κ Interosseus posterior digiti annularis. κ origo ab ossè metacarpi hujus digiti. λ tendo ejus, qui accepta ab Extensoris communis tendine, ad digitum annularem pertinente, portione auctus, decurrit ad os tertium digiti illius annularis.
- μ ν Interosseus digiti auricularis. ν origo ejus ab ossè metacarpi digiti illius.
- ξ Tendo Lumbricalis quarti, truncatus.
- ο Tendo Lumbricali quarto & Interosseo digiti auricularis communis, qui tendo accepta à tendine extensorum digiti auricularis portione auctus, ad os tertium digiti illius decurrit.
- Caeterum hac in Tabula, & in octava, exhibita quoque figura Rhinocerotis foeminae, quae ineunte hoc anno apud nos fuit, annos habens, ut custodes ferebant, duos cum dimidio. Ob raritatem belluae putavi figuras ejus gratiores fore, quam alia quaecunque ornamenta ad arbitrium excogitata. Accuratae sunt, justaeque magnitudinis ad rationem figurarum hominis, quae his iisdem Tabulis continentur.

In scapulis, cubitis, manibus.





TAB.V.









# TABULAE ANATOMICAE QUINTAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.



ABULAE hujus figura est pars averfa illius, quae Tabula prima continetur. Exhibet quoque fyntaxin totam Musculorum primorum post integumenta communia vaginaeque tendinosas: praetereaue ligamenta ad musculos pertinentia, auresque & scroti partem, nudasque partes Sceleti.

In capite,  
collo, dor-  
so, nati-  
bus, femo-  
ribus.

a b c. a b c d d. e Epicranius. a b Occipitalis. a ejus principium tendineum. b pars carnea. c d d aponeurosis inter Occipitalem & Frontalem intercedens. d d hic per eam Temporalis apparet, eminetque. e pars membranacea, qua Occipitales, eorumque aponeuroses conjunctae inter se; oriens supra Cucullarium ab osse occipitis ortum.  
f g Attollens auriculam. f ejus tendinosum principium, quo ab Epicranio abscedit. g pars carnea.  
h Frontalis.  
i Orbicularis palpebrarum.  
k Anterior auriculae.  
l Helicis minor.  
m. n. o Tres Retrahentes auriculae.  
p q Masseter. p portionis interioris pars posterior, quae nuda à portione exteriori. q portio exterior.  
r Zygomaticus major.  
f Pterygoideus internus.  
s Mylohyoideus.  
t Latissimus colli.  
u w. u w x Sternomastoïdeus cum Cleidomastoïdeo, conjuncti in unum. u extremum tendineum, x insertum ossi occipitis.  
y. y Biventre cervicis, inserti ossi occipitis.  
z. z Splenii capitis.  
A Levator scapulae.  
B C D E F G H H. B C D E F G H H Cucullares. B pars carnea. C D E F principium tendineum. C pars ejus ab osse occipitis oriens. D E F per hunc tractum cum pare sui extrinsecus cohaeret, subtus oriens à spinis dorsi omnium, duarum inferiorum colli, ligamentoque cervicis. E principii plaga tendinea amplior juxta imam cervicem fumumque dorsum. F ejusdem alia in infimo angulo. G Extremi pars tendinea, qua spinae scapulae non longe à basi insertum. H H extremi pars tendinosa, inserta spinae scapulae & processui superiori.  
I K. I K Infrapinati. K ortus à basi scapulae.  
L. L Rhomboidei majores, inserti basibus scapularum.  
M. M Sacrolumbales.  
N. N Teretes minores.  
O. O Teretes majores.  
P Q R R S T V. P Q R R S T V Latissimi dorsi. P pars carnea. Q latus tendo, quo incipit. R R ortus ejus à spinis vertebrarum lumborum, & ossis sacri. S ortus à processibus obliquis, qui sunt a latere hiatus ossis sacri. T cohaesio cum Gluteo magno. V ortus à crista ilium.  
W X. W X Obliquorum externorum abdominis partes carnae, X X cristis ilium insertae.  
Y Z. Y Z α Glutei medii. Z ortus ab osse ilium. α tendo.  
β. β Tenfores vaginarum femorum.  
γ δ δ. γ δ δ Glutei magni. δ δ hac parte oritur à crista ilium & à sacro, cohaeretque cum Latissimo dorsi.  
ε Levator ani. Dextri quoque parva pars in latere dextro.  
Inter. ζ & η Transversus perinaei.  
η Sphincter ani externus.  
θ. θ Adductores magni femorum.  
ι κ. ι κ Graciles. κ tendo.  
λ. λ Sartorii.  
μ. μ Vasti interni.  
ν ξ ο. ν ν ξ ο Semimembranosi. ξ tendinis ex carne ortus. ο tendo.  
π ρ. π ρ Semitendinosi. ρ tendo.  
σ τ τ υ φ χ. σ τ τ υ φ χ Bicipites crurum. σ caput longius. τ τ caput brevius. υ φ χ tendo, υ primum oriens è superficie carnis capitis longioris, accessione deinde brevioris auctus φ, χ extremoque insertus capiti superiori fibulae.  
ψ ω. ψ ω Vasti externi. ψ superficies tendinosa.  
Γ c. Γ c Plantares.  
Δ. Δ Poplitei.  
Θ I & c. Θ I & c. Peronei longi.  
Λ Ξ Ξ Π Σ Σ Φ. Λ Ξ Ξ Π Σ Σ Φ Gemelli. Λ Ξ Ξ caput exterius. Ξ Ξ superficies tendinosa. Π Σ Σ caput interius. Σ Σ superficies tendinosa. φ tendo.  
Ψ Ω. Ψ Ω Tendines Achillis, Ω. Ω inserti calcaneis,  
α a b. α a b Solei. b superficies tendinosa.

In cruri-  
bus, pedi-  
bus extre-  
mis hu-  
meris.

c. c Plantarium tendines.  
d. d Tendines Tibialium posticorum.  
Inter tendines d & ψ in sinistro pede, & d & tendinem Plantaris in dextro, tendines Flexorum longorum digitorum pedum.  
e. e Ligamenta, quibus retinentur tendines juxta malleolos internos, qua secundum eos incedunt.  
f. f Flexores longi pollicum pedum.  
g h i k. g h i k Peronei breves. h tendinis è carne ortus. i i tendo, k insertus ossi metatarsi quinto.  
l m m m. l m m m Peronei longi. m m m tendo.  
n. n Ligamenta, quibus tendines Peroneorum longorum & brevium retinentur ad malleolos externos.  
o. o Ligamenta Peroneis brevibus propria.  
p. p Ligamenta propria Peroneorum longorum.  
q. q Ligamenta, quibus tendines in confinio crurum dorforumque pedum retinentur.  
r. r Tendines Extensorum longorum digitorum pedum.  
s. s Tendines Peroneorum tertiorum, inserti ossibus metatarsi digitorum minimorum.  
t. t Extensores breves digitorum pedum.  
u w x y z. u w x y z Abductores digitorum minimorum pedum. u hac parte tectus aponeurosi. w ortus à calcaneo. x aponeurosis, qua tectus est, pars ossi metatarsi digiti minimi inserta. y tendo Abductoris, insertus ossi primo minimi. z aponeurosis ad Extensoris longi digitorum pedum tendinem illum accedens, qui digiti minimi est.  
α β. α Flexores breves digitorum minimorum pedum. α pars, quae inserta ossi metatarsi minimi. β pars, quae ossi primo minimi, extremo tendineo.  
γ γ Tendo Flexoris longi pollicis pedis, inter ossa sesamoidea incedens.  
δ Abductor pollicis pedis.  
ε Flexor brevis digitorum pedis.  
ζ η θ ι κ λ μ ν. ζ η θ ι κ λ μ Deltoidei. ζ η η primi ordinis portionum, è quibus constat, secunda eademque posterior, η η oriens à spina & processu superiore scapulae. θ ι secundi ordinis portio posterior, ι oriens à processu superiore. κ λ primi ordinis portio quarta, λ oriens à cubito flectentis se processus superioris. μ ν secundi ordinis portio media, ν oriens à processu superiore.  
ξ ο π ρ σ τ υ φ χ. ξ ο π ρ σ τ υ φ χ Tricipites brachiorum. ξ Brevis. ο Longus. π Brachialis externus. ρ tendo communis trium horum capitum. σ pars tendinea, quam Longus efficit & tendini communi adjungit. τ dextri brachii, pars tendinea, quam Brachialis externus efficit, adjungitque tendini communi: in sinistro τ apposita ad exortum partis illius è carne. υ pars tendinea è superficie Brachialis externi oriens, & ad condylum humeri majorem pertinens. φ tendo communis olecrano insertus. χ ejusdem tendinis mucro tenuior, priori parti olecrani proximaeque spinae ulnae insertus.  
ψ. ψ. Brachiales interni.  
ω. ω Supinatores longi.  
A B C D D D D. A B C Radiales externi longiores. B ortus à condylo minore humeri. C conjunctio ortusque communis cum Extensore communi digitorum & Ulnari externo. D D D D tendo, insertus ossi metacarpi indicis.  
E. E Brachiales externi, orientes à radicibus condylorum minorum.  
F G. F Anconeus. G tendo, oriens à condylo minore humeri.  
H. H I I I Radiales externi breviores. I I I tendo.  
K. K Profundi, ab ulnis orientes.  
L. L Palmares longi.  
M. M N O P Q Sublimes. N portio ad digitum medium pertinens, O ad indicem, P ad annularem, Q auricularem.  
R S T V. R S T V Ulnares interni. S T. principia, S alterum oriens à condylo majore humeri, cohaerensque cum capite tendineo communi musculorum à condylo illo orientium: T alterum, ab olecrano oriens. V tendo, insertus ossi subrotundo carpi.  
W X Y Y. W X Y Z Ulnares externi. X principium conjunctum cum principio Extensoris communis digitorum. Y Z tendo, Z pertinens ad os quartum metacarpi manus. Inter tendinem Z & tendinem c in dorso manus dextrae, tendo exilis ab hoc Ulnari externo ad digitum minimum pertinens.  
a b c c. a b c c Extensores proprii digitorum auricularium. b principium cum principio Extensoris communis digitorum conjunctum. c c tendo, qua per dorsum manus decurrit, leviter fissus.

In cubitis,  
manuque  
dextra.



# TABULAE MUSCULORUM QUINTAE EXPLANATIO.

- d. d e f f g h i k l m n o p p q r r s Extensores communes digitorum manuum. e f f g h i k l m n o portio ad annularem pertinet, f f tendo, qui ad annularem decurrit, in progressu per dorsum manus incisuras habens. g tendinis hujus ramus, qui se deinde findit in duos, quorum alter h adjungit se tendini c auricularis, non tamen semper inventus; alter i rursus in duos se dividit, alteroque k pariter accedit ad tendinem c auricularis, altero (inter k & f inferius) ad truncum f tendinis annularis: l portio à tendine f abscedens, accedensque ad tendinem c auricularis: m portio tendinea, qua truncus tendinis f ad annularem decurrentis cum tendine c auricularis conjunctus ad initia digitorum; quae portio fit ex portionibus k & l, & infra hanc aponeurosi à tendine f abscedente, confluentibus in unum. n ramus, adjungens se tendini p digiti medii, non semper inventus. o portio tendinea, qua truncus tendinis f ad annularem decurrentis, cum tendine p medii juxta digitorum radices conjunctus; fitque haec portio ex tendine n conflente cum aponeurosi, quae à trunco f tendinis annularis juxta radicem digiti illius abscedit. p p tendo ad digitum medium, in quo incisura, qua per manum incedit. q r r portio ad indicem pertinet, r r tendo. s aponeurosis, quae à tendine p medii orta, ad tendinem r indicis accedit, eosque juxta digitorum initia connectit inter se.
- t Tendo Indicatoris.
- u Tendo per indicem deinde procedens, factus ex tendine t Indicatoris cum tendine r Extensoris communis qui ad indicem pertinet, conflente in unum communem.
- v. w. x. y. z. z. z. z. z. Tendines Extensorum digitorum, qua per digitos incedunt, conjuncti cum tendinibus & aponeurosis Interosseorum, Lumbricalium, &c. v indicis, factus ex tendine t Indicatoris conjuncto cum tendine r ab Extensore communi. w medii, x annularis; qui duo sunt Extensoris communis. y auricularis, qui fit ex tendine c Extensoris auricularis proprii, conjuncto cum portionibus h & k l m ab Extensore communi accedentibus, portioneque ab Ulnari externo. z. z. z. z. extrema horum tendinum, inserta ossibus secundi ordinis.
- α Aponeurosis, quae à capsula articuli digiti hujus cum metacarpo suo, pertinet ad tendinem extensorem y.
- β γ Abductor digiti auricularis. γ tendo.
- δ ε Communis tendo Abductoris Flexorisque parvi digiti minimi manus, δ conjunctus cum tendine y, acceptaque ab eodem portione auctus, ε decurrens ad os tertium.
- ζ Aponeurosis, quae accedit ad tendinem y, superiore parte sui veniens è capsula articuli hujus digiti cum metacarpo, inferiore producta à tendine
- η Interossei auricularis, cum quo tendine conjunctus tendo Lumbricalis quarti.
- θ Tendo Interossei auricularis, cui se adjungit tendo Lumbricalis quarti.
- θ i Tendo qui Interosseo auricularis & Lumbricali quarto communis, θ conjunctus cum tendine y, acceptaque ab eo portione auctus, i decurrens ad os tertium.
- κ Commune extremum, in quod se conjungunt tendines ε. i, pertinet ad os tertium.
- λ Aponeurosis, quae accedit ad tendinem x, superiore parte sui veniens è capsula articuli hujus digiti cum metacarpo: inferiore producta à tendine
- μ Interossei posterioris digiti annularis.
- μ μ ν ξ ο Interosseus posterior digiti annularis. ν tendo, qui se deinde ξ conjungit cum tendine x, acceptaque ab eo portione auctus, ο decurrit ad os tertium.
- π Aponeurosis, quae accedit ad tendinem x, superiore parte sui veniens è capsula articuli hujus digiti cum metacarpo: inferiore producta à tendine
- g Interossei prioris digiti annularis, cum quo tendine conjunctus tendo Lumbricalis tertii.
- ε Tendo Interossei prioris digiti annularis, cui se adjungit tendo Lumbricalis tertii.
- σ τ Tendo, qui Interosseo priori annularis & Lumbricali tertio communis, σ conjunctus cum tendine x, acceptaque ab eo portione auctus, τ decurrens ad os tertium.
- υ Commune extremum, in quod se conjungunt tendines α. τ, pertinet ad os tertium.
- φ Aponeurosis, quae accedit ad tendinem w, superiore parte sui veniens è capsula articuli hujus digiti cum metacarpo suo: inferiore producta à tendine
- ψ Interossei posterioris digiti hujus medii.
- χ ψ ω Γ Interosseus posterior digiti medii. ψ tendo, qui se deinde ω conjungit cum tendine w, acceptaque ab eo portione auctus, Γ decurrit ad os tertium.
- Δ Aponeurosis, quae accedit ad tendinem w, superiore parte sui veniens è capsula articuli digiti hujus cum metacarpo suo: inferiore producta à tendine
- Ξ Interossei prioris digiti hujus medii, cum quo tendine conjunctus tendo Lumbricalis secundi.
- Θ Θ Θ Λ Ξ Interosseus prior digiti medii. Θ Θ Θ Λ capita, orientia, Θ Θ Θ ab osse metacarpi indicis, Λ à medii. Ξ tendo, cum quo conjunctus tendo Lumbricalis secundi.
- Π Σ Tendo, qui Interosseo priori digiti medii communis cum Lumbricali secundo, Π conjunctus cum tendine w, acceptaque ab eo portione auctus, Σ decurrens ad os tertium.
- Φ Commune extremum, in quod se conjungunt tendines Γ. Σ, pertinet ad os tertium.
- Ψ Aponeurosis, quae accedit ad tendinem v, superiore parte sui veniens è capsula articuli hujus cum metacarpo suo: inferiore producta à tendine
- 2 Interossei posterioris digiti hujus indicis.
1. 2. 3. 4 Interosseus posterior indicis. 2 tendo, qui se deinde 3 conjungit cum tendine v, acceptaque ab eo portione auctus, 4 decurrit ad os tertium.
5. 6 Aponeurosis, quae accedit ad tendinem v, superiore parte sui 5 producta ab Abductore indicis, inferiore 6 à Lumbricali primo.
- 7 Lumbricalis primi tendo, qui se deinde 8 conjungit cum tendine v, acceptaque ab eo portione auctus, 9 decurrit ad os tertium.
- 10 Commune extremum, in quod se conjungunt tendines 4. 9, pertinet ad os tertium.
- 11 Interosseus prior indicis.
- 12 Abductor indicis.
- 13 Tendo Extensoris majoris pollicis manus.
14. 15 Ligamentum, quod coercent tendinem Ulnaris externi, oriens à radio inter Ulnarem illum & Extensorem auricularis; definens ad tendinem Ulnaris interni, 15 hac parte conjunctum cum ligamento 16.
16. 17. 18. 19 Ligamentum armillare exterius. ortus, 17 ab osse subrotundo, 18 triquetro, 19 eminentia radii, quae finem, per quem tendines Radialium externorum incedunt, à priori parte terminat.
- 20 Ligamentum, quo continentur tendines Abductoris longi & Extensoris minoris pollicis manus, una parte oriens ab eminentia radii, à qua & ligamentum 16.
21. 22. 23. 23 Abductor longus pollicis manus. 22 tendo partis superioris. 23. 23 tendo partis inferioris.
24. 25 Extensor minor pollicis manus. 25 tendo.
- 26 Commune extremum, in quod conflunt tendinis 13 Extensoris majoris pollicis, & 25 minoris, pertinet ad os tertium.
27. 28 Aponeurosis, quae se adjungit extremo communi 26 tendinum Extensorum pollicis: cujus aponeurosis pars 27 ambit capsam articuli pollicis cum metacarpo suo, innexaque capsae illi; pars 28 procedit à Flexoris pollicis brevis cauda posteriore.
- Inter 27 & 29 Cauda posterior Flexoris brevis pollicis manus.
29. 30 Adductor pollicis manus. 30 extremum tendineum, insertum ossi primo pollicis.
- α β Ligamentum armillare exterius, β insertum ossi subrotundo, & continuatum ligamento γ δ.
- γ δ Ligamentum. quod continet tendinem Ulnaris externi, δ definens ad tendinem Ulnaris interni.
- ε Pronator quadratus.
- ζ Ligamentum, quod cum finu carpi canalem efficit, quo coercentur tendines qui à cubito ad manum procedunt, Sublimis, Profundi, Flexoris longi pollicis.
- η Tendinis Abductoris longi pollicis manus portio, quam dat Abductori brevi.
- θ i x Abductor brevis pollicis manus. hic partem accipit ab aponeurosi Palmaris longi. κ extremum tendineum, una cum aponeurosi, quam dat tendini Extensorum pollicis.
- λ Pollicis manus Flexoris brevis pars, quae pro Abductore ejus brevi altero haberi potest: extremo tendineo inserta ossi primo pollicis.
- μ Duo ligamenta, quibus coercentur tendo Flexoris longi pollicis: alterum superius ad locum articuli pollicis cum metacarpo suo: alterum mox infra superius, ossis primi marginibus affixum, primo simplex, dein fissum in cornua duo.
- ν ν Tendo Flexoris longi pollicis manus, insertus ossi ultimo pollicis.
- ξ Cauda posterior Flexoris brevis pollicis manus, inserta ossi primo, & scissimodeo posteriori.
- ο Lumbricalis primus.
- π Adductor pollicis manus.
- ε Aponeurosis Palmaris longi.
- σ σ Palmaris brevis.
- τ υ φ Abductor digiti minimi manus. υ φ ortus, υ ab osse subrotundo, φ à ligamento carpi interiore.
- χ Flexor parvus digiti minimi manus.
- ψ Tendo communis Flexori parvo digiti minimi manus cum Abductore ejusdem, adjunctus tendini extensori digiti illius.
- ω Tendinis extensoris digiti minimi extremum ad os secundum pertinet.
- Γ Tendo ad os tertium decurrens, factus ex tendine ψ, accedenteque ad eum portione tendinis extensoris minimi.
- Δ. Δ Tendinis iidem qui ο τ υ, 4. 9. 10, in manu dextra.
- Θ Ligamentum, quo coercentur tendo Sublimis & Profundi, qua secundum os primi ordinis incedunt.
- Α Tria ligamenta, quibus coercentur tendines Sublimis & Profundi, circa articulum digiti cum metacarpo. Litteram soli medio inscripsi, cui ab utraque parte unum adstat.
- Ξ Sublimis & Profundi tendines.
- Π Tendo Profundi cum cornu uno Sublimis.
- Σ Tendo Profundi.
- Eadem, Θ Λ. Ξ. Π. Σ in reliquis digitis indicata.











# TABULAE ANATOMICAЕ SEXTAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

**S**ECUNDUM ab hac parte ordinem Musculorum hac figura expressi, una cum ali-  
quot ligamentis, Sceletique partibus nudis, & parte scroti. Respondet figurae Ta-  
bulae secundae, cujus est facies posterior: à qua tamen figura hoc differt, quod  
Sternomastoidei una cum Cleidomastoideis in hac remoti sint; quos nempe Tabula quinta  
fatis jam ab hac parte exhibui.

Eorum, quae in Tabula proxime superiore exstant, remota haec: à ca-  
pite Epicranii, Attollens auriculam, Anterior, & tres Retrahentes auricu-  
lae, auricula, Orbicularis palpebrarum, Zygomaticus major, Latissimus  
colli. A collo, dorso, lumbis, Sternomastoidei cum Cleidomastoideis,  
Cucullares, Latissimi dorsi, Obliqui externi abdominis: praeterea à dorsi  
parte sinistra Rhomboideus minor & major. A coxis & natibus Glutei  
magni. A femoribus Sartorii. A cruribus Gemelli. A pedibus extremis  
ligamenta quibus tendines juxta malleolos internos retinentur, ligamenta  
quibus tendines Peroneorum longorum & brevium retinentur ad malleolos  
externos, ligamenta Peroneis brevibus propria, ligamenta Peroneis longis  
propria, ligamenta quibus tendines in confinio crurum dorsoque pedum  
retinentur, Abductores digitorum minimorum pedum, aponeuroses ad  
Extensorum longorum digitorum pedum tendines illos accedentes, qui di-  
gitorum minimorum sunt. Ab humeris Deltoidei. A cubitis manuumque  
principiis Supinatores longi, Extensores communes digitorum manuum,  
Extensores proprii digitorum auricularium, Ulnares externi, Palmares lon-  
gi, ligamenta armillaria exteriora, ligamenta quae coercent tendines Ulna-  
rium externorum. Praeterea ab extrema parte cubiti dextri ligamentum quo  
continentur tendines Abductoris longi & Extensoris minoris pollicis. Prae-  
tereaque à manu sinistra Palmaris brevis, Abductor brevis pollicis, ligamen-  
ta quibus coercentur tendo Flexoris longi pollicis, ligamenta quibus coercentur  
tendines Sublimis & Profundi circa articulos digitorum cum metacarpo,  
& quibus ad ossa prima digitorum.

In capite,  
cervicis,  
dorso.

A B B B C D Temporalis. B B B C primum originis initium, B B B ab  
eminencia ossis verticis, C mamillaris. D tendo.  
E F G H Masseter. E F portio exterior, F extremum, maxillae insertum.  
G H portio interioris pars posterior, quae nuda à portione exteriori;  
H ortus ejus à processu zygomatico ossis temporis, & ab osse jugali.  
I Pterygoideus internus, maxillae insertus.  
K Mylohyoideus, à maxilla oriens.  
L Biventer maxilla venter primus.  
M N. M N Biventer cervicis. N extremum tendineum ossi occipitis insertum.  
Mox infra O Interspinales colli duo, qui inter spinam colli sextae & quintae.  
P Q R S. P Q R S Splenii capitis. Q principium, à ligamento cervicis  
oriens. R S extremum tendinosum, insertum R ossi occipitis, S ossi mam-  
millari & processui mamillari.  
T. T U V Splenii colli. U. V principia, quorum alterum U oritur a spi-  
na vertebrae decimae dorsi, V alterum à nonae..  
W. W Trachelomastoidei.  
X. X Longissimorum dorsi portiones ad collum excurrentes.  
Y. Y Transversales cervicis.  
Z a. Z a Levatores scapularum. a principium à scapula oriens.  
æ b. æ b c d e f g h i k l Serrati postici superiores. æ pars tendinea, b car-  
nea. c d e f origo, c à ligamento cervicis, d spina imae vertebrae colli,  
e summae dorsi, f undecimae dorsi, g. h. i. k l quatuor extrema, quorum  
g pertinet ad costam secundam, h ad tertiam, i ad quartam, k l ad quin-  
tam, hac l parte insertum quintae.  
m n o Rhomboideus minor. n principium tendineum, oriens à ligamento  
cervicis. o extremum scapulae insertum. Sinister remotus.  
p p q r s t u v w x Rhomboideus major. p p principium tendineum. q pars  
carnea. r s t u v origo à spinis vertebrarum, r colli imae, s dorsi duode-  
cimae, t undecimae, u decimae, v nonae. w hac parte se secundum ba-  
sem scapulae curvat, non inserit. x x hac inserit. Sinister remotus.  
y Biventer cervicis.  
z Semispinalis dorsi.  
α β γ δ ε ζ η θ ι. α β γ δ ε ζ η θ ι Spinales dorsi. β cauda, qua pertinet  
ad spinam vertebrae dorsi undecimae: γ qua ad decimae: δ qua ad non-  
ae: ε qua ad octavae: ζ qua ad septimae: η qua ad sextae: θ qua ad  
quintae. ι caput, quo oritur à spina tertiae.  
κ λ. κ λ Longissimi dorsi. λ pars tendinea.  
μ ν ξ ο π ρ σ τ υ. μ ν ξ ο π ρ σ τ Sacrolumbales. μ pars carnea. ν cauda ten-  
dinea, quae pertinet ad costam nonam: ξ quae ad octavam, ο quae ad  
septimam: π quae ad sextam: ρ quae ad quintam: σ quae ad quartam:  
τ quae ad tertiam: υ quae ad primam.  
φ χ. ψ. ω. Γ. Δ Δ. Θ. Λ. ω. Γ. Δ Δ. Θ. Λ Intercostales externi. φ quar-  
tus cum Levatore costae quintae, χ quintus, ψ sextus, ω septimus,  
Γ octavus, Δ Δ nonus, Θ decimus, Λ undecimus.  
Ξ. Ξ Intercostales interni undecimi.

Π Σ Φ Ψ Ω A B. Π Σ Φ Ψ Ω A B Serrati magni. Σ caput, quod oritur à  
costa quinta: Φ quod à sexta: Ψ quod à septima: Ω quod ab octava: A  
quod à nona: B quod à decima.  
C D E E F G G H I K L. C D E E F G G H I K L Serrati postici infe-  
riores. C pars tendinea. D F H K pars carnea. D extremum primum,  
E E insertum costae nonae. F secundum, G G insertum decimae. H ter-  
tium, I insertum undecimae. K quartum, L insertum duodecimae.  
M N O O P Q R S T. M N O O P Q S T Obliqui interni abdominis.  
M pars carnea. N pars tendinea. O O principium tendineum, oriens à  
crista ilium. P Q extremum insertum costae duodecimae, P parti osseae,  
Q cartilagineae. R S extremum insertum costae undecimae, R parti os-  
seae, S cartilagineae. T extremum, quod ad costam decimam pertinet.  
U V W X Y Z a b b b. U V W X Y Z a b b b Latitendines, quibus La-  
tissimi dorsi incipiunt. V W ortus ejus à spinis vertebrarum dorsi duarum  
inferiorum, omniumque lumborum & ossis sacri. X Y ortus à processibus  
duobus obliquis, qui sunt à latere hiatus, in quem canalis ossis sacri ab  
inferiore parte exit. Y Z hac parte cohaerebat cum Gluteo magno. a or-  
tus à crista ilium. b b b hinc rescissus latus ille tendo, ubi subtus non am-  
plius cohaeret cum lato tendine, quo incipiunt Serratus posticus inferior  
& Obliquus internus abdominis.  
c. c Multifidi spinae.  
d. d Coccygei.  
e. e Levatores ani.  
f Sphincter externus ani.  
g. g Transversi alteri perinaei, orientes ab ossibus pubis.  
h. h Transversi perinaei, orientes ab ischiis tuberibus.  
i k k k l. i k k k l Glutei medii: in quibus vestigia à magnis impressa: confer  
Tab. V. k k k origo ab osse ilium. l tendo, trochanteri majori insertus.  
m Psoas magnus.  
n o p. n o p Pyriformes. o ortus ab osse ilium. p tendo.  
q r. q r Geminorum superiores. r tendineum extremum.  
s t u. s t u Geminorum inferiores. t ortus ab ischii tubere. u extremum  
tendineum.  
v v. v v Obturatores externi.  
w x y. w x y Obturatores interni. w pars in pelvi sita; cujus ibi x ori-  
go à priore parte ambitus foraminis magni ossis coxarum. y pars quae per  
dorsum ilium inter Geminos incedit.  
z α α. z α α Quadrati femorum. α α extremum ossi femoris insertum.  
β γ δ δ. β γ δ δ Vasti externi. γ pars tendinosa. δ δ ortus ab osse femoris.  
ε ε ζ ζ η θ θ. ε ε ζ ζ η θ θ Adductores magni femorum. ζ ζ origo ab ischii  
tubere. η principii pars tendinosa. θ θ pars extremi, ossi femoris inserta.  
θ ι κ λ λ μ ν ξ. θ ι κ λ λ μ ν ξ Bicipites crurum. θ ι x caput longius. ι x  
tendo, quo incipit, oriturque x à dorso tuberis ischii, à principio con-  
junctus cum principio Semitendinosi. λ λ caput brevius. μ ν ξ tendo  
communis, in quem definunt duo capita; μ oriens primum è superficie  
carnis capitis longioris, ν auctus deinde accessione capitis brevioris, ξ  
posteaque brevi extremo pertinet ad caput superius fibulae.  
ο π ρ σ σ. ο π ρ σ σ Semitendinosi. π principii pars tendinea, ρ oriens à  
dorso tuberis ischii, & deinde conjuncta cum principio tendineo capitis  
longioris Bicipitis cruris, à quo principio abscedit. σ carnea principii  
partis, quae aliis tendinea, ortus à dorso tuberis ischii. σ tendo.  
ς τ. ς τ Graciles. τ tendo.  
υ υ Vasti interni.  
φ φ χ ψ ω Γ. φ φ χ ψ ω Γ Semimembranosi. χ tendinis ex carne ortus,  
ψ tendo. ω pars tendinis insignior, inserta eminentiae obliquae & inae-  
quabili, quae est infra posteriorem partem radicis capitis superioris tibiae,  
qua illud condylum anteriorem femoris sustinet. Γ portio tenuior, quam  
tendo emittit, pertinet ad marginem internum tibiae.  
Δ Δ Gemellorum crurum capita interiora, Θ. Θ exteriora, recisa.  
Λ Δ Ξ Π. Λ Δ Ξ Π Poplitei. Ξ tendo, quo incipit. Π superficies tendinosa.  
Σ Φ. Σ Φ Plantares. Φ tendo.  
Ψ Ψ Ω Ω A B B. Ψ Ψ Ω Ω A B B Solei. Ω Ω superficies tendi-  
nosa, qua tendo in posteriore parte incipit. A ortus à capite superiore fi-  
bulae. B B nota incisurae similis, ubi intus in carne pars tendinea, car-  
nem illam septi tendinei modo distinguens.  
C. C Rescissi Gemellorum tendines.  
D E. D E Tendines Achillis, E. E inserti calcaneis.

In latere  
thoracis,  
& inferiore  
trunci  
parte.

In femo-  
ribus, cru-  
ribus, &  
pedibus  
extremis.
















# TABULAE ANATOMICAE SEPTIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

**T**ERTIUS ab hac parte Musculorum ordo sequitur, una cum aliquot ligamentis, Sceletique partibus nudis; remotis scilicet plerisque partibus primis figurae proxime superioris. Haec figura respondet figurae Tabulae tertiae, ejusque posterior facies est, his differens; primum, quod Sphincter ani externus in hac remotis sit, ut qui Tabula sexta satis jam exhibitus: deinde, quod in hujus manu dextra, contra quam in Tabula tertia, exhibitus sit tendo Abductoris digiti minimi, itemque communis Abductori illi cum Flexore parvo; ne hac parte deminueretur syntaxis tendinea per dorsum digiti minimi porrecta.

Remota haec, à capite Temporalis, Masseter, Biventer maxillae. A cer- vice, dorso, lumbis, Splenii capitis & colli, Levatores scapularum, Rhom- boidei minores & majores, Serrati postici superiores, Serrati magni, Serra- ti postici inferiores & Obliqui interni abdominis una cum latis tendinibus qui- bus Latissimi dorsi incipiunt. A coxis & natum locis, Glutei medii, Pyriformes, Geminorum superiores & inferiores, Quadrati femorum, Coccygei, Le- vatores ani, Transversi perinaei, Transversi perinaei alteri, Sphincter ani exter- nus. Testes. A femoribus Semitendinosi, Bicipitum crurum capita longiora, Vastii externi & interni. A cruribus Plantares, Solei cum tendinibus Achillis. A pedibus extremis tendines Extensorum communium digitorum pedum, & Peroneorum tertiorum, Flexores breves digitorum minimorum pedum, Flexo- res breves digitorum pedum. A scapulis Coracohyoidei, Subclavius, Supra- spinati, Infra-spinati, Teretes minores. Ab humeris Bicipites brachiorum, Longi, Breves. A cubitis manibusque, Anconeus, Abductores longi pol- licum manuum, Extensores minores eorundem, & majores, Indicadores, Ulnares externi, Sublimes. A manu sinistra Abductor & Flexor brevis di- giti auricularis, pars Flexoris pollicis brevis quae pro Abductore ejus brevi altero haberi potest, Opponens pollicis. A manu dextra Abductor digiti minimi manus, Interossei posterioris digiti annularis caput ab osse metacar- pi auricularis oriens, Interossei posterioris digiti medii caput ab osse metacar- pi annularis oriens. Interossei prioris digiti medii caput ab osse metacarpi in- dicis oriens, Abductor indicis, Aponeurosis, quae ambit capsam articuli pol- licis cum metacarpo suo, innexa capite illi, seseque adjungens extremo com- muni tendinum Extensorum pollicis.

In capite,  
cervice,  
trunco.

a Buccinator.  
b Portio ad Orbicularem oris accedens, orta à maxilla inferiore.  
c Pterygoideus internus, maxillae insertus.  
d e e Mylohyoideus. e e origo à maxilla.  
f g h i k l m n. f g h i k l m n Biventer cervicis. f venter primus.  
g tendo inter ventres medius. h portio à spina vertebrae summae dorsi oriens, quae portio accedit partim i ad tendinem medium, partim k ad ventrem secundum. l l venter secundus, m m extremo tendineo insertus os occipitis. n plaga tendinea ventris secundi.  
o o. o o Spinales cervicis.  
p. q. r. s. t Inter-spinales cervicis sinistri. His proximi dextri. p qui inter spinas vertebrae colli primae & secundae: q secundae & tertiae: r tertiae & quar- tae: s quartae & quintae: t quintae & sextae.  
u v. u v. Complexi. v plaga tendinosa.  
w. w x Obliqui superiores capitis. x hac parte insertus os occipitis.  
y. y Obliqui inferiores capitis.  
z A B. z A B Trachelomastoidei. A pars tendinea. B extremum tendino- sum, processui mamillari insertum.  
C C. C C Transversales cervicis.  
D. D Cervicales descendentes.  
E. E Scaleni medii.  
F G H. F G H Scaleni postici. F principium à costa secunda oriens. G cauda pertineans ad processum transversum vertebrae colli tertiae, H ad secundae.  
I. K. L. M. I. K. L. M Levatores costarum. I secundae, K tertiae, L quar- tae, M quintae.  
N. O. P. Q. R R. S S. T. U. V. W: N. O. P. Q. R. S S. T. U. V. W In- tercostales externi. N secundus, O tertius, &c.  
X. X Intercostrales interni undecimi.  
Y Z α β. Y Z α β Transversi abdominis. Y pars carnea. Z latus tendo, quo incipit; α β adhaerens imo margini costae duodecimae, α parti os- seae, β cartilagineae, ad mucronem usque.  
γ γ. γ γ Lamellae interiores aponeurosum communium Serratorum postico- rum inferiorum & Obliquorum internorum abdominis; ibi rescissae, ubi cum latis tendinibus, quibus Transversi abdominis incipiunt, non am- plius cohaerent.  
δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω. δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω Sacrolum- bales cum Longissimis dorsi. δ ε ζ η θ ι κ λ μ caput commune, quo in- cipiunt. δ pars tendinea, ε carnea. ζ η θ hac parte caput illud oritur à

crista ossis ilium, ζ parte carnea, η θ tendinea. θ hac parte cum Glu- teo magno cohaeret. ι κ pars tendinea, oriens à tuberculis duobus su- perioribus, quae sunt juxta hiatum extremi canalis ossis sacri. κ κ pars ten- dinea interrupta; constans è tendinibus à spinis vertebrae lumborum duarum inferiorum, omnibusque ossis sacri orientibus. λ tendo oriens à spina vertebrae lumborum tertiae. μ capitis hujus communis divisio in Sa- crolumbalem & Longissimum dorsi.

ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Γ Δ Θ Λ Ξ Π. ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Γ Δ Θ Λ Ξ Π Sacrolumbales. ν ξ. &c. caudae ad costas pertinentes: ν ξ ad undecimam, ο π decimam, ρ σ nonam, ς σ octavam, τ υ septimam, φ χ sextam, ψ ω quintam, Γ Δ quartam, Θ Λ tertiam, Ξ secundam, Π primam: ν. ο. ρ. σ. τ. φ. ψ. Γ. Θ earum carnea partes, ξ. π. σ. ς. υ. χ. ω. Δ. Λ. Ξ. Π tendineae.

Σ Φ Ψ Ω. Σ Φ Ψ Ω Longissimi dorsi. Φ pars tendinea capitis communis, per Longissimum excurrens. Ψ cauda per cervicem ascendens, ubi por- tionem tendineam Ω dat Trachelomastoideo, & ad postremum se cum Cervicali descendente conjungit.

a b c d e g h. a b c d e g h Semispinales dorsi. b caput à processu transver- so vertebrae dorsi a lumbis sextae oriens. c extremum tendineum, quod insertum spinae vertebrae colli à dorso secundae; d quod primae; e quod summae dorsi; g quod undecimae dorsi; h quod decimae.

i k l m n p q r s t u v w. i k l m n p q r s t u v w Spinales dorsi. k caput, tendineo principio oriens à spina vertebrae dorsi à lumbis tertiae; l caput à secundae; m à primae, n à quintae lumborum; p à quartae. q extre- mum, tendine suo, in quem abit, pertineans ad spinam vertebrae dorsi quin- tae; r extremum ad sextae; s ad septimae; t ad octavae; u ad nonae; v ad decimae; w ad undecimae.

Inter capita Spinalium dorsi juxta spinas, & inter Longissimorum dorsi partes λ κ, Multifidi spinae.

Inter spinas vertebrae dorsi trium inferiorum, Interspinales dorsi.

Inter spinam vertebrae imae dorsi summaeque lumborum, interque spinas ver- tebrarum lumborum, & inter spinam imae lumborum summaeque ossis sacri, Interspinales lumborum. Litterae inscribi illis omnibus ob locorum angustiam nequiverunt: ad cognoscendos juvabit Tabula VIII.

x. x Multifidi spinae.

y. y Psoae magni.

z Γ Γ Γ Δ. z Γ Γ Γ Δ Glutei minores. Γ Γ Γ origo à dorso ossis ilium.

Δ pars tendinea, quo extremum tendineum ab exteriori parte carnis incipit.

Θ Λ Λ Λ Ξ Π. Θ Λ Λ Ξ Π Obturatores interni. Θ pars in pelvi sita, ibi- que Λ Λ Λ oriens ab ambitu foraminis magni ossis coxae. Ξ Π pars, quae per ischii dorsum ad os femoris incedit; Π tendo, in quem abit.

Σ Σ Φ. Σ Σ Φ Obturatores externi. Φ extremum tendineum.

Ψ. Ψ Iliaci interni.

Ω. Ω Tendines communes Psois magnis & Iliacis internis, inserti trochan- teribus minoribus.

A B C D E F G. A B C D E F G Semimembranosi. A tendo, quo inci- pit, oriturque B à dorso tuberis ischii. C venter carneus. D caudae ten- dineae ortus ex carne. E pars caudae illius praecipua, pertineans ad caput superius tibiae: F ejusdem aponeurosis posterior, quam tibiae infra radi- cem capitis ejus superioris inserit: G aponeurosis prior, quam inserit mar- gini interno tibiae. Capiti ejus, ventrique, à Semitendinoso sinus im- pressus: confer Tab. VI.

H I. H I Graciles. I tendo.

K L M N O O. K L M N O O Adductores magni femorum, quibus ves- tigia à Gluteis magnis impressa: confer Tab. V. L pars ab osse pubis oriens. M ortus ab ischii tubere, parte extrinsecus tendinea. N O O ex- tremum superius, O O ossi femoris insertum.

P Q R S. P Q R S Bicipitum crurum capita breviora. Q rescissa pars ten- dinis, quae à capite longiore oritur. R pars tendinis, quae augetur ac- cessione carnis capitis brevioris. S extremus tendo, insertus capiti supe- riori fibulae.

T. T Gemellorum crurum capita exteriora, U. U interiora; recisa.

V. V Plantares, recisi.

In coxis,  
femoribus,  
cruribus,  
pedibus,  
extremis.



# TABULAE MUSCULORUM SEPTIMAE EXPLANATIO.

W X Y. W X Y Poplitei. X tendo, quo incipit. Y pars tendinosa.  
 Z a b c d e. Z a b c d e Tibiales postici. a pars, quae à tibia oritur: b pars, quae à fibula. c. d superficies tendinosae. e tendo.  
 f g. f g Flexores longi digitorum pedum. g tendo.  
 h i k. h i k l l Flexores longi pollicum pedum. i origo à tibia. k tendo, l l hac parte per plantam pollicemque procedens.  
 m n o o p q r s t. m n o o p q r s t Peronei longi. n principium alterum, à capite fibulae oriens. o o alterum, à spina fibulae. p q r s t tendo, p hac parte ex carne oriens: r. s. t nodi tendinis, r primus, qua se ad malleolum externum flecit; s secundus, qua ad eminentiam, quae est in latere externo calcanei; t tertius, qua ad cubiforme.  
 u v w x. u v w x Peronei breves. v tendinis pars è carne oriens: w tendo, x insertus ossi metatarsi digiti minimi.  
 y z α β. y z α β Extensores breves digitorum pedum. z cauda pertinet ad digitorum parvorum tertium, α ad secundum, β ad primum.  
 γ γ. γ γ Tendines per dorsum horum digitorum porrecti.  
 δ δ Capita, quae ad Flexores longos digitorum pedum in plantis accedunt.  
 ε ε Interossei digitorum minimorum.  
 ζ Tendines Flexorum longorum digitorum pedum, una cum Lumbricalibus; obiter.  
 η Flexoris brevis pollicis pedis cauda, quae pertinet ad os sesamoideum, quod proximum digito primo parvorum.  
 θ θ Tendines Flexorum longorum digitorum pedum, ad hos digitos pertinentes.  
 ι ι Subscapulares.  
 λ μ. λ λ μ Teretes majores. λ ortus ab angulo scapulae. μ pars tendinosa.  
 ν ν Coracobrachiales.  
 ξ ο ο π ρ σ. ξ ο ο π ρ σ Brachiales externi; quibus vestigia à Longis & Brevibus impressa: confer Tab. VI. ο ο ο ortus ab offe humeri, π à radice condyli prioris. ρ pars tendinosa. σ pars tendinea è superficie Brachialis externi oriens, & ad condylum humeri majorem pertinet.  
 ς Carnea pars Longi recisa. ς Brevis rescissa pars, quae extus tendinea, intus carnea. τ Hinc rescissa est pars tendinis communis trium capitum Tricipitis brachii. υ φ χ ψ Tendo communis Tricipitis brachii, φ olecrano insertus. χ pars tendinea, quam Longus efficit & tendini communi adjungit: ψ pars tendinea, quam Brachialis externus efficit, tendini communi adjungit.  
 ω A. ω A Brachiales interni, quibus finus à Supinatoribus longis impressi: confer Tab. VI. A cornu exterioris ortus ab offe humeri.  
 B C C D. B C C D E F Radiales externi longiores. C C ortus à margine priore offis humeri, & à condylo priore. D hac parte conjunctus est communemque ortum habet cum Extensore communi digitorum manus & Ulnari externo. E tendo, F insertus ossi metacarpi indicis.  
 G. G H I Radiales externi breviores. Sinus eis ab Extensoribus digitorum communibus impressi: confer Tab. VI. H tendo, I insertus ossi metacarpi digiti medii, itemque indicis.  
 K L M N N. K L M N N Supinatores breves. L M tendinea principii pars, L à condylo priore offis humeri oriens, & M connexa cum capsula articuli cubiti. N N pars principii ab ulnae eminentia oriens, extrinsecus tendinosa.  
 O. O Flexores longi pollicum manuum.  
 P. P Pronatores quadrati.  
 Q R S S. R S S T T U U V V W W Profundi. S S ortus ab ulna. T T tendo ad digitum minimum pertinet, U U U tendo ad annularem, V V ad medium, W W ad indicem.  
 X X Y Tendo Flexoris longi pollicis manus, Y insertus ossi ultimo pollicis.  
 Z Γ Δ Θ Ligamentum, quod cum sinu carpi canalem efficit, quo tendines coeherentur, qui à cubito ad manum procedunt, Sublimis, Profundi, Flexoris longi pollicis. Γ ortus ejus ab offe subrotundo; Δ à processu incurvo cuneiformis; Θ à multangulo majore.  
 Λ Ligamentum, quod ab offe subrotundo ad os quartum metacarpi pertinet.  
 Ξ Π Σ Adductor offis metacarpi quarti: Π hac parte oriens à ligamento carpi: Σ hac insertus ossi metacarpi quarto.  
 Φ Ψ Flexor brevis pollicis manus. Φ cauda altera, extremo tendineo inserta pollicis ossi sesamoideo, quod ab indice remotius. Ψ altera, extremo tendineo inserta ossi primo pollicis, & sesamoideo, quod indici propius.  
 Ω Adductor pollicis manus.  
 1. 2. 3. 4 Lumbricales manus; 1 indicis, 2 medii, 3 annularis, 4 auricularis.  
 5 Tendo extensorum digiti minimi, 6 pertinet ad os primum minimi.  
 7 Tendo communis Flexori parvo digiti minimi manus cum Abductore ejusdem, adjunctus tendini extensori digiti illius.  
 8 Tendo ad os tertium digiti minimi decurrens, factus ex tendine 7, accedenteque ad eum portione tendinis extensoris minimi.  
 9: 10 Tendines iidem, qui w β γ τ ψ in manu dextra.  
 a Adductor offis metacarpi quarti.


In scapulis, brachiis, cubitis, manu sinistra.

In manu dextra.


b. c. d. e Tendines Extensorum digitorum, qua tendines illi per digitos incedunt, conjuncti cum tendinibus & aponeurosis Interosseorum, Lumbricalium, &c. Ad radices digitorum truncati sunt. f. f. f extrema illorum tendinum, quae offibus secundi ordinis inserta.  
 g Hinc rescissus Abductor minimi digiti manus. h tendo ejus.  
 i Communis tendo Abductoris Flexorisque parvi digiti minimi manus, conjunctus cum tendine b, acceptaque ab eo portione auctus, k decurrens ad os tertium digiti minimi.  
 l Aponeurosis, quae à capsula articuli digiti hujus cum suo metacarpi offe, pertinet ad tendinem b.  
 m n Interosseus auricularis, m oriens ab offe metacarpi digiti illius. n tendo ejus, cui se adjungit tendo Lumbricalis quarti.  
 o Tendo, qui Interosseo auricularis & Lumbricali quarto communis, conjunctus cum tendine b, acceptaque ab eo portione auctus, p decurrit ad os tertium auricularis.  
 q Commune extremum tendinum k. p, pertinet ad os tertium auricularis.  
 r Aponeurosis, quae ad tendinem b accedit, superiore parte sui veniens è capsula articuli hujus digiti cum suo metacarpo: inferiore producta à tendine n Interossei auricularis, cum quo tendine conjunctus tendo Lumbricalis quarti.  
 s Interossei posterioris digiti annularis caput oriens ab offe metacarpi annularis. t capitis alterius, quod ab offe metacarpi auricularis oritur, truncati extremum. u tendo, qui se deinde v conjungit cum tendine c, acceptaque ab eo portione auctus, w decurrit ad os tertium annularis.  
 x Aponeurosis, quae accedit ad tendinem c, superiore parte sui veniens è capsula articuli hujus digiti cum metacarpo: inferiore producta à tendine u Interossei posterioris annularis.  
 y z Interosseus prior annularis, y oriens ab offe metacarpi digiti illius. z tendo ejus, cui se adjungit tendo Lumbricalis tertii.  
 α Tendo, qui communis Interosseo priori annularis & Lumbricali tertio, conjunctus cum tendine c, acceptaque ab eo portione auctus, β decurrit ad os tertium annularis.  
 γ Commune extremum tendinum w. β, pertinet ad os tertium annularis.  
 δ Aponeurosis, quae accedit ad tendinem c, superiore parte sui veniens è capsula articuli hujus digiti cum metacarpo: inferiore producta à tendine z Interossei prioris digiti annularis, cum quo tendine conjunctus tendo Lumbricalis tertii.  
 ε Interossei posterioris digiti medii caput oriens ab offe metacarpi digiti illius. ζ capitis alterius, quod ab offe metacarpi annularis oritur, truncati extremum. η tendo, qui se deinde θ conjungit cum tendine d, acceptaque ab eo portione auctus, ι decurrit ad os tertium medii.  
 x Aponeurosis, quae accedit ad tendinem d, superiore parte sui veniens è capsula articuli digiti hujus medii cum metacarpo: inferiore producta à tendine η Interossei posterioris digiti hujus medii.  
 λ Interossei prioris digiti medii caput oriens ab offe metacarpi medii illius. μ capitis alterius, quod ab offe metacarpi indicis oritur, truncati extremum. ν tendo, cum quo se conjungit tendo Lumbricalis secundi.  
 ξ Tendo, qui communis Interosseo priori digiti medii cum Lumbricali secundo, conjungit se cum tendine d, acceptaque ab eo portione auctus, ο decurrit ad os tertium medii.  
 π Commune extremum tendinum ι. ο, pertinet ad os tertium medii.  
 ς Aponeurosis, quae accedit ad tendinem d, superiore parte sui veniens è capsula articuli digiti hujus medii cum metacarpo: inferiore producta à tendine ν Interossei prioris digiti hujus medii, cum quo tendine conjunctus tendo Lumbricalis secundi.  
 σ Interosseus posterior indicis, σ oriens ab offe metacarpi indicis. ς tendo ejus, qui se deinde ς conjungit cum tendine e, acceptaque ab eo portione auctus, τ decurrit ad os tertium indicis.  
 υ Aponeurosis, quae accedit ad tendinem e, superiore parte sui veniens è capsula articuli digiti hujus indicis cum metacarpo: inferiore producta à tendine ς Interossei posterioris digiti hujus indicis.  
 φ Tendo Lumbricalis primi, qui se deinde χ conjungit cum tendine e, acceptaque ab eo portione auctus, ψ decurrit ad os tertium indicis.  
 ω Commune extremum, in quod se conjungunt tendines τ. ψ, pertinet ad os tertium indicis.  
 ι Aponeurosis, quae producta à Lumbricali primo, conjungit se cum simili aponeurosi producta ab Abductore indicis, unaque cum ea adjungit tendini e.  
 2. 3 Interosseus prior indicis; 2 oriens ab offe metacarpi indicis. 3 tendineum extremum, insertum ossi primo indicis.  
 4. 5 Flexor brevis pollicis manus. 5 aponeurosis, quam producit, quae conjungit se cum aponeurosi ambiente capsam articuli pollicis cum metacarpo suo, unaque cum ea adjungit extremo communi tendinum Extensorum pollicis.  
 6. 7 Adductor pollicis manus, 7 extremo tendineo insertus ossi ejus primo.













# TABULAE ANATOMICAE OCTAVAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

**Q**UARTUS ab hac parte Musculorum ordo, una cum Sceletō magis denudato, ob remotas partes primas plerasque figurae proxime superioris. Haec figura facies est posterior figurae Tabulae quartae, non in totum tamen, quoniam neque Pterygoideus internus, neque Sphincter externus ani, neque Transversi perinaei, neque Interossei tendinesque per digitos in manu dextra, ut in illa, sic in hac exhibiti sunt: exhibiti autem Interossei cum tendinibus in manu sinistra, ordinis causa, cum in quarta praeteriti sint, utpote jam expressi in tertia.

Remota: à capite, Buccinator, pars ad Orbicularem oris accedens, Pterygoideus internus, Mylohyoideus. A cervice, Biventre cervicis, Complexi, Trachelomastoidei, Transversales cervicis, Cervicales descendentes, Scaleni postici: praeterea à parte sinistra, Spinalis cervicis. A dorso & lumbis, Sacrolumbales cum Longissimis dorfi & Spinalibus dorfi: praeterea à spinæ sinistro latere, Semispinalis dorfi; à thoracis sinistro latere, Levatores costarum breviores, praeter primum; Levatores longiores, & Intercostrales externi. A lateribus inter thoracem & coxas, Transversi abdominis, una cum lamellis interioribus aponeurosiū communium Serratorum posticorum inferiorum & Obliquorum interiorum abdominis. A coxis & natibus, Glutei minores, Obturatores interni. A femoribus, Graciles, Semimembranosii, Bicipites crurum, principia Gemellorum & Plantarium. A cruribus pedibusque extremis, Poplitei, Peronei longi, Flexores longi pollicum pedum, Flexores longi digitorum pedum. A pedibus extremis, Extensores breves digitorum pedum, Capita quae ad Flexores longos digitorum pedum in plantis accedunt, Interossei digitorum minimorum, Tendines Flexorum longorum digitorum pedum, una cum Lumbricalibus. A scapulis & humeris, Teretes majores, Coracobrachiales, Brachiales interni, Tricipites brachiorum. A cubitis manibusque, Radiales externi longiores, & breviores, Profundi, Flexores longi pollicum manuum. Praeterea à manu sinistra, ligamentum armillare interius, ligamentum ab osse subrotundo ad os metacarpi manus quartum pertinens, Adductor ossis metacarpi manus quarti, Lumbricalis, Tendo extensorum digiti minimi manus una cum tendine communi Flexori parvo digiti minimi manus cum Abductore ejusdem, adjuncto tendini illi extensorum; Tendo, communis Lumbricali primo cum tendine Extensorum indicis, ad os tertium indicis pertinens. A manu dextra, omnes musculi, tendines, aponeuroses, praeter pollicis Adductorem & Flexorem brevem.

In capite & collo.

a b c c. a b c c Recti capitis postici minores b origo ab eminentia atlantis, quae spinæ loco est: à qua origine extrinsecus tendinosus est. c c extremum, ossi occipitis insertum.  
d e f. d e f Recti capitis postici majores. e origo à spina epistrophaei. f extremum ossi occipitis insertum.  
g. g h i i Obliqui superiores capitis. h origo à processu transverso epistrophaei. i i extremum ossi occipitis insertum juxta additamentum futurae lambdiformis.  
k l m. k l m Obliqui inferiores capitis. l origo à spina epistrophaei. m extremum inferum processui transverso atlantis.  
n. n Interspinales cervicis quinti. o. o quarti. p. p tertii. q. q secundi. r. r primi.  
s t u v w x y z α β γ. s t u v w x y z α β γ Scaleni medii. t origo à costa prima. u caput ad eum accedens à processu transverso vertebrae colli primae, v à secundae. w. x. y. z. α. β. γ extrema, inserta processibus transversis vertebrarum colli, w primae, x secundae, y tertiae, z quartae, α quintae, β sextae, γ septimae.  
δ Intertransversarius colli posterior sextus. ε quintus; qui & in sinistro latere. ζ. ζ quarti. η tertius; qui in dextro quoque latere. θ. θ secundi. ι primus; qui etiam in latere dextro.  
κ. κ. &c. Levatores breviores costarum, κ. κ primarum, λ secundae, μ tertiae, ν quartae, ξ quintae, ο sextae, π septimae, ς octavae, σ nonae, ϛ decimae, τ undecimae, υ duodecimae. φ duodecimae principium tendinosum, χ tendinosa extremi pars: qualia & in undecimae, decimae, nonae, indicata. ψ ω ω in sextae indicata, ψ origo à processu transverso dorfi vertebrae octavae, ω ω extremum costae insertum: ex quo etiam reliquorum ortus insertioque intelligentur. Sinistri remoti, praeter primum.  
A B C D E Levator longior costae decimae: B origo à processu transverso vertebrae dorfi octavae; C principii pars extrinsecus tendinosa: D extremum costae decimae insertum, cuius E pars tendinosa. Quae ad sequentes quoque pertinent. F Levator longior costae undecimae, G duodecimae. Sinistri remoti.  
H. I. K. &c. Intercostrales externi, H primus, I secundus, K tertius, L quartus, M quintus, N sextus, O septimus, P octavus, Q nonus, R decimus, S undecimus. Apparet quomodo à costa superiore quaque oriantur, inferiori inferantur. Sinistri remoti.  
T. &c. Intercostrales interni, T primus, U secundus, V tertius. W quar-

tus, X quintus, Y sextus, Z septimus, a octavus, æ. æ noni, b decimus, c. c undecimi. d d origo à costa: ac sic in primo, secundo, tertio, septimo, octavo, nono, decimo.

e e &c. Pleura.

f. &c. Intertransversarii dorfi, f. f primi, g. g secundi, h. h tertii, i. i quarti, k. k quinti, l. l sexti, m. m septimi, n. n octavi, o. o noni.

p q r s t u v w x y z i Semispinalis dorfi. q. r. s. t quatuor capita, à principio tendinea, orientia, q à processu transverso vertebrae dorfi tertiae à lumbis, r quartae, s quintae, t sextae. u. v. w. x. y. z. i septem caudae in tendines abeuntes, pertinentes, u ad spinam vertebrae dorfi octavae à lumbis, v nonae, w decimae, x undecimae, y duodecimae, z colli primae, i secundae. Sinister remotus.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 Spinalis cervice. 3. 4. 5. 6. 7. 8 sex capita, à principio tendinea; oriunda, 3 à processu transverso dorfi vertebrae septimae à lumbis, 4 octavae, 5 nonae, 6 decimae, 7 undecimae, 8 duodecimae. 9. 10. 11. 12. 13 caudae, pertinentes, 9 ad spinam colli vertebrae à dorso secundae, 10 tertiae, 11 quartae, 12 quintae, 13 sextae. Sinister remotus.

14. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Secundum spinam.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62: 14. 14. 15. 16. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 61. 62. Multifidi spinæ. 15 caput tendinosum, quod oritur à processu obliquo descendente colli vertebrae quartae: 16 simile, quod à tertiae: 17 quod à secundae: 18 quod à processu transverso duodecimae dorfi: 19 quod ab undecimae: 20 quod à decimae: 21 nonae: 22 octavae: 23 septimae: 24 sextae: 25 quintae: 26 quartae: 27 tertiae: 28 secundae: 29 tendinosus excursus capitis, quod oritur à processu transverso primae dorfi: 30 similis illius, quod à processu obliquo ascendente vertebrae quintae lumborum: 31 similis illius, quod ab obliquo ascendente quartae lumborum: 32 illius, quod ab obliquo ascendente tertiae lumborum: 33 illius, quod à secundae lumborum: 34 illius, quod à primae: 35 illius, quod à primae ossis sacri. 36. 37 caput, quod oritur partim 36 à ligamento, quod ab eminentia, quam os sacrum in dorso suo ad externum latus foraminis sui secundi & tertii habet, ad finitimam ossis ilium partem deductum; 37 partim ab illa ipsa eminentia. 38 caput, quod oritur inde à spina tertia sacri usque ad tuberculum ossis sacri, quod fit ex concretionem processus obliqui descendentes quartae ipsius vertebrae cum obliquo ascendente quintae, & ab ipso illo tuberculo. 39. &c. extrema tendinosa, inserta spinis vertebrarum; 39 primae lumborum, 40 secundae, 41 tertiae, 42 quartae, 43 quintae, 44 dorfi primae, 45 secundae, 46 tertiae, 47 quartae, 48 quintae, 49 sextae, 50 septimae, 51 octavae, 52 nonae, 53 decimae, 54 undecimae, 55 duodecimae, 56 primae colli, 57 secundae, 58 tertiae, 59 quartae, 60 quintae, 61 sextae, 62 processui obliquo descendenti ejusdem.

Γ. Γ: Δ. Δ Interspinales dorfi. Γ. Γ secundi, Δ. Δ primi.

Θ. Θ: Λ. Λ: Ζ. Ζ: Π. Π: Σ. Σ: Φ. Φ Interspinales lumborum. Θ. Θ sexti, Λ. Λ quinti, Ζ. Ζ quarti, Π. Π tertii, Σ. Σ secundi, Φ. Φ primi.

Ψ. Ψ: Ω. Ω: α. α: β. β: γ. γ Intertransversarii lumborum. Ψ. Ψ quinti, Ω. Ω quarti, α. α tertii, β. β secundi, γ. γ primi. Apparet, quomodo à processu transverso inferiore oriantur, superiori inferantur.

δ ε η θ ι κ λ. δ ε η θ ι κ λ Quadrati lumborum. ε origo à ligamento ζ, quod à processu transverso vertebrae lumborum primae ad os ilium pertinet. η. θ. ι. κ portiones tendinosae, pertinentes ad processus transversos vertebrarum lumborum, η secundae, θ tertiae, ι quartae, κ quintae. λ extremum ad costam duodecimam pertinens.

μ Diaphragmatis pars.

ν. ν Psoae magni.

ξ ο. ξ ο Iliaci interni.

π. π Tendines communes Psois magnis cum Iliacis internis, inserti trochanteribus minoribus.

ς ς σ τ. ς ς σ τ Obturatores externi. σ originis pars ab interiore margine foraminis magni ossis coxae. τ extremi pars tendinea.

ς υ φ χ ψ ω Α Α Α Β C D. ς υ φ χ ψ ω Α Α Α Β C D Adductores magni femorum: quorum superiori parti juxta internum latus vestigia impres-

In lumbis, coxis, femoribus, cruribus, pedibus extremis.



## TABULAE MUSCULORUM OCTAVAE EXPLANATIO.

fa, tum à Gluteis magnis; confer Tab. V: tum à Semitendinosis; confer Tab. VI.  $\nu$  tota haec pars concava, ob vestigium impressum à Semimembranoso.  $\phi$   $\chi$  origo à dorso tuberis ischii,  $\phi$  parte tendinosa,  $\chi$  tendinea, quae  $\psi$  per carnem excurrit.  $\omega$  pars è priore parte veniens, ubi per altitudinem ossis pubis oritur. A A A extremum latum ossi femoris insertum. B C D extremum inferius, quod in tendinem C abit, D insertum condylo interiori femoris.

E F G H H I K L. E F G H H I K L Tibiales postici. F principium à tibia oriens. G alterum, à fibula. H H origo à tibia, unde extrinsecus tendinosus. I I pars, quae à fibula oritur, extrinsecus tendinosa. K L tendo, K hac parte è carne oriens, L hac pone malleolum internum procedens.

M N O P Q R. M N O P Q R Peronei breves. N origo à fibula. O P Q R tendo, O hac parte oriens è carne; hac P, qua se ad malleolum inflectit, latior & crassior; hac Q quoque, ubi per ligamentum secundum juxta superiorem partem eminentiae calcanei incedit; R insertus ossi metatarsi quinto.

S. S Interosseorum secundorum digitorum pedum quattorum capita, quae ab ossibus metatarsi digitorum illorum oriuntur.

T Interossei secundi digiti tertii pedis caput, quod ab ossi metatarsi digiti illius oritur.

V Interossei secundi digiti secundi pedis caput, ab ossi metatarsi digiti illius oriens.

W X Flexoris brevis pollicis pedis caudae duae, sesamoideis insertae.

Y Interosseus secundus digiti quarti pedis.

Z Transversalis pedis.

$\Gamma$  Adductor pollicis pedis.

$\Delta$ .  $\Delta$  Subscapulares.

$\Theta$   $\Lambda$   $\Xi$   $\Pi$   $\Pi$ .  $\Theta$   $\Lambda$   $\Xi$   $\Pi$   $\Pi$   $\Sigma$  Supinatores breves.  $\Lambda$  tendo à condylo mino-

In scapulis, brachiis, manibus.

re oriens.  $\Xi$   $\Xi$   $\Pi$   $\Pi$  pars extrinsecus tendinosa, oriens  $\Xi$   $\Xi$  à capsula articuli cubiti continente,  $\Pi$   $\Pi$  ab ulna.  $\Sigma$  extremum radio insertum.

$\Phi$ .  $\Phi$  Pronatores quadrati.

$\Psi$   $\Omega$  a b c d e.  $\Psi$  f Flexores breves pollicum manuum.  $\Omega$  ortus ab eminentia interiore ossis multanguli majoris, a à multangulo minore. b cauda prior, c extremo tendineo inserta ossi sesamoideo pollicis illi, quod ab indice remotius. d cauda posterior, e extremo tendineo inserta ossi sesamoideo pollicis illi, quod indici propius; itemque ossi primo pollicis. f aponeurosis, quae procedit à cauda posteriore, adjungitque se extremo communi tendinum Extensorum pollicis.

g g h. g h Adductores pollicum manuum. h extremum tendineum, insertum ossi primo pollicis.

i Interosseus posterior indicis.

Juxta k Interosseus prior digiti medii.

l l Interosseus posterior digiti medii.

m Interosseus prior digiti annularis.

n n Interosseus posterior digiti annularis.

o Interosseus digiti auricularis.

p Tendo Interossei posterioris indicis, qui accepta portione à tendine extensorum indicis auctus, decurrit ad os tertium indicis, conjungens se in extremum commune cum tendine Lumbricalis primi, aucto pariter portione à tendine extensorum indicis accedente.

q Tendo Interosseo priori annularis & Lumbricali tertio communis, qui accepta portione ab Extensoris communis tendine, qui ad hunc digitum pertinet, auctus, decurrit ad os tertium hujus digiti.

r Tendo Interossei posterioris digiti annularis, qui accepta portione ab Extensoris communis tendine, qui ad digitum hunc pertinet, auctus, decurrit ad os tertium hujus digiti, conjungens se cum tendine q in commune extremum.













# TABULAE ANATOMICAE NONAE

## MUSCULORUM HOMINIS

### EXPLANATIO.



Tabula prima, sic hac, primus Musculorum ordo post remota integumenta communia, vaginaeque tendinosas, expressus, una pariter cum quibusdam ligamentis ad eos pertinentibus, Sceletique tertii, qui hujus figurae fundamentum est, partibus, & aliarum quoque partium, nempe nasi, auris, & genitalium partibus, quae à Musculis nudae sunt.

In capite,  
collo,  
trunco.

a b c. a b c d. e. f Epicranius. a b Occipitalis. a ejus principium tendineum. b pars carnea. c d aponeurosis inter Occipitalem & Frontalem intercedens; d per quam Temporalis hic apparet, eminetque. e pars membranacea, qua Occipitales, eorumque aponeuroses conjunctae inter se; oriens supra Cucullarium ab osse occipitis ortum. f Frontalis.  
g h Attollens auriculam. g principium tendineum, quo ab Epicranio abscedit. h pars carnea.  
i Anterior auriculae.  
k. l. m Retrahentes auriculae tres.  
n Helicis major.  
o Helicis minor.  
p Tragicus.  
q Antitragicus.  
r s t t Orbicularis palpebrarum. r pars per ambitum foraminis oculi ducta. s pars à Corrugatore supercilii accedens. t t pars, qua palpebrae obductae.  
u Compressor naris.  
v Nasalis labii superioris.  
w x w x Orbicularis oris. x pars, quae est in rubro margine labii.  
y z Zygomaticus major. z ejus origo ab osse jugali.  
α β Depressor anguli oris. β ejus origo à maxilla inferiore.  
γ Buccinator.  
δ ε ζ η θ Masseter. δ ε pars prior eademque exterior; ε ortus ejus ab osse jugali; unde extrinsecus diu tendinosa. ζ η θ pars posterior, quae nuda à priore; η θ ortus ejus, η ab osse jugali, θ à processu zygomatico ossis temporis.  
ι κ Pterygoideus internus, κ maxillae insertus.  
λ Stylohyoideus.  
Inter κ & λ Styloglossus. Confer Tab. X. Fig. 2. m.  
Mox infra Styloglossum Basiloglossus. Confer Tab. X. Fig. 1. k. & Fig. 2. o.  
μ ν ξ ο π Latissimus colli. ν. ν. &c. Fasciculi, qui ad eum in quibusdam hominibus in latere colli accedunt. ξ fasciculi sparsi, quibus in mala evanescentibus definit. ο fasciculus, qui per priorem partem Depressoris anguli oris perrectus angulum illum versus. π eminens sub Latissimo maxilla inferior.  
ρ σ Sternomastoideus cum Cleidomastoideo, conjuncti in unum. ρ extremum tendineum.  
τ Biventer cervicis, extremo tendineo insertus ossi occipitis.  
υ Splenius capitis.  
φ Splenius colli.  
χ Scalenus medius.  
ψ Levator scapulae.  
ω ω Γ Δ. ω Γ Θ Λ Ε Cucullares. Γ Δ principium tendineum. Γ pars ejus ab osse occipitis oriens. Θ principii tendinei plaga amplior, juxta imam cervicem summumque dorsum. Λ Λ extremi pars tendinosa, inserta spinae scapulae & processui superiori, proximaque claviculae parti. Ε extremi pars tendinea, qua spinae scapulae non longe à basi insertum.  
Π Σ. Π Infraspinati. Σ ortus à basi scapulae.  
Φ Teres minor.  
Ψ Teres major.  
Ω. Ω A B C D E F Latissimi dorfi. Ω pars carnea. A latus tendo, quo incipit. B hic cum Gluteo magno cohaeret. C ortus à crista ilium. D. E. F capita, quae à costis oriuntur: D quod ab undecima, E quod à decima, F quod à nona.  
G Serratus anticus.  
H I Pectoralis. I portio ab aponeurosi Obliqui externi abdominis accedens.  
K L M N O P Q R &c. Serratus magnus. K caput, quod oritur à costa tertia; L quod à quarta, M quod à quinta, N quod à sexta, O quod à septima, P quod ab octava, Q quod à nona. R. &c. ipsa capitum à costis origo.  
S T U V W X Y Z a a a a b b b b b b c c d d d d e f f g h h h h i i k Obliquus externus abdominis. S pars carnea. T. U. V. W. X. Y. Z capita, quorum T oritur à costa quinta, U à sexta, V à septima, W ab octava, X à nona, Y à decima, Z ab undecima. a. &c. principii capitum pars tendinea. b. &c. ipsa capitum origo à costis. c c carnea partis insertio cristae ilium. d d d d e f f g h h h h i i k aponeurosis, e inserta cristae ilium. f f hic sub ea eminet caro Obliqui interni, g hic sub eadem, simul & sub aponeurosi Obliqui interni, eminet caro Transversi; h h h h hic Recti caro. i i i hic per aponeuroses illas apparent lineae tendineae Recti. k hic sub iisdem eminet Pyramidalis.

l Cremaster.

m Adductor longus femoris.

n Pectineus.

o Psoas magnus.

p Sartorius.

q r s Tensor vaginae femoris. r ortus à crista ilium. s extremum, unde rescissa pars tendineae, quam adjungit vaginae femoris.

t u v Gluteus medius, u u ortus ab osse ilium. v tendo.

w x y Gluteus magnus. x hac parte oritur à crista ilium, cohaeretque cum Latissimo dorfi. y tendo.

z Semitendinosus.

α β γ δ ε ζ Biceps cruris. α caput longius. β β caput brevius. γ δ ε ζ tendo, γ primum oriens è superficie carnis capitis longioris, accessione deinde brevioris auctus δ, ε extremoque praecipuo insertus capiti superiori fibulae, ζ ac portione aliqua ad tibiam pertinet.

η θ ι κ Vastus externus. θ superficies tendinosa. ι tendo, κ insertus patellae.

λ μ ν ξ ο Rectus cruris. μ pars tendinea principii. ν tendo. ξ locus ubi se patellae inserit. ο aponeurosis, quae à tendine Recti excurrit per priora patellae, posteaque se priori parti ligamenti adjungit, quod à patella ad tibiam pertinet.

π ρ Vastus internus. ρ tendo.

σ τ υ Ligamentum à patella ad tibiam pertinens. τ locus ubi à patella oritur. υ tota hac parte subtus tibiae insertum.

φ χ ψ Gemelli caput exterius. χ superficies tendinosa. ψ tendo.

ω Γ Δ Soleus. Γ ortus à capite superiore fibulae. Δ superficies tendinosa.

Θ Λ Ε Tendo Achillis. Λ pars interior. Ε hic insertus calcaneo.

Π Plantaris tendo.

Σ Φ Ψ Ω Ω Ω Peroneus longus. Φ ortus ejus à capite fibulae. Ψ Ω Ω Ω tendo, Ψ hac parte ex carne oriens.

A Ligamentum proprium Peronei longi.

B B C C D D E Peroneus brevis. C C tendinis ex carne ortus. D D tendo, E insertus ossi metatarsi quinto.

F Ligamentum Peroneo brevi proprium.

G H I K L M N O P Q R Extensor longus digitorum pedis cum Peroneo tertio. G communis caro Extensoris & Peronei. H ortus ejus à tibia. I Peroneus tertius. K L M tendo ejus, K hic ex carne oriens, M hic insertus ossi metatarsi digiti minimi. N tendo Extensoris longi digitorum, qui se in quatuor tendines O. P. Q. R findit, per dorsum pedis decurrentes.

S S S T Tendo Extensoris proprii pollicis pedis, T insertus ossi ultimo pollicis.

U V W W Tibialis anticus. V ortus à tibia. W W tendo.

X Y Z Ligamentum, quo tendines in confinio cruris & dorfi pedis obducti. Y cornu superius. Z cornu inferius.

a a a b c d e Extensor brevis digitorum pedis. b. c. d. e ejus tendines, b ad pollicem pertinens, c ad primum parvorum, d ad secundum, e ad tertium.

f g h i k l Tendo communis Extensoris longi & brevis digitorum pedis: f pars à longo producta, g pars à brevi: intermedia est divisionis nota. h extremum ossi secundi ordinis insertum. i tendinis communis portio ad os tertium procurrens. k tendo ab altero latere ad os tertium procurrens, qui procedit à tendine Extensoris brevis. l duarum ad os tertium pertinentium portionum commune extremum, ossi tertio insertum. Eadem in reliquis digitis parvis pedis hujus: nisi quod per dorsum minimi tendo Extensoris longi solus decurrat, producatque utramque portionem ad os tertium pertinentem.

m Aponeurosis, quae ab hoc latere ad tendinem Extensoris brevis digitorum pedis accedit. Tales etiam in reliquis digitis: in minimo autem accedit ad tendinem Extensoris longi: in pollice, ad tendinem Extensoris ejus proprii.

n Interosseus primus digiti pedis secundi.

o Caput crassius Interossei secundi digiti pedis secundi.

p Caput crassius Interossei secundi digiti pedis tertii.

q Caput crassius Interossei secundi digiti pedis quarti.

r s t u v Abductor digiti minimi pedis. s hac parte tectus aponeurosi. t ortus à calcaneo. u pars aponeurosis, qua intectus est, ossi metatarsi digiti minimi inserta. v tendo Abductoris, insertus ossi primo minimi.

w x Flexor brevis digiti minimi pedis. w pars inserta ossi metatarsi minimi. x pars extremo tendineo inserta ossi primo digiti minimi.

y. z Tendines Flexoris digitorum brevis & longi. Qui & in proximo digito.

In sinistra  
coxa, pe-  
deque.



# TABULAE MUSCULORUM NONAE EXPLANATIO.

In pede  
dextro.

A B C Rectus cruris. B tendo patellae infertus. C aponeurosis à tendine ante patellam excurrent, & adjungens se priori parti ligamenti, quod à patella ad tibiam pertinet.  
D E F G Ligamentum à patella ad tibiam pertinens. E locus, ubi subtus à patella oritur. F tota hac parte subtus tibiae infertum. G pars ejus interior.  
H I Vastus internus. I tendo extremus, lateri patellae infertus.  
K L M Sartorius. L tendo, M infertus tibiae.  
N O Gracilis. O tendo.  
P Q R S Semimembranosus. Q R tendo, Q hac parte ex carne oriens. S aponeurosis prior, inferta margini interno tibiae.  
T U Semitendinosus. U tendo.  
V W X Gemelli caput interius. W superficies tendinosa. X tendo, quem exteriori parti tendinis Solei adjungit. Y tendo Achillis, Z infertus calcaneo.  
T Δ Θ Θ Soleus. Δ superficies tendinosa. Θ Θ ortus à tibia.  
Λ E Tendo Plantaris, E infertus calcaneo.  
Π Σ Flexor longus pollicis pedis. Σ tendo.  
Φ Ligamentum, quo tendo Flexoris longi pollicis pedis retinetur.  
Ψ Ω Ω α Flexor longus digitorum pedis. Ω Ω ortus ejus à tibia. α tendo ex carne oriens.  
β β γ Tibialis postici tendo. γ extremum infertum tuberi interno ossis navicularis.  
δ ε ε Ligamentum, quod superinductum tendini Flexoris longi digitorum pedis, & Tibialis postici. ε ε hic affixum malleolo interno.  
ζ Ligamentum, quo retinetur tendo Tibialis postici.  
η θ θ θ Tibialis anticus. θ θ θ tendo.  
ι Ligamenti, quo tendines in confinio cruris & pedis extremi à priori parte retinentur, cornu superius, affixum tibiae. ι ejusdem ligamenti cornu inferius.  
λ λ μ Tendo Extensoris proprii pollicis pedis, μ infertus ossi ultimo pollicis.  
ν Tendinis Extensoris proprii pollicis pedis ramus, infertus ossi ejus primo, aliquoties inventus.  
ξ Aponeurosis, accedens ad tendinem Extensoris proprii pollicis pedis.  
ο Super hos digitos tendines communes extensorum.  
π π Cornua duo ligamenti, quo tendo Flexoris longi pollicis pedis hic loci coercetur.  
ς Tendo Flexoris longi pollicis pedis, sub pollice decurrens.  
σ σ σ τ Abductor pollicis pedis. σ origo à calcaneo. σ tendo, τ infertus ossi primo pollicis pedis.  
υ υ φ Flexor brevis pollicis pedis, φ hic adjungens se tendini Abductoris.  
χ ψ Flexor brevis digitorum pedis. ψ ortus ejus à calcaneo.  
ω Caput, quod ad Flexorem longum digitorum pedis in planta accedit, oriens à calcaneo.  
In brachio sinistro, manaque. A B C D E F G H I K L M N O Deltoïdes. A B B Portionum, è quibus constat, primi ordinis secunda eademque posterior, B B oriens à spina & processu superiore scapulae. C D secundi ordinis portio posterior, D oriens à processu superiore. E F primi ordinis portio quarta, F oriens à cubito flectentis se processu superiore. G H secundi ordinis portio media, H oriens à processu superiore. I K primi ordinis portio tertia, K oriens à processu superiore. L M secundi ordinis portio prior, M oriens à processu superiore. N O primi ordinis portio prima eademque prior; O ortus ejus à processu superiore.  
P Q R Biceps. Q tendo. R aponeurosis, truncata.  
S Brachialis internus.  
T U V W X Triceps. T pars ejus, quae Longus vocatur. U pars quae Brevis. V tendo, W infertus olecrano. X tendinis mucro tenuior, prior parti olecrani, proximaeque spinae ulnae infertus.  
Y Ulnaris internus.  
Z a Supinator longus. a tendo.  
b Pronator teres.  
c d Radialis internus. d tendo.  
e e Sublimis.  
f f Flexor longus pollicis.  
g Tendo Radialis externi longioris alterius.  
h i i k Radialis externus longior. i i i k tendo, k infertus ossi metacarpi indicis.  
l m m m Radialis externus brevior. m m m tendo.  
n o Ulnaris externus. o tendo.  
p q r s t Extensor communis digitorum manus. q tendo ad indicem pertinens. r tendo ad medium pertinens: qui duo tendines non longe à digitis conjuncti portione s, à tendine medii ad tendinem indicis accedente. t tendo ad digitum tertium pertinens.  
u Indicatoris tendo.  
v w Extensor proprius digiti auricularis. w tendo.


x y y z z Abductor longus pollicis manus. y y tendo portionis superioris, qui in fine fissus, altera parte pertinet ad Abductorem brevem pollicis, altera ad os metacarpi pollicis. z z tendo portionis inferioris.  
α β Extensor minor pollicis manus. β tendo.  
γ γ Tendo Extensoris majoris pollicis manus.  
δ ε Communis tendo Extensoris majoris & minoris pollicis, ε ad os ultimum pollicis pertinens.  
ζ ζ Ligamentum armillare exterius.  
η Ligamentum, quo coercentur tendines Abductoris longi & Extensoris minoris pollicis manus.  
θ Ligamentum carpi interius.  
ι ι Abductor brevis pollicis manus. ι aponeurosis, quam adjungit tendini communi Extensorum pollicis manus.  
λ Opponens pollicis manus, infertus margini externo ossis metacarpi pollicis.  
μ Aponeurosis, quae se adjungit ad tendinem Extensoris majoris pollicis manus, partim oriens à capsa articulum pollicis cum metacarpo suo continente, partim à Flexore brevi pollicis.  
ν ξ Adductor pollicis manus, ξ extremo tendineo infertus ossi primo pollicis.  
ο Interosseus prior indicis, oriens ab osse ejus metacarpi.  
π Abductor indicis.  
ς Lumbricalis primus.  
σ Aponeurosis, quae partim ab Abductore indicis procedit, partim ab ejus Lumbricali, & accedit ad tendinem Extensorum indicis.  
ς ς Communis tendo Extensorum indicis. ς ejus extremum ossi secundo indicis infertum.  
τ Tendo Lumbricalis primi, qui accepta à communi Extensorum tendine portione auctus, υ decurrit ad os tertium indicis.  
φ Tendo Interossei secundi indicis, una cum portione quam accepit à communi Extensorum tendine, decurrens ad os tertium indicis.  
χ Extremum commune tendinum υ & φ, pertinens ad indicis os tertium, eique infertum.  
ψ Tendo communis Lumbricali secundo & Interosseo priori digiti medii: qui tendo accepta portione à tendine extensore digiti medii auctus, decurrit ad os tertium medii illius, in fine cum simili tendine ex altero digiti hujus latere veniente conjunctus in extremum commune, quod ossi tertio mododicti digiti infertum.  
ω Tendo communis Lumbricali quarto cum Interosseo priore digiti auricularis: qui tendo accepta portione à tendine extensore digiti illius auctus, decurrit ad ejus os tertium.  
Per internam digitorum partem decurrunt tendines Sublimis & Profundi, ligamenti suis coerciti. Quae melius cognosci possunt ex Tab. I.  
α β γ δ ε Triceps brachii. α pars quae Longus vocatur, β pars quae Brachialis externus vocatur. γ tendo Tricipitis, δ infertus olecrano.  
ε Tendo tenuis, è superficie Brachialis externi oriens, & ad superiorem partem condyli majoris ossis humeri pertinens.  
ζ Brachialis internus.  
η θ ι Biceps brachii. θ aponeurosis, truncata. Juxta ι tendo.  
κ Supinator longus.  
λ Pronator teres.  
μ Radialis internus.  
ν ξ Palmaris longus. Mox infra ξ tendinis principium.  
ο Sublimis.  
π ς σ Ulnaris internus. ς principium alterum, oriens à condylo majore ossis humeri. σ principium alterum, ab olecrano oriens.  
τ Ulnaris externus.  
a Abductor brevis pollicis manus. b aponeurosis, quae à tendine ejus abscedens, adjungit se tendini communi Extensorum pollicis.  
c Pars Flexoris brevis pollicis manus, quae pro Abductore ejus brevi altero haberi potest, extremo tendineo inferta ossi primo pollicis.  
d Flexoris brevis pollicis manus pars, quae inferta ossi sesamoideo, quod indici propius, & proximae parti ossis primi pollicis.  
e Adductor pollicis manus.  
f f Tendo Flexoris longi pollicis manus.  
g Duo ligamenta, quae coercent tendinem pollicis Flexoris longi, μ in manu sinistra Tab. V.  
h Palmaris brevis.  
i Flexor brevis digiti minimi manus.  
k Abductor digiti minimi manus.  
l Adductor ossis metacarpi manus quarti, infertus ossi illi.  
Caeterum tendinibus & aponeurosis per dorsum manus & digitorum porrectis, notae non inscriptae, cum ex quinta Tabula facile cognosci possint.

In brachio  
dextro.

In manu  
dextro.









# TABULAE ANATOMICAE DECIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

## FIGURAE I.

**H**AEC Figura post capitis & colli imaginem Tabulae nonae sequitur. Remoto Latissimo colli & Sternocleidomastoideo, exhibet Musculos, qui ante vertebrae colli infra caput sequuntur, una cum osse hyoide, & larynge, ac stomachi parte. Nulli caeterum neque capiti, neque vertebrae inscripti: & vertebrae ne quidem illi, qui eis à priori parte post pharyngem adhaerent, Rectus internus capitis major, & Longus colli; ne iis obscurarentur reliqua.

- a Pterygoideus externus.
- b c Pterygoideus internus, c maxillae infertus.
- d Mylohyoideus: cujus extremum basi ossis hyoidis infertum apparet mox infra Biventer maxillae tendinem i.
- e f Stylohyoideus, tendine suo f infertus basi ossis hyoidis.
- g h i Biventer maxillae. g venter primus, h venter secundus, i tendo medius.
- k l Basioglossus. l pars principii, quae à cornu hyoidis oritur. Mox supra k Styloglossi pars. Confer Fig. 2. m.
- m Ceratoglossus, oriens à cornu hyoidis.
- n o Os hyoides. n cornu, o basis.
- p Commune extremum Stylopharyngei & Palatopharyngei. Cujus etiam extremi pars inter Ceratoglossum & capita Constrictoris medii pharyngis: confer Figuras sequentes.
- Juxta p Ligamentum à cornu hyoidis pertinens ad processum superiorem cartilaginis thyreoideae. Confer Fig. 4. x.
- q r s t Hyothyreoideus. r s origo ejus, r à cornu hyoidis, s à basi. t infertio thyreoideae.
- u Cartilago thyreoidea.
- v w x y Cricothyreoideus. v pars ejus prior, inferta thyreoideae. w x y pars posterior, x hic portionem adjungens ad Constrictorem pharyngis inferiorem, y hic inferta thyreoideae.
- z Cartilago cricoidea.
- α Stomachus, truncatus.
- β γ Pharyngis Constrictor inferior. γ origo ejus à cricoidea.
- δ ε ζ Pharyngis Constrictor medius. ε caput, quod ab officulo graniformi hyoidis oritur. ζ caput, quod oritur ab extremo cornu hyoidis.
- η Pharyngis Constrictor superior.

## FIGURAE II.

Remotis Musculis primis Figurae primae, una cum sinistra parte maxillae inferioris, proxime insequentem ordinem Musculorum exhibet, simulque cum eis, praeter os hyoides, laryngem, stomachum, etiam linguam. Remoti autem cum maxillae sinistra parte, Pterygoideus externus, & internus, Mylohyoideus, Stylohyoideus, Biventer maxillae, Hyothyreoideus, Cricothyreoideus.

- a Os maxillare superius.
- b Processus pterygoidei ala exterior.
- c d Ossis palati portio, quae interferta processui pterygoideo & ossi maxillari superiori, connectit ea inter se. c pars ejus, ad cavum processus pterygoidei pertinens.
- e e Ala interior processus pterygoidei, in cuius imo hamulus.
- f Circumflexus palati mollis.
- g Levator palati mollis.
- h Lingua.
- Juxta i Constrictor isthmi faucium. Confer Fig. 4. l.
- k l m Styloglossus. l hic se continuat Ceratoglossus. m hinc secundum linguam decurrit, adnexus ei.
- n Ceratoglossus, oriens à cornu hyoidis.
- o Basioglossus, cujus apparet ortus à cornu hyoidis.
- p Lingualis.
- q Genioglossus, oriens à maxilla.
- r s Geniohyoideus. s principium tendinosum, quo à maxilla oritur. Caeterum basi se ossis hyoidis, atque etiam cornu infert: parte quoque extremi sui decurrit pone Basioglossum.
- t Maxilla inferior dissecta.
- u v Os hyoides. u basis, v cornu.
- Juxta inferiorem partem extremi cornu hyoidis, pars ligamenti, quod inde pertinet ad cartilaginis thyreoideae processum superiorem. Confer Fig. 4. x.
- w Stylopharyngeus.
- x Commune extremum Stylopharyngei & Palatopharyngei: cujus etiam extremi pars apparet inter Ceratoglossum & capita duo Constrictoris medii pharyngis: confer Fig. 4. g.
- y y z Constrictor pharyngis superior. z pars ejus, quae ex parte à maxilla

inferiore oritur, ex parte continuata est Buccinatori; à quibus rescissa.

- α β γ Constrictor medius pharyngis. β caput, quod ab officulo graniformi hyoidis oritur. γ caput, quod oritur ab extremo cornu hyoidis.
- δ ε ζ η θ Constrictor inferior pharyngis. ε ζ η caput ejus, quo oritur à cartilagine thyreoideae, & quidem ab ε ad ζ, à latere cartilaginis illius; ζ ab ejusdem ora inferiore, η à processu inferiore. θ caput, quo oritur à cartilagine cricoidea.
- ι x Cartilago thyreoidea. x eminentia, à qua oritur Constrictor medius.
- λ Ligamentum cartilaginem cricoideam thyreoideae alligans.
- μ Cartilago cricoidea.
- ν Stomachus, truncatus.

## FIGURAE III.

Remotis Musculis primis Figurae secundae, proximus ordo hic exhibitus. Remoti: Styloglossus, Ceratoglossus, Basioglossus, Geniohyoideus, Stylopharyngeus.

- Ossi maxillari superiori, processui pterygoideo, ejusque alis, hamulo, cavo, itemque ossi palati, maxillae inferiori dissectae, litteras neque in hac, neque in proxime sequentibus duabus Figuris inscripsi; quippe cum ex secunda cognoscantur, nihilque adeo causae sit, cur has pariter atque illam obruerem.
- a Circumflexus palati mollis.
- b Levator palati mollis.
- Juxta c, Constrictoris isthmi faucium pars. Confer Fig. 4. l.
- d Lingua.
- e f Styloglossus, e hic truncatus, f hac parte secundum linguam decurrens, eique adnexus.
- g Truncatus Ceratoglossus cum Basioglossus.
- h Lingualis.
- i k l m n o Genioglossus. k origo ejus à maxilla inferiore. l hic tenues fasciculos per latus pharyngis curvat, quorum alii m accedunt ad Ceratoglossum & Styloglossum, alii n ad Constrictorem superiorem pharyngis, alii o in membrana pharyngis evanescent.
- p q r s t u Constrictor superior pharyngis. q summa pars, quae exit ex tendine Circumflexi palati mollis. r pars, quae oritur à lamella interna processus pterygoidei, & ab hamulo ejus. s pars, quae rescissa est à Buccinatore. t pars, quae oritur à maxilla inferiore. u pars, quae procedit à lingua: infra quam pars n accedit à Genioglossi fibris, quas ille per latus pharyngis curvat.
- v Hic spatium est inter Constrictorem superiorem & medium, per quod demittit se Stylopharyngeus, Constrictorem medium subeuns.
- w x y Constrictor medius pharyngis. x caput alterum, oriens ab officulo graniformi ossis hyoidis: y alterum, oriens ab extremo cornu hyoidis.
- z α β γ δ Constrictor pharyngis inferior. α β γ caput, quod à thyreoidea oritur: ejus, ab α ad β, origo à latere thyreoideae, β à margine ejusdem inferiore, & γ à processu inferiore. δ caput, oriens à cricoidea.
- ε Commune Stylopharyngei & Palatopharyngei extremum: cujus etiam pars inter Constrictoris medii pharyngis capita x. y: confer Fig. 4. g.
- ζ η θ Os hyoides. ζ basis, η officulum graniforme, θ cornu.
- Mox supra η exigua pars Chondroglossi. Confer Fig. 4. t.
- Mox infra λ Ligamentum, quod ab extremo cornu hyoidis pertinet ad processum superiorem thyreoideae. Confer Fig. 4. x.
- μ Cartilago thyreoidea. Cujus processus inferior juxta λ: conf. α Fig. 4.
- ν Ligamentum, quo thyreoidea & cricoidea colligatae inter se.
- ξ Cartilago cricoidea.
- ζ Stomachus, truncatus.

## FIGURAE IV.

Remotis Musculis primis Figurae tertiae, proximus ordo hic exhibitus, pariter cum lingua, osse hyoide, larynge, stomachi principio, & praeterea cum tonsilla, & membrana faucium, simul denudatis. Additum autem Stylopharyngei principium, quo Musculus ille integer appareret. Remota haec: Genioglossi pars, quam per latus pharyngis curvat; Constrictor superior pharyngis, mediusque, & inferior.

- a Circumflexus palati mollis.
- b Levator palati mollis.
- c c c Membrana pharyngis nuda.
- d e Stylopharyngeus. e portio ejus, quae se ad superiorem partem Palatopharyngei adjungit, i Fig. 11.
- f f Palatopharyngeus.
- g g h i k Commune extremum Stylopharyngei & Palatopharyngei. h pars ejus, inferta lateri externo marginis cartilaginis thyreoideae, ad radicem processus superioris. i k pars, inferta i reliquo margini, & k infra in membranam pharyngis evanescens.
- l Constrictor isthmi faucium.



## TABULAE MUSCULORUM DECIMAE EXPLANATIO.

m Tonfilla.  
n Lingua.  
o p Styloglossus, qua ad linguam applicatus: p hic truncatus. Confer k m Fig. 2.  
q Basioglossus & Ceratoglossus, truncati.  
r Lingualis.  
s Genioglossus. s origo à maxilla inferiore. Remotus contextus fibrarum, quas per latus pharyngis curvat, l Fig. 3.  
t Chondroglossus, oriens ab officulo graniformi hyoïdis.  
u v w Os hyoïdes. u basis. Mox supra v officulum graniforme. w cornu.  
x Ligamentum, quod ab extremo cornu hyoïdis pertinet ad processum superiorem cartilaginis thyreoïdae.  
y z α Cartilago thyreoïda. z ejus processus superior, α inferior.  
β Ligamentum, quo cartilago thyreoïda & cricoïda hic loci colligatae inter se.  
γ Cartilago cricoïda.  
Juxta δ, Cricoarytaenoïdeus posticus. Confer a Fig. 6.  
ε Stomachus, truncatus.

### FIGURAE V.

Hic non modo aliquot Musculi primi Figurae quartae remoti, sed etiam pharynx per longitudinem incisa, rescis-  
saeque sinistra ejus parte, aperta, ut praeter concavum ejus, etiam palatum molle cum uvula, linguae radix, & epiglottis, appareant. Remoti: Stylopharyngeus & Palatopharyngeus cum extremo suo communi, & Chondroglossus.

a Circumflexus palati mollis.  
b Levator palati mollis.  
c Palatum molle. d uvula. e palati mollis margo truncatus.  
f Tonfilla.  
g Constrictor isthmi faucium.  
h i Lingua. h hac parte in ore est: i hac se deorsum curvat intra fauces, basem versus ossis hyoïdis.  
k l Styloglossus, l hic truncatus.  
m Basioglossus & Ceratoglossus, truncati.  
n Lingualis.  
o p q Genioglossus. p origo à maxilla inferiore. q hic ad linguam pertinet.  
r s Epiglottis. r r pars gibba, s concava.  
t u v Os hyoïdes. t basis. u cornu. v officulum graniforme.  
w Membrana interior laryngis.  
x Ligamentum ab extremo cornu hyoïdis pertinens ad processum superiorem cartilaginis thyreoïdae.  
y z α Cartilago thyreoïda. z processus superior, α inferior.  
β Ligamentum, quo cartilago thyreoïda & cricoïda colligatae inter se.  
γ Cartilago cricoïda.  
Juxta δ Cricoarytaenoïdeus posticus. Confer a Fig. 6.  
ε ε Concavum pharyngis incisae.  
ζ ζ Pharyngis membrana incisa.  
η Stomachus, truncatus.

### FIGURAE VI.

Sequitur haec Figura post laryngis imaginem, quae Figura proxime superiore continetur. Resecto autem sinistro latere cartilaginis thyreoïdae, reliqua laryngis exhibet, cum Musculis, qui lateri thyreoïdae subjecti sunt, itemque illis, qui in posteriore laryngis parte collocati.

Cartilagini thyreoïdae, cricoïdae, angulo posteriori basis arytaenoïdae sinistrae, capitulis arytaenoïdearum, & epiglottidi, litteras non inscripsi, utpote ex Figura 7. facile cognoscendis, quam hujus melius intelligendae causa potissimum addidi.  
a Cricoarytaenoïdeus posticus, oriens à cartilagine cricoïda, & insertus basi arytaenoïdae.  
b Cricoarytaenoïdeus lateralis, oriens à superiore margine cartilaginis cricoïdae.  
c d Fasciculus ab interiore eademque superiore parte thyreoïdae, non longe à fissura ejus oriens, insertusque basi arytaenoïdae. d principium, à thyreoïda rescissum.  
e Thyreoarytaenoïdeus; una parte oriens à cartilagine thyreoïda; altera, à ligamento, quo cricoïda & thyreoïda colligatae inter se.  
f g h Fibrarum carnearum contextus tenuis, qui à cartilagine thyreoïda, juxta exteriorem partem originis Thyreoarytaenoïdei ortus, f ascendit per exteriorem partem Thyreoarytaenoïdei illius, post g secundum latera glottidis, ad epiglottidem h.  
i Depressor epiglottidis.  
k Ligamentum, quo thyreoïda & cricoïda à priori parte colligatae inter se.  
l Arytaenoïdeus obliquus sinister.  
m n Arytaenoïdeus obliquus dexter, n ejus pars, quae secundum glottidis marginem ad epiglottidem procedit: pars altera, inter n & m proximam, se continuat Thyreoarytaenoïdeo.  
o Arytaenoïdeus transversus.  
p Membrana, quae lateralem partem glottidis efficit, à capitulo cartilaginis arytaenoïdae ad superiorem partem epiglottidis porrecta.

### FIGURAE VII.

Idem est Laryngis cartilaginum contextus, qui Figurae

sextae: in totum autem nudus, remotis musculis, & membranis.

a b c Cartilaginis Thyreoïdae pars dextra ex interiore parte. b hic resecta est pars sinistra, quae remota. c processus superior.  
d e Cartilago Cricoïda. e tuberculum, cui alligatur processus inferior Thyreoïdae.  
f g h Cartilagine Arytaenoïdae. g h basis: g basis angulus posterior, tuberculi instar eminens; h basis angulus prior, hac parte sinuatus.  
i i Capitula, cartilaginibus Arytaenoïdeis addita.  
k l m n Epiglottis. k dorsum, l pars concava. m teres corpus instar ligamenti in concava parte Epiglottidis eminens, & n oriens ab interiore parte Thyreoïdae, infra ejus fissuram.

### FIGURAE VIII.

Primum exhibet ordinem Musculorum, qui circa pharyngem collocati à posteriore parte apparent. Cujus melius ostendendi causa, praeter pharyngem eique continuatum stomachi principium, ac proximas ossis hyoïdis, laryngis, arteriae asperae partes; etiam caput osseum nudum, cui adjuncta pharynx, additum est.

Capitis ossi partium plenus index hic non additus, quia intelligentur ex Tabulis, quas paratas habeo, in quibus ossium imagines magnitudine naturali expressae sunt.  
a b. a b c d e Pharyngis Constrictores inferiores. b origo à cartilagine cricoïda. c mucro, in quem à superiore parte desinunt. à c ad d, hic fibrae convenientes, angulos efficiunt. e hic dextrae sinistris incurvo ductu continuatae.  
f Stomachi fibrae interiores, transversae, hac parte nuda. g g exteriores, ex lateribus oblique retrorsum descendentes.  
h Stomachus, truncatus.  
Mox supra i i Cartilago cricoïda. Confer Fig. 14. x x.  
k k Arteria aspera, truncata.  
l l Extrema cornua ossis hyoïdis.  
m. m Ligamenta, quae ab extremis cornubus hyoïdis pertinent ad processus superiores cartilaginis thyreoïdae. Confer Fig. 9. B. B.  
n. n o Pharyngis Constrictores medii. o hic fibrae eorum in angulos conveniunt.  
p q r. p q r Pharyngis Constrictores superiores. q hic oritur à maxilla inferiore juxta dentem molarem intimum. r hic rescissus à Buccinatore.  
s s Pharyngis membrana nuda.  
Mox infra t. t Circumflexi palati mollis.  
u v w. u v w Stylopharyngei. v pars superior & eadem minor. w pars inferior & eadem major.  
x. x Processus styloides ossium temporum. Confer Fig. 9. m. m.  
y. y Processus pterygoidei ossis multiformis.  
z z Os maxillare superius, qua gingivam efficit supra dentes molares intimos.  
α. α Dentes molares intimi, hoc est, quinti, superiores.  
β. β Dentes molares quinti inferiores.

### FIGURAE IX.

Remoto pharyngis Constrictore inferiore, proximam faciem exhibet. Neque additum caput osseum, ne superiora pharyngis obscuraret: eoque minus additum, quod quomodo pharynx adjuncta ei sit, ex proxime superiore Figura intelligi potest. At processus styloides additi, ut appareret Stylopharyngeorum origo.

a. a b c Pharyngis Constrictores medii. b mucro superior, in quem conveniunt. c mucro inferior. A b ad c fibrae in angulos conveniunt.  
d e f. d e f Pharyngis Constrictores superiores. e hic rescissus à Buccinatore. f hac parte à maxilla inferiore oritur.  
g h i i i Pharyngis membrana nuda, h h hic sinuata, qua adjacet eminentibus extremis Reotorum internorum majorum capitis. i i i hic rescissa à basi cranii, secundum superiorem partem tubarum Eustachianarum, foraminumque nati.  
k. k Levatores palati mollis. Confer Fig. 13. & 14. g. g.  
l. l Circumflexi palati mollis. Confer Fig. 14. n. n. & 15. h. h.  
m n. m n Processus styloides ossium temporum, n. n hic ad radices suas rescissi.  
o p q r. o p q r Stylopharyngei. p principium tendineum, oriens à processu styloformi. q pars inferior & eadem major. r pars superior eademque minor.  
s. s t u v v Communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes à Palatopharyngeis inprimis ortae, atque hic, à t ad u, fibris convenientes inter se; hic, ab u ad v, in posticam partem membranae pharyngis evanescentes; hic v insertae cartilagini thyreoïdae.  
w x y. w x y Communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes, quae à Stylopharyngeis oriuntur. x earum portio, inserta lateri externo marginis cartilaginis thyreoïdae, ad radicem processus superioris. y portio, inserta subsequenti parti marginis usque ad radicem processus inferioris.  
z Pharyngis partis inferioris, eique continuatae partis stomachi, membrana nuda.  
A. A Cornua extrema ossis hyoïdis.  
B. B Ligamenta, quae à cornubus extremis hyoïdis pertinent ad processus superiores cartilaginis thyreoïdae.  
C C D D E E F F Cartilago thyreoïda. C. C processus superiores.  
D. D Tubercula



## TABULAE MUSCULORUM DECIMAE EXPLANATIO.

D. D tubercula, quae in lateribus externis ad radices processuum superiorum sunt. E. E margines postici. F. F processus inferiores.  
G G Cartilago cricoidea.  
H H Arteria aspera, truncata.  
I I Cricoarytaenoideus posticus. In altero latere sinister.

### FIGURAE X.

Remoto pharyngis Constrictore medio, proximam faciem ostendit. Praeterea processus styloides addere necessarium non visum, quod in nona existant.

a b c d e e. a b c d e e f g Pharyngis Constrictores superiores. a pars inferior, quae partem superiorem b decussat. c d pars, quae hac c parte rescissa à Buccinatore, hac d oritur à maxilla inferiore. e. e portiones, quae inter Stylopharyngei partem superiorem & inferiorem, & per partis superioris portiones huc procedunt. f mucro superior, in quem dexter sinisterque conveniunt. Ab f ad g ambo fibris suis in angulos conveniunt.  
h Membrana pharyngis nuda, ut Fig. 9. g h h i i i.  
i. i Levatores palati molles. Confer Fig. 13. & 14. g. g.  
k. k Circumflexi palati molles. Confer Fig. 14. n. n. & 15. h. h.  
l m n o p. l m n o p Stylopharyngei. m principium tendineum, n hic rescissum à processu styloidei. o pars superior & eadem minor, quae in duos fasciculos abit, iisque, & utroque quidem separatim, subit Constrictoris superioris fibras. p pars inferior & eadem major.  
q r s. q r s Communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes, quae à Stylopharyngeis producuntur. r portio inserta lateri externo marginis cartilaginis thyreoideae, ad radicem processus superioris. s portio, inserta subsequenti parti marginis usque ad radicem processus inferioris.  
t. t u v w Communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes, quae ab u v fibris suis conveniunt inter se; ab v w in posticam partem membranae pharyngis evanescunt, & ad w inferuntur cartilagini thyreoideae.  
x Pharyngis partis inferioris, eique continuatae stomachi partis, membrana nuda.  
y. y Cornua extrema ossis hyoidis.  
z. z Ligamenta, quae à cornubus extremis hyoidis pertinent ad processus superiores cartilaginis thyreoideae.  
α α β β γ γ δ δ Cartilago thyreoidea. α. α processus superiores. β. β tubercula, quae in lateribus externis ad radices processuum superiorum sunt. γ. γ margines postici. δ. δ processus inferiores.  
ε ε Cartilago cricoidea.  
ζ ζ Arteria aspera, truncata.  
η η Cricoarytaenoideus posticus. Sinister quoque indicatus.

### FIGURAE XI.

Remoto pharyngis Constrictore superiore, proxima haec facies est.

a Membrana pharyngis nuda. Confer Fig. 9. g h h i i i.  
b. b Levatores palati molles. Confer Fig. 13. & 14. g. g.  
c. c Circumflexi palati molles. Confer Fig. 14. n. n. & 15. h. h.  
d. d Hamuli processuum pterygoideorum. Confer Fig. 16. p. p.  
e. e Palatopharyngei.  
f g h i k. f g h i k Stylopharyngei. g principium tendineum, h hic rescissum à processu styloidei. i pars superior & eadem minor. k pars inferior & eadem major.  
l m n. l m n Communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes, quae à Stylopharyngeis oriuntur. m earum portio, inserta lateri externo marginis cartilaginis thyreoideae, ad radicem processus superioris. n portio, inserta subsequenti parti marginis usque ad radicem processus inferioris.  
o. o p q r Communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes, quae à p ad q fibris suis conveniunt inter se, à q ad r in posticam partem membranae pharyngis evanescunt, & ad r inferuntur cartilagini thyreoideae.  
s Membrana nuda pharyngis partis inferioris, eique continuatae stomachi partis.  
t. t Cornua ossis hyoidis extrema.  
u. u Ligamenta, quae ab extremis cornubus ossis hyoidis pertinent ad processus superiores cartilaginis thyreoideae.  
v v w x x y y Cartilago thyreoidea. v. v processus superiores. w. w tubercula, quae in lateribus externis ad radices processuum superiorum sunt. x. x margines postici. y. y processus inferiores.  
z z Cartilago cricoidea.  
A Cricoarytaenoideus posticus. Exhibitus etiam sinister.  
B B Arteria aspera, truncata.

### FIGURAE XII.

Posteriore pharyngis parte tota, una cum proxima stomachi, per laterum longitudinem rescissa, remotaque, interiora, quae tunc apparent, integra exhibet. Addita haec Figura, quo melius sequentes quatuor intelligantur.

a a b b c c Hinc rescissa pharyngis & principii stomachi pars posterior.  
d e. d e Tubae Eustachianae eminentes. c. c ostia, quibus ad latera narium foraminum posticorum patent.  
f Septum narium.  
g. g Cava narium; in iisque h. h ossa spongiosa inferiora, testata membrana mucipara.  
i i k l Palatum molle cum uvula. k hic uvulae corpus eminet. l uvulae propendens pars.

m. m Arcus posteriores, qui se à palati molli lateribus per pharyngis latera demittunt.  
n. n Tonillae ultra arcus posteriores prominentes.  
o o p Lingua. p fossula media, cui uvula incumbit.  
q Epiglottis.  
r. r Latera membranacea glottidis.  
s. s Hic eminent capitula, quae cartilaginibus arytaenoideis insident.  
Intra q r r s s Glottis.  
f Rimula glottidis.  
t Quod vocatur ligamentum laterale epiglottidis, ubi sub membrana vestiente pars communis extremi Stylopharyngei & Palatopharyngei pertinet ad latus epiglottidis. Idem in parte sinistra.  
u. u Concava, quae sunt à lateribus fistulae laryngis, inter eam & cartilaginem thyreoideam.  
v Fistulae laryngis pars posterior, intra pharyngem emens.  
w. w Levatores palati molles. Confer Fig. 13. & 14. g. g.  
x. x Circumflexi palati molles. Confer Fig. 14. n. n. & 15. h. h.  
y. y Hamuli processuum pterygoideorum. Confer Fig. 16. p. p.  
z. z Palatopharyngei, truncati.  
α β γ δ ε. α β γ δ ε Stylopharyngei. β principium tendineum, γ hic rescissum à processu styloidei. δ pars inferior & eadem major. ε pars superior & eadem minor.  
ζ. ζ Extrema cornua ossis hyoidis.  
η. η Ligamenta, quae ab extremis cornubus hyoidis pertinent ad processus superiores cartilaginis thyreoideae.  
θ θ ι ι κ κ Cartilago thyreoidea. θ. θ processus superiores. ι. ι tubercula, quae in lateribus externis ad radices processuum superiorum sunt. κ. κ processus inferiores.  
λ λ Cartilago cricoidea.  
μ μ Arteria aspera, truncata.  
Indicatae quoque Cricoarytaenoideorum posticorum partes, quae ex Figura proxima 11. A cognoscuntur.

### FIGURAE XIII.

Remota maximam partem membrana, qua interiora, quae in Figura quarta & decima expressa, obteguntur; illa ostendit, quae mox sub membrana illa occurrunt. Remotum quoque stomachi principium, arteriaeque asperae, utpote quibus nihil opus hic est.

a a Hinc rescissa pharyngis pars posterior.  
b c. b c Tubae Eustachianae, adhuc testatae membrana, quae interiora faucium efficit, aut vestit. c. c Ostia, quibus ad latera narium foraminum posticorum pertinent.  
d. d Narium concava.  
e. e Ostia spongiosa inferiora, testata membrana mucipara.  
f Septum narium.  
g h i. g h i Levatores palati molles. h principii pars tendinea. i pars inferior, separatim lacertum efficiens.  
k. k Circumflexi palati molles. Confer Fig. 15. h. h.  
l. l Hamuli processuum pterygoideorum. Confer Fig. 16. p. p.  
m Azygus uvulae, à principio implicatus extremis tendineis Levatorum palati molles, & membranae tendinosae, quae à naribus veniens, procedit per superiora palati molles, m Fig. 14.  
n o p. n o p Palatopharyngei. n pars, quae per palatum molle incedit supra Levatorem palati illius, o hic exeuns ex membrana tendinosa, quae à naribus veniens, procedit per superiora palati molles, m Fig. 14. p pars, quae deinde procedit sub Levatore palati.  
q. q Salpingopharyngei, ad Palatopharyngeos sese adiungentes.  
r s t u v. r s t u v Stylopharyngei. s principium tendineum, t hic rescissum à processu styloidei. u pars Stylopharyngei superior eademque minor: v pars inferior eademque major.  
w. w Communium extremorum Palatopharyngeorum, Salpingopharyngeorum, & Stylopharyngeorum partes, quae se per latera pharyngis demittunt, eminentque intra eam, faciuntque arcus posteriores, qui per latera faucium à palato molli descendunt.  
x y. x y Communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes à Stylopharyngeis productae: quarum haec x pars decurrit intus per ligamentum laterale epiglottidis ad marginem epiglottidis lateralem; y haec inserta margini superiori cartilaginis thyreoideae, inter processum ejus superiorem & epiglottidem.  
z. z Palati molles margines postici.  
α Uvula.  
β. β Tonillae, qua ultra Palatopharyngeos eminent.  
γ Lingua.  
δ Epiglottis.  
ε. ε Glottidis latera membranacea.  
ζ. ζ Capitula cartilaginibus arytaenoideis addita.  
η. η Arytaenoidei obliqui, qui in duos fines abeunt; superiorem, per glottidis latera membranacea decurrentem ad epiglottidem: inferiorem, continuantem se Thyreoarytaenoideo.  
θ θ θ θ Arytaenoideus transversus.  
ι ι κ κ Cricoarytaenoidei postici, κ κ orientes à cartilagine cricoidea.  
λ Cartilago cricoidea.  
μ μ Cartilago thyreoidea.  
ν. ν Ligamenta, quae ab extremis cornubus ossis hyoidis pertinent ad processus superiores cartilaginis thyreoideae.  
ξ. ξ Cornua extrema ossis hyoidis.



# TABULAE MUSCULORUM DECIMAE EXPLANATIO.

## FIGURAE XIV.

Remotis Salpingopharyngeis, Azygo uvulae, Palatopharyngeorum partibus, quae supra Levatorum palati mollis extrema decurrunt; membrana, quae latera glottidis inter cartilagine aryaenoideas & epiglottidem efficit; Arytaenoideis obliquis, & transverso, Cricoarytaenoideis posticis; proximam haec Figura faciem exhibet.

- a a Hinc rescissa pharyngis pars posterior.  
b c. b c Tubae Eustachianae, adhuc testae membrana, quae interiora faucium efficit, aut vestit. c c Ostia, quibus ad latera narium foraminum posticorum pertinent.  
d. d Narium concava.  
e. e Offa spongiosa inferiora, testae membranâ muciparâ.  
f Septum narium.  
g h i k l. g h i k l Levatores palati mollis. h principii pars tendinea. i portio, quae se fine tendineo tenui innectit membranae tendinosae, quae incedit per superiora palati mollis, veniens è naribus. k hic dexter sinisterque se continuant inter se. l pars inferior, separatum lacertum efficiens.  
m Membrana tendinosa, quae incedit per superiora palati mollis, veniens è naribus.  
n. n Circumflexi palati mollis. Confer Fig. 15. h. h. & 16. i. i.  
o. o Hamuli processuum pterygoideorum. Confer Fig. 16. p. p.  
p q r s t. p q r s t Stylopharyngei. q principium tendineum, r hic rescissum à processu styloformi, s pars superior eademque minor, t inferior eademque major.  
Ab u ad v Rescissae communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes, quae per posteriorem partem membranae pharyngis decurrunt.  
w. w Palatopharyngeorum partes, quae per palatum molle incedunt sub extremis Levatorum palati illius. Remotae partes eorum, quae incedunt supra extrema illa modo dicta, n. n Fig. 13.  
x. x Communium extremorum Palatopharyngeorum, Salpingopharyngeorum, & Stylopharyngeorum, partes, quae se per latera pharyngis demittunt, eminentque intra eam, ac faciunt arcus posteriores, qui per latera faucium à palato molli descendunt.  
y z. y z Communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes à Stylopharyngeis productae: quarum haec y pars decurrit intus per ligamentum laterale epiglottidis ad lateralem epiglottidis marginem; z haec inserta margini superiori cartilaginis thyreoideae, inter processum ejus superiorem & epiglottidem.  
α. α Palati mollis margines postici.  
β Uvula.  
γ. γ Tonillae.  
δ Lingua.  
ε ζ Epiglottis. ζ corpus teres instar ligamenti.  
η. η Capitula cartilaginibus aryaenoideis addita.  
θ. θ Cartilagine aryaenoideae.  
ι. ι. ι Cartilago cricoidea. ι. ι superficies, à quibus oriuntur Cricoarytaenoidei postici.  
λ. λ. λ Cartilago thyreoidea. λ pars interior.  
ν. ν Ligamenta, quae à cornubus ossis hyoidis pertinent ad processus superiores cartilaginis thyreoideae.  
ξ. ξ Extrema cornua ossis hyoidis.

## FIGURAE XV.

Sequens in hac facies, postquam remoti Levatores palati mollis, & cartilago cricoidea cum aryaenoideis, & quae eis insident additamentis.

- a a Hinc rescissa pharyngis pars posterior.  
b c d. b c d Tubae Eustachianae, b hic adhuc testae membrana, quae interiora faucium efficit, aut vestit. c hic nuda, qua parte adiacebant Levatores palati mollis. d d ostia, quibus ad latera narium foraminum posticorum pertinent.  
e. e Offa spongiosa inferiora, testae membranâ muciparâ.  
f. f Narium concava.  
g Septum narium.  
h i k. h i k Circumflexi palati mollis. i tendo, in quem abit. k pars tendinea principii.  
l Paries externus processus pterygoidei: qui etiam in parte sinistra. m. m hamuli processuum illorum. Confer Fig. 16. p. p.  
n Aponeuroses Circumflexorum. Confer m m n Fig. 16.  
o. o Constrictorum pharyngis superiorum partes, quae oriuntur ab aponeurosis Circumflexorum palati mollis, truncatae.  
p q. p q r Palatopharyngeorum partes, quae per palatum molle incedunt sub extremis Levatorum palati illius. q q q hic exeunt ex aponeurosis Circumflexorum. r hic se continuant inter se.  
Ab s ad s rescissae communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes, quae per posteriorem partem membranae pharyngis decurrunt.  
t. t Communium extremorum Palatopharyngeorum, Salpingopharyngeorum, & Stylopharyngeorum, partes, quae se per latera pharyngis demittunt, eminentque intra eam, arcusque faciunt posteriores, qui per latera faucium à palato molli descendunt.  
v w. v w Communium extremorum Stylopharyngeorum & Palatopharyngeorum partes à Stylopharyngeis productae: quarum haec v pars decurrit intus per ligamentum laterale epiglottidis ad marginem epiglottidis lateralem; w haec inserta margini superiori cartilaginis thyreoideae, inter processum ejus superiorem & epiglottidem.

xyzαβ. xyzαβ Stylopharyngei. y principium tendineum, z hic rescissum à processu styloformi. α pars superior & eadem minor. β pars inferior & eadem major.

γ Uvula.

δ. δ Margines postici palati mollis.

ε. ε Tonillae.

ζ Lingua.

η θ ι. Epiglottis. θ corpus teres instar ligamenti. ι origo ab interiore parte cartilaginis thyreoideae.

κ λ μ ν ξ ζ. Cartilago thyreoidea. κ. κ latera interna. λ tuberculum inaequabile. μ. μ processus inferiores. ν. ν processus superiores. ξ. ξ tubercula, quae in lateribus externis ad radices processuum superiorum sunt.

ο. ο Ligamenta, quae à cornubus extremis ossis hyoidis pertinent ad processus superiores cartilaginis thyreoideae.

π. π Cornua extrema ossis hyoidis.

## FIGURAE XVI.

Haec post superiorem partem proxime praecedentis sequitur, remotis portionibus Constrictorum pharyngis superiorum, proximisque partibus Palatopharyngeorum.

- a. a Hinc rescissa pharyngis pars posterior.  
b c d. b c d Tubae Eustachianae, b d hic adhuc testae membrana, quae interiora faucium efficit, aut vestit. c c hic nuda, qua parte adiacebant Levatores palati mollis. d d ostia, quibus ad latera narium foraminum posticorum pertinent.  
e. e Offa spongiosa inferiora, vestita membranâ muciparâ.  
f. f Concava narium.  
g Septum narium, vestitum membrana mucipara.  
h h Hinc rescissa membrana, quae narium concavum ex interiore parte vestit.  
i k l m. i k l m n Circumflexi palati mollis. k principii pars tendinea. l tendo. m aponeurosis, ad posticum marginem palati ossei pertinens. n hic aponeuroses conjunctae inter se.  
o p. o p Parietes externi processuum pterygoideorum. p p hamuli.

## FIGURAE XVII.

Rictum oris, faucesque exhibet, ad ostendendos musculos, qui, remota membrana vestiente, ad palatum molle ab hac parte apparent pertinere.

- a. a Gingivae.  
b. b Tonillae.  
c. c Margines postici palati mollis: inter quos uvula.  
d d Fauces.  
e Lingua.  
f g. f g h i Constrictores isthmi faucium. f hac parte à lingua ad palatum ante tonillas procedunt; g hac per palatum molle. h hic conveniunt inter se, subtilibus praeterea portionibus in uvulam excurrentes, i.  
k. k Palatopharyngeorum partes, quae per palatum molle decurrunt supra Constrictores modo dictos, sub Levatoribus palati molli.

## FIGURAE XVIII.

Pes extremus ab inferiore parte, in quo expressa, quae mox post integumenta communia sequuntur, aponeuroses, muscoli, ligamenta.

- A B C D E F G H Media plantae aponeurosis, ab altera parte conjuncta cum aponeurosi tegente Abductorem digiti minimi, ab altera cum illa, quae tegit Abductorem pollicis. B ortus ejus à calcanei tubere. C. D. E. F. G Quinque portiones ejus ad digitos pertinentes, quae ad postremum bifidae, complectuntur tendines, pollicis quidem Flexoris longi, reliquorum autem digitorum Flexoris brevis & longi: ab his portionibus propagines quoque tenues excurrunt ulterius per pinguem illam pulpam, quae sub extremis anterioribus ossium metatarsi & ad radices digitorum est; quae ne obscurarent figuram, non expressi. H Portio, quae conjuncta cum aponeurosi Abductorem pollicis tegente, accedit ad principium pollicis Flexoris brevis.  
I K L M N Aponeurosis Abductorem digiti minimi tegens. K ortus ejus à tubere calcanei. L portio, quam inserit capiti primo ossis metatarsi digiti minimi. M portio, qua conjuncta est cum aponeurosi plantae media: quae tamen portio non semper talis inventa. N portio, quam dat principiis Flexoris parvi digiti minimi, & Interossei ejusdem digiti.  
O P Aponeurosis tegens Abductorem pollicis. P ortus ejus à calcaneo.  
Q R S Abductor pollicis. R tendo, S conjunctus cum ligamento, quod ab osse sesamoideo exteriore pertinet ad os primum pollicis, cum eoque ligamento osi illi primo insertus.  
T Ligamentum, quod ab osse sesamoideo pollicis exteriore ortum, pertinet ad os primum pollicis, eique se inserit; conjunctum cum tendine Abductoris pollicis.  
U V W Flexoris brevis pollicis pars pertinens ad os sesamoideum exterius, V hac parte inferens se osse sesamoideo illi; hac W adjungens tendini Abductoris longi pollicis. X Flexoris ejusdem pars, pertinens ad sesamoideum interius.  
Y Z Commune Flexoris brevis Adductorisque pollicis & Transversalis pedis extremum tendineum, insertum osse sesamoideo interiori pollicis, ac deinde conjunctum cum ligamento, quod à sesamoideo illo ad os primum pollicis pertinet, & cum eo osi illi insertum, Z.

a Liga-



# TABULAE MUSCULORUM DECIMAE EXPLANATIO.

- a Ligamentum, quod ab offe sesamoideo interiore pollicis ortum, conjungit se cum extremo tendineo Adductoris pollicis, & cum eo pertinet ad os primum pollicis, eique se inserit.
- æ æ b Tendo Flexoris longi pollicis, b insertus offi pollicis ultimo.
- c Ligamentum, quod tendinem Flexoris longi pollicis continet circa articulum pollicis cum metatarso suo.
- d d Ligamenta duo, quae se decussant, continentque tendinem Flexoris longi pollicis, qua is secundum pollicis os primi ordinis decurrit.
- e f g h Lumbricales: e primus, f secundus, g tertius, h quartus.
- i i i Transversalis pedis.
- k Interosseus secundus digiti primi parvorum.
- Primi ab altero latere adest quoque portio, inter Lumbricalem primum & os metatarsi digiti illius, osque primi ordinis. Ob angustiam loci littera inscribi nequivit. Ad eum cognoscendum juvabit Fig. 22. m.
- l Interosseus secundus digiti hujus secundi parvorum.
- Primi quoque portio ab altero latere adest, inter Lumbricalem secundum & os primi ordinis hujus digiti. Confer Fig. 22. s.
- m m Interosseus secundus digiti tertii parvorum.
- Primi portio quoque adest ab altero latere, inter Lumbricalem tertium & os metatarsi osque primi ordinis digiti hujus. Confer Fig. 22. y.
- n Flexor brevis digitorum pedis.
- o Interosseus digiti minimi; cujus portio quoque adest inter Lumbricalem quartum & os primi ordinis hujus digiti. Confer Fig. 22. ε.
- p Flexor brevis digiti minimi.
- q r Abductor digiti minimi. r tendo, insertus offi primi ordinis minimi illius.
- s, ut in hoc digito, sic in caeteris parvis, Ligamenta, quae continent tendines Flexoris digitorum brevis & longi, circa capita anteriora ossium metatarsi.
- t, ut in hoc, sic in reliquis digitis parvis, Ligamenta, quae continent tendines Flexoris digitorum brevis & longi, circa mediam longitudinem ossium primi ordinis.
- u, ut in hoc, sic in reliquis parvis, Ligamenta, quae continent tendines Flexoris longi digitorum, circa os secundi ordinis.
- v w w Tendo Flexoris brevis digitorum: w. w cornua ejus, quae ad os secundi ordinis pertinent. A cujus tendinis latere pollicem spectante, etiam tendo Flexoris longi. Atque haec in reliquis quoque digitis parvis.
- x Tendo Flexoris longi digitorum, insertus offi tertio. Ejus etiam portio cum ab illo tendinis Flexoris brevis digitorum v latere, quod pollicem respicit; tum inter ejusdem cornua w. w. Confer Fig. 19. Et sic pariter in reliquis digitis parvis.

## FIGURAE XIX.

Primus Musculorum ordo, remotis aponeurosis & ligamentis plerisque Figurae proxime praecedentis.

- A B C D E Abductor digiti minimi, ex duabus partibus, A & B, constans. C D origo à tubere calcanei, unde extrinsecus tendinosus, qua parte cum aponeurosi, qua tegitur, cohaeret. E tendo, insertus offi primo minimi.
- F G H I Abductor pollicis. G ortus à tubere calcanei, unde extrinsecus tendinosus, eaque parte à principio diu cohaeret cum aponeurosi tegente. H tendo, I ad postremum conjunctus cum ligamento, quod ab offe sesamoideo pollicis exteriore pertinet ad os pollicis primum, cum eoque ligamento offi illi primo insertus.
- K Ligamentum, quod ab offe sesamoideo pollicis exteriore ortum, pertinet ad os primum pollicis, eique se inserit; conjunctum cum tendine Abductoris pollicis.
- L M N O P Q R S T U V Flexor brevis digitorum pedis. M ortus ejus à tubere calcanei, unde extrinsecus tendinosus, qua parte à principio diu cohaeret cum media plantae aponeurosi, ut oriri ab ea videatur. N portio ad digitum primum parvorum pertinet: O ejus tendo, qui ad postremum abit in cornua P. Q duo. R portio ad digitum secundum parvorum pertinet: S ejus tendo, ad postremum eodem modo bicornis. T portio pertinet ad tertium: U ejus tendo, pariter bicornis ad postremum. V tendo ad quartum pertinet, similiter ad postremum bicornis.
- W Pars tendinea, quae oritur ab ossis cubiformes tubere imo, & abit in principia Flexoris brevis digiti minimi a, Interossei ejusdem Z, & Interossei secundi digiti tertii parvorum X.
- X Y Interosseus secundus digiti tertii parvorum. Y extremum tendineum, insertum offi primo digiti illius.
- Primi adest quoque ab altero latere portio, inter Lumbricalem tertium, & os metatarsi osque primum digiti hujus. Confer Fig. 22. y.
- Z Interosseus digiti minimi: cujus extremum apparet inter Lumbricalem quartum, & os primi ordinis ejusdem minimi. Confer Fig. 22. ε.
- a b Flexor brevis digiti minimi. b extremum tendineum, insertum offi primo minimi.
- c. d. e. f Lumbricales. c quartus, d tertius, e secundus, f primus. Confer Fig. 20. Z. X. W. S.
- g g h Transversalis pedis. h principium tendineum. Confer Fig. 21. f.
- i Interosseus secundus digiti secundi parvorum.
- Primi quoque portio ab altero latere adest, inter Lumbricalem secundum & os metatarsi osque primi ordinis digiti hujus. Confer Fig. 22. s.
- k Interosseus secundus digiti primi parvorum.
- Primi portio ab altero latere quoque adest, inter Lumbricalem primum & os metatarsi osque primi ordinis hujus digiti. Confer Fig. 22. m.
- l m Tendo Flexoris longi digitorum, m insertus offi tertio. Supra quoque ab illo tendinis Flexoris brevis digitorum latere, quo spectat pollicem, adest pars hujus tendinis Flexoris longi. Idem tendo in reliquis digitis parvis. Confer Fig. 20. N. O. P. Q.

- n o Tendo Flexoris longi pollicis, o insertus pollicis offi ultimo.
- p Abductor pollicis.
- q q Flexoris brevis pollicis pars ad os sesamoideum interius pertinet.
- r s t Extremum tendineum commune Flexori brevi pollicis, Adductori-que, & Transversali pedis. s hac parte insertum offi sesamoideo interiori, t hac conjunctum cum ligamento, quod ab offe sesamoideo interiore pertinet ad os primum pollicis, cum eoque eidem offi insertum.
- u Ligamentum, quod ab offe sesamoideo interiore pollicis pertinet ad os ejus primum, conjungit se cum parte illa extremi communis Flexoris brevis pollicis, Adductorisque, & Transversalis pedis, quae Adductoris est.
- v Pars portionis, quam aponeurosis plantae media dat principiis Flexoris brevis pollicis. Confer Fig. 18. H.
- w x y Flexoris brevis pollicis pars ad os ejus sesamoideum exterius pertinet. x hac parte adjungit se tendini Abductoris pollicis, y hac inserit offi sesamoideo.

## FIGURAE XX.

Secundus ordo Musculorum, remotis, Abductore digiti minimi, maxima parte Abductoris pollicis, Flexore brevi digitorum pedis.

- A B Tendo Flexoris longi digitorum pedis: B nodus, qua se ad calcaneum atterit. C D E F G Caput, quod ad Flexorem digitorum longum in planta accedit, è duabus à principio constans portionibus, C & D. Partis alterius C, origo E à calcaneo. Altera D, tenui tendine F incipit, G à calcaneo oriente. H Portio, quam tendo Flexoris longi digitorum adjungit continuatque tendini Flexoris longi pollicis. I. K. L. M quatuor tendines, in quos una cum capite, quod ad ipsum accedit, abit: qui tendines ad digitos quatuor parvos pertinent N. O. P. Q, per longitudinem quodammodo fissi, R insertique ossibus tertiis.
- S T V Lumbricalis primus, T oriens à tendine primo & secundo Flexoris longi digitorum. V tendo ejus: ex quo & reliquorum tendo intelligitur.
- W Lumbricalis secundus.
- X Y Lumbricalis tertius, Y oriens à tendine secundo & tertio Flexoris longi digitorum.
- Z a Lumbricalis quartus, a oriens à tendine tertio & quarto Flexoris longi digitorum.
- b c d e Tendo Flexoris longi pollicis pedis, c hic portione à Flexoris longi digitorum pedis tendine accepta auctus, dein d per longitudinem quodammodo fissus, ad postremum e insertus est offi ultimo pollicis.
- f g h Tendo Tibialis postici. f nodus ejus, qua ad caput tali applicatus. g hic subtus offi naviculari insertus. h hic insertus cuneiformi magno.
- i k Tendinis Tibialis antici extrema duo, quorum alterum i insertum offi cuneiformi magno, alterum k pertinet ad os metatarsi pollicis.
- l Pars portionis, quam aponeurosis plantae media dat principiis Flexoris brevis pollicis. Confer Fig. 18. H.
- m n Tendo Abductoris pollicis, truncatus. n extremum, quò se cum ligamento, quod ab offe sesamoideo pollicis exteriore pertinet ad os ejus primum, conjungit, inseritque offi primo pollicis.
- o Ligamentum, quod ab offe sesamoideo exteriore pollicis pertinet ad os ejus primum, conjunctum cum extremo tendinis Abductoris pollicis.
- p q r Flexoris brevis pollicis pars, quae ad os sesamoideum pollicis exterius pertinet. q hac parte adjungit sese tendini Abductoris pollicis. r hac inserit sesamoideo exteriore.
- s s Flexoris brevis pollicis pars, quae pertinet ad os sesamoideum interius pollicis.
- t t Abductor pollicis.
- u v w Extremum tendineum commune Flexoris pollicis brevis, Adductoris pollicis, & Transversalis pedis: v hic insertum offi sesamoideo interiori pollicis, w hic conjunctum cum ligamento, quod ab offe sesamoideo interiore pollicis pertinet ad os primum pollicis; eique offi cum ligamento illo insertum.
- x Ligamentum, quod ab offe sesamoideo interiore pollicis pertinet ad os primum pollicis; & conjunctum est cum extremo tendineo Adductoris pollicis.
- y Tendo Peronei brevis.
- z α β Tendo Peronei longi. α nodus, qua juxta calcanei eminentiam incedit. β nodus alter, qua se ad os cubiforme inflectit.
- γ δ ε Ligamentum, quod à calcaneo oriens δ, inserit se cubiformis eminentiae, ad quam se inflectit tendo Peronei longi. ε hac parte insertum eminentiae illi.
- ζ Pars tendinea, quae oritur à cubiformis tubere imo, abitque in principia Flexoris brevis digiti minimi, Interossei ejusdem, & Interossei secundi digiti tertii parvorum. η Excursus ligamenti, cui γ inscripta; qui adjungens se parti tendineae mododictae ζ, cum ea efficit partem tendineam communem θ, quae accedit ad principia Flexoris brevis digiti minimi, Interossei ejusdem digiti, utriusque Interossei digiti tertii parvorum, Adductoris pollicis.
- ι x Flexor brevis digiti minimi, x extremo tendineo insertus offi primo digiti minimi.
- λ Interosseus digiti minimi. Ejus extremum tendineum, quod insertum offi primo hujus digiti, apparet inter Lumbricalem quartum & os primi ordinis digiti hujus: confer Fig. 22. ε.
- μ ν Interosseus secundus digiti tertii parvorum. ν extremum tendineum, insertum offi primo digiti illius.
- ξ Interosseus primus digiti tertii parvorum; cujus Interossei extremum tendineum, insertum offi primi ordinis ejusdem digiti, adest inter Lumbricalem tertium & os metatarsi osque primi ordinis digiti hujus: confer Fig. 22. y.



## TABULAE MUSCULORUM DECIMAE EXPLANATIO.

- Interossei secundi digiti secundi parvorum extremum tendineum, insertum ossi primi ordinis digiti illius.  
Ab altero hujus digiti latere pariter adest extremum tendineum Interossei primi hujus digiti, inter Lumbricalem primum, & os metatarsi osque primi ordinis digiti illius. Confer Fig. 22. s.  
π Interossei secundi digiti primi parvorum extremum tendineum, insertum ossi primi ordinis digiti illius.  
Ab altero quoque hujus digiti latere est extremum tendineum Interossei primi, inter Lumbricalem primum, & os metatarsi osque primi ordinis digiti illius. Confer Fig. 22. m.

### FIGURAE XXI.

Musculorum ordo tertius, remotis, capite, quod ad Flexorem digitorum longum in planta accedit; tendine Flexoris longi digitorum pedis, Lumbricalibus, tendine Flexoris longi pollicis pedis.

- A Tendo Peronei brevis.  
B C D Tendo Peronei longi. C nodus ejus, qua ad calcaneum applicatus. D nodus alter, qua se ad cubiforme inflectit. Caeterum inter r & l portiones, quae insertae ossi cuneiformi magno: confer Fig. 22. g. h.  
E F G H I Tendo Tibialis postici, E hic truncatus. F nodus, qua ad tali caput applicatus. G hic subtus naviculari insertus, H hic insertus ossi cuneiformi magno. I portio, quae se inserit ossi cuneiformi tertio, excurritque praeterea ad os metatarsi secundum, & ad tertium, datque portionem Flexori pollicis brevis.  
K L M M Ligamentum, quod a calcaneo L oriens, pertinet ad os cubiforme, hic M M insertum ei.  
N Pars tendinea, quae oritur a cubiformis tubere imo, abique in principia Flexoris brevis digiti minimi, Interossei ejusdem, & Interossei secundi digiti tertii parvorum. O Excursus ligamenti, cui K inscripsi, qui adjungens se parti tendineae modo dictae N, cum ea efficit partem tendineam communem P, quae accedit ad principia Flexoris brevis digiti minimi, Interossei ejusdem, utriusque Interossei digiti tertii parvorum, Adductoris pollicis.  
Q R Flexor brevis digiti minimi, R extremo tendineo insertus ossi primo digiti illius minimi.  
S Interosseus digiti minimi. Juxta T extremum tendineum, insertum ossi primi ordinis.  
U V Interosseus secundus digiti tertii parvorum. V extremum tendineum, insertum ossi primi ordinis.  
W X Interosseus primus digiti tertii parvorum. X extremum tendineum, insertum ossi primi ordinis.  
Y Z Interosseus secundus digiti secundi parvorum. Z extremum tendineum, insertum ossi primi ordinis.  
a b Interosseus primus digiti secundi parvorum. b extremum tendineum, insertum ossi primi ordinis.  
c d Interosseus secundus digiti primi parvorum. d tendo, insertus ossi primi ordinis.  
e Tendo Interossei primi digiti primi parvorum, insertus ossi primi ordinis.  
f g h i Transversalis pedis. g hac parte oritur a capsula articulum digiti tertii parvorum cum suo osse metatarsi continente h principium tendineum. i extremum, quo se adjungit extremo tendineo communi pollicis Adductoris Flexorisque brevis.  
k l m n Adductor pollicis. l pars ejus quodammodo separata. m pars tendinea principii. n tendineum extremum.  
o p q r s Flexoris brevis pollicis pars, quae pertinet ad os sesamoideum interioris pollicis. p tendo a calcaneo q oriens, cujus tendinis pars abit in principium hujus Flexoris. r tendineum principium hujus partis Flexoris brevis, oriens ab osse cuneiformi medio. s tendinei extremi origo.  
t u v Extremum tendineum commune Flexori brevi pollicis, Adductori-que & Transversali pedis: u hic insertum ossi sesamoideo interiori pollicis: v hac parte conjunctum cum ligamento, quod ab osse sesamoideo interiore ad os primum pollicis pertinet; cum eoque ossi illi insertum.  
w Ligamentum, quod ab osse sesamoideo interiore pollicis oritur, seseque inserit ossi primo pollicis, conjunctum cum Adductoris pollicis tendine.  
x Pars illius portionis aponeurosis plantae mediae, quae abit in principia utriusque partis Flexoris brevis pollicis.  
y z α Flexoris brevis pollicis pedis pars, quae pertinet ad os sesamoideum exterioris pollicis. z hac parte accedit ad tendinem Abductoris pollicis: α hac inserta ossi sesamoideo exteriori pollicis.  
β γ δ Truncatus Abductor pollicis. γ tendo ejus, extremo suo δ conjunctus cum ligamento, quod ab osse sesamoideo exteriori pollicis pertinet ad pollicis os primi ordinis; cum eoque ossi illi insertus.  
ε Ligamentum, quod ab osse sesamoideo exteriori pollicis pertinet ad pollicis os primi ordinis, conjunctum cum tendine Abductoris pollicis.  
ζ η Duae portiones extremae tendinis Tibialis antici: quarum altera, ζ, inserta ossi cuneiformi magno: altera, η, ad os metatarsi pollicis pertinet.

### FIGURAE XXII.

Ordo quartus Musculorum, remotis, tendine Tibialis postici, ligamento, quod a calcaneo oriens, pertinet ad os cubiforme; Flexore brevi digiti minimi, Transversali pedis, Adductore pollicis, Flexore brevi pollicis, ligamenti, quae ab ossibus sesamoideis ad os primum pollicis pertinent; Abductoris pollicis extremo.

- a Tendo Peronei brevis.

- b c d e f g h i Tendo Peronei longi. c nodus, qua applicatus ad calcaneum. d nodus insignior, qua se flectit ad cubiformis eminentiam. e extremum ossi metatarsi pollicis insertum. f portio a tendine abscedens, in duasque partes abeuns g. h, insertas ossi cuneiformi magno. i portio a tendine abscedens, inserta ossi metatarsi secundo.  
k. l Extrema duo tendinis Tibialis antici: quorum alterum k insertum cuneiformi magno, alterum l ossi metatarsi pollicis.  
m n o Interosseus primus digiti primi parvorum. n ortus ejus ab osse metatarsi secundo. o tendo, insertus ossi primi ordinis.  
p q r Interosseus secundus digiti primi parvorum. q principium tendineum, oriens ab osse metatarsi secundo & tertio. r tendo, insertus ossi primi ordinis.  
s t u Interosseus primus digiti secundi parvorum. t ortus ejus ab osse metatarsi tertio. u tendo, insertus ossi primi ordinis.  
v w x Interosseus secundus digiti secundi parvorum. w ortus ejus ab osse metatarsi tertio. x tendo, insertus ossi primi ordinis.  
y z α Interosseus primus digiti tertii parvorum. z ortus ejus ab osse metatarsi quarto. α tendo, insertus ossi primi ordinis.  
β γ δ Interosseus secundus digiti tertii parvorum. γ ortus ejus ab osse metatarsi quarto. δ tendo, insertus ossi primi ordinis.  
ε ζ η Interosseus digiti minimi. ζ origo ejus ab osse metatarsi quinto. η tendo, insertus ossi primi ordinis.

### FIGURAE XXIII.

Syntaxis ossium pedis extremi, ab inferiore parte. Haec addita, ut ex ea ossium partes, quae in praecedentibus pedis extremi Figuris exstant, intelligerentur; praeterquam quod etiam ob hoc addenda erat, quod in Sceleti figuris exhiberi non potuit.


- A B C D E Calcaneus. B tuber, quod calcem efficit. C tuberculum laevi cartilagine crustatum, quod sustinet tendinem Peronei longi. D eminentia, a qua subtus oritur ligamentum K Fig. 21. E sinus, per quem incedit tendo Flexoris longi pollicis.  
F G H Talus. G H caput laevi cartilagine crustatum, cujus capitis pars G ad articulum cum calcaneo pertinet, pars autem H committitur cum ligamento, quod a calcaneo ad naviculare sub hoc capite deductum.  
I K L Os cubiforme. K eminentia, secundum quam incedit tendo Peronei longi. L tuberculum eminens, laevi cartilagine crustatum, ad quod admotus nodus insignis ejusdem illius tendinis.  
M N Os naviculare. N tuber eminens, cui tendo Tibialis postici inseritur.  
O P Q Os cuneiforme magnum. P eminentia, cui tendo Tibialis postici inseritur. Q eminentia, cui inseritur pars tendinis Tibialis antici, k Fig. 22.  
R Cuneiforme minus.  
S T Cuneiforme medium. T tuberculum, a quo oritur tendineum principium Flexoris brevis pollicis, r Fig. 21.  
U V W X Os metatarsi primum, id est, pollicis. V pars, cui inseritur pars tendinis Tibialis antici, l Fig. 22. W superficies, cui inseritur tendo Peronei longi. X Caput anterius, laevi cartilagine crustatum.  
Y. Z Ossa sesamoidea, apposta ad articulum pollicis cum suo metatarsi osse. Y exterius, Z interius.  
a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. Ossa metatarsi digitorum parvorum. a primi, b secundi, c tertii, d e quarti, cujus e tuber eminens. f. f. f. f. f. capita anteriora, laevi cartilagine crustata.  
g. h. i. k. l. m. Ossa primi ordinis, g pollicis, h. i. k. l. digitorum parvorum. m orbita laevi cartilagine crustata: qualis & in reliquis.  
n. o. p. q. r. Ossa secundi ordinis digitorum parvorum. r orbita laevi cartilagine crustata: qualis & in reliquis.  
s t Os ultimum pollicis: t tuberculum extremum, quale & in ossibus tertiis digitorum parvorum.  
u. v. w. x Ossa tertia digitorum parvorum.

### FIGURAE XXIV.

Musculi sub pectore, una cum parte proxima thoracis, ex interiore parte.

- a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w Triangularis sterni. a caput, oriens a costa tertia, b principio: c origo a cartilaginea parte costae, d ab ossea. e Caput, oriens a costa quarta, f principio tendineo: g origo ab ossea parte costae, h a cartilaginea. i Caput, oriens a costa quinta, k principio tendineo: l origo a cartilaginea parte costae, m ab ossea. n Pars tendinea communis duorum capitum superiorum, quae in aliis conjuncta cum o parte tendinea capitis inferioris, in aliis separata: eaque inserta, p extremae cartilagini costae quartae, q ossi pectoris inter extrema cartilaginis costae quartae & quintae, r extremae cartilagini costae quintae, s ossi pectoris inter extremas cartilagineas costae quintae & sextae, t extremae cartilagini costae sextae, u septimae, v ossi cartilaginis mucronatae, w ipsi cartilagini mucronatae.  
x y z α Musculus, Triangulari sterni hic respondens, nonnunquam inventus. y origo ejus ab ossea parte costae secundae, z a cartilaginea. α extremum tendineum, insertum cartilagini costae tertiae.  
β. γ. δ. ε. ζ. η. θ. Costae: β secunda, γ tertia, δ quarta, ε quinta, ζ sexta, η septima, θ octava. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. α. β. γ. δ. ε. ζ. η. θ. Extrema cartilaginea costarum illarum.  
π ς σ τ Os pectoris. π os primum, quod superius: ς secundum, quod medium: σ tertium, quod inferius, & idem cartilaginis mucronatae. τ cartilago mucronata. Reliqua autem ossis pectoris hujus praetereo, cum quod ad rem praesentem non pertinent, tum quod in Tabulis ossium explicabuntur.







# TABULAE ANATOMICAE UNDECIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

**S**equentibus Tabulis singuli Musculi separatim exhibiti sunt, una cum ossibus, quibus affixi, adjectique; partibusque aliis, ad quas pertinent; ut opportunum visum est. Omnia duplo majora quam in Tabulis superioribus, eodem autem positu, & in quantum in iis exstant, plane eadem: paucis exceptis, ad quae positis alius requirebatur, aut naturalis etiam magnitudo; de quibus suis in locis monitum.

Ossium, & aliarum partium figurae, quae pleraeque omnes tantummodo lineares sunt, aut per se satis cognoscuntur, aut ex Tabulis Sceleti, & Ossium: quocirca index non nisi paucis additus.

## MUSCULI PALPEBRARUM AMBITUSQUE OCULI, & SUPERCILII

Adde *Frontales* Fig. 7.

### FIGURAE I.

#### *Orbicularis palpebrarum cum Corrugatore supercilii.*

Quia Corrugator supercilii cum Orbiculari palpebrarum ita conjunctus est, ut pro parte ejus haberi possit, una cum eo exhibitus.

a *Corrugator supercilii*, accedens ad superiorem & ad interiorem Orbicularis partem. A quo Corrugatore extimus Orbicularis margo per canthum minorem genamque fit.

b Origo ejus ab osse frontis, in glabella, & capite supercilii; principio uno, latiore.

In *Syntaxi*, Tab. II. a b in capite. In prima non apparet principium ejus, utpote sub Frontali delitescens.

c d e f g h i k l m *Orbicularis palpebrarum.*

c Principii superioris pars crassior, qua oritur tum ab osse frontis, statim supra priorem partem ossis unguis; tum à vicina parte ossis maxillaris superioris. Ipsa autem origo exhiberi hic nequivit: at facile intelligitur, si conferatur Tab. I. Sceleti.

d Principii inferioris pars crassior, qua in cantho majore oritur ab inferiore parte ligamenti n: & in primis subtus ab ora foraminis oculi, facta à processu nasali ossis maxillaris superioris. Nequivit pariter ipsa ab osse origo hic exhiberi: confer autem Sceleti Tab. I.

e f g Pars crassior, ambitum oculi tenens, hoc est, e supercilium, f magnam genae partem, & g quod ab angulo minore usque in tempus est, circum quem angulum fibrae continuae sunt.

h Pars tenuior principii superioris, qua oritur à superiore parte ligamenti n.

i Pars tenuior principii inferioris, qua oritur ab inferiore parte ligamenti n.

k l Partes tenuiores, quibus palpebrae obductae, quaeque à ligamento n oriuntur, principiis h, i; & suis fibris ultra canthum minorem conveniunt in angulos acutos m, seseque ibi decussant, implicantque.

In *Syntaxi*, Tab. I. m m n o o p q r in capite: ubi juxta canthum majorem, porroque in supercilio, tectus Frontali d e f g.

n Ligamentum, quod ab osse maxillari superiore, è regione commissurae palpebrarum in cantho majore, ex transverso ad commissuram illam deductum.

In *Syntaxi*, Tab. I. s in capite: & Tab. II. g in capite.

o Os frontis. Confer Sceleti Tab. I.

p Processus nasalis ossis maxillaris superioris. Confer Sceleti Tab. I.

### FIGURAE II.

#### *Ciliaris.*

a Pars, quae marginem palpebrae superioris tenet, b oriens à ligamento f.

c Pars marginem tenens palpebrae inferioris, pariterque oriens d à ligamento f.

e Duae illae partes canthum minorem circumeunt continuae.

In *Syntaxi*, Tab. II. h h in capite.

f Ligamentum, quod ab osse maxillari superiore, è regione commissurae palpebrarum in cantho majore, ex transverso ad commissuram illam deductum.

## AURICULAE.

Adde *Attollentem* & *Retrahentes* Fig. 6, & *Attollentem* & *Anteriorem* Fig. 7.

### FIGURAE III.

#### *Auriculae Attollens, Anterior, Retrahentes, ex interiore parte.*

a b c c *Attollens.*

a Principium tendineum, tenue.

b Pars carnea.

c c Extremi tendinei insertio, superiori & eidem priori parti eminentiae, quae in dorso cartilaginis auriculae est, qua extrinsecus cavum illud, quod medium inter crura anthelics.

Fibrae prioris magis in posteriora vergunt, quam posteriores in priora.

Adde Fig. 6. g h, & Fig. 7. o p p q.

d Eminentia, quae in dorso cartilaginis auriculae est, qua extrinsecus cavum illud, quod medium inter crura anthelics.

e f g *Anterior.*

e Principium tendineum.

f Pars carnea, abeuns in extremum tendineum, quod insertum dorso g helicis eminentiae illius, quae concham distinguit, excurrens per eam.

Adde Fig. 7. r r s.

h i k l m *Retrahentes.*

h Principium tendineum Retrahentis superioris.

i Principium tendineum Retrahentis medii, qui hic insignior est, longiusque veniens.

k Venter carneus communis superioris & medii. Quod ut in corpore, è quo hanc figuram sumfi, sic in aliis animadverti. Venterque ille abit in extremum tendineum, hic insertum inferiori parti dorfi l superioris illorum auriculae cavorum, in quae concham helicis eminentia distinguit.

m Retrahentium inferior, ut illo in corpore fuit, insertus dorso n inferioris illorum auriculae cavorum, in quae concham distinguit excurrens helicis eminentia.

Adde Fig. 6. i k l.

### FIGURAE IV.

#### *Helicis major & minor, Tragicus, Antitragicus.*

a b *Helicis major*, principio tendineo oriens à superiore parte partis exterioris acuti helicis processus æ.

b Extremo in aliis helici extrinsecus hic insertus; in aliis per exteriora Attollentis auriculae excurrens.

In *Syntaxi*, Tab. I. ⊙ in capite: & Tab. IX. n in capite.

c *Helicis minor*, helici d e, ubi illa è concha per priora auriculae adscensura, incisuram habet, extrinsecus adjacens, & altero extremo, infra incisuram illam affixus, altero supra eam.

In *Syntaxi*, Tab. I. E in capite: & Tab. IX. o in capite.

f *Tragicus*, oriens à media exteriori parte cartilaginis conchae g, juxta tragus; & ad superiorem partem tragi, vicinamque conchae definens.

In *Syntaxi*, Tab. I. Δ in capite: & Tab. IX. p in capite.

h k k *Antitragicus*, h oriens ab exteriori parte cartilaginis antitragi i, qua ille maxime eminet: k k extremo tendineo insertus margini conchae l, in ipso angulo incisurae, quam cartilago auriculae pone antitragum ad imum helicis habet.

In *Syntaxi*, Tab. I. Π in capite: & Tab. IX. q in capite.

### FIGURAE V.

#### *Transversus auriculae.*

a b c c d Pars ad anthelicem pertinens, cujus partis fibrae longiores sunt. a b principio tendineo oritur à posteriore parte dorfi a b cavi superioris conchae. c c extremo tendineo inserta cavo anthelics dorso c c, & parva etiam parte eminenti dorso scaphae d.

a e e f Pars ad scapham pertinens, è fasciculis constans brevioribus, laxiusque conjunctis, & magnam partem tanquam in plures musculos minores distinctis, ac fere tendineis. Oritur à superiore parte dorfi a f cavi superioris conchae: e e inserta inferiori parti eminentis dorfi scaphae e e.

Hic in praecedentibus Tabulis exhiberi nequivit.



## TABULAE MUSCULORUM UNDECIMAE EXPLANATIO.

### CUTIS CAPITIS, FRONTIS SUPER- CILIORUM, DORSI NASI.

#### FIGURAE VI.

*Occipitalis cum Frontali. Attollens auriculam, & Retrabentes.*

- a b b c d e e. *Occipitalis.*  
a Principium tendineum, oriens ab offe occipitis b b, & temporis.  
c Pars carnea.  
d e e Aponeurosis, in quam caro abit. e e hic Temporalis, qui subjacet, eam attollit.  
*In Syntaxi*, Tab. V. a b c d d in capite: & Tab. IX. a b c d in capite.  
f *Frontalis.*  
*In Syntaxi*, Tab. V. h in capite.  
Vide Fig. 7. a a b & c.  
g h *Attollens auriculam.*  
g Principium tendineum, tenuibus sparsisque filis sensim abscedens ab Epicranio, rotundi ambitus initio.  
h Pars carnea, auriculam fubeuns.  
Adde Fig. 7. o p p q, & Fig. 3. a b c c.  
*In Syntaxi*, Tab. V. f g in capite: & Tab. IX. g h in capite.  
i. k. l *Retrabentes*, auriculam fubeuntes.  
i Superior, k medius, principio tendineo orientes ab offe occipitis.  
l Inferior, pariter ab offe occipitis oriens.  
Adde Fig. 3. h. i k l. m.  
*In Syntaxi*, Tab. V. m. n. o in capite: & Tab. IX. k. l. m in capite.

#### FIGURAE VII.

*Frontales cum Compressoribus narium. Auriculae Attollens, & Anterior.*

- a a b b c d e f g i k *Frontalis.*  
a a Frontalium aponeurosis, qua cum Occipitalibus conjuncti.  
b b Partes carnae, ovato mucrone incipientes, & circa superiorem eandemque mediam frontis partem se conjungentes in unum c.  
d Pars per glabellam excurrent, porroque per dorsum nasi, ubi ad postremum in aponeurosem tenuem abit, quae confluit cum simili tenuitate Compressorum narium; quibus e hac parte implicata, f hac continuata.  
g Portio, quae accedit ad anteriorem partem principii Levatoris labii superioris alaeque nasi: à quo rescissa.  
h Mucro, qui se offi frontis in angulo majore oculi inserit, mox supra ligamentum, quo angulus major oculi alligatus offi maxillari superiori, n Fig. 1.  
i Hic fibrae se ex latere secundum supercilium flectunt ad angulum majorem.  
k Hac parte ad Orbicularem palpebrarum definit. Ubi in aliis animadversae fibrae, quae se Corrugatori circa tempus adjungebant, circumeuntes cum eo canthum minorem.  
*In Syntaxi*, Tab. I. a a b b c d d e e f f g g h h i k l in capite.  
l m n n *Compressores narium.*  
l Principium, oriens ab exteriori parte radices alae nasi.  
m Hic se in membranae speciem extenuat; quae se cum simili membranae Frontalium extremo conjungit f, implicatque e, ac fasciculis subtilibus dorsum nasi confendit, donec eos dexter sinisterque commisceant, n n.  
*In Syntaxi*, Tab. I. t u in capite: ubi ex parte tectus Levatore labii superioris alaeque nasi, x y.  
o p p q *Attollens auriculam.*  
o Principium tendineum, p p tenuibus sparsisque filis sensim abscedens ab Epicranio.  
q Pars carnea, auriculam fubeuns.  
Adde Fig. 6. g h, & Fig. 3. a b c c.  
*In Syntaxi*, Tab. I. Γ Δ in capite.  
r r s *Anterior auriculae.*  
r r Principium tendineum, quod tenuibus sparsisque tendineis filis nascitur ex Epicranio, supra zygoma fere medium.  
s Pars carnea, auriculam fubeuns.  
Adde Fig. 3. e f g.  
*In Syntaxi*, Tab. I. Z in capite. Et Tab. V. k in capite: & Tab. IX. i in capite.  
t Aponeurosis Occipitalis.  
*In Syntaxi*, Tab. I. a.

### N A S I.

Adde Frontalem & Compressorem naris Fig. 7. & Levatorem labii superioris alaeque nasi Fig. 10.

#### FIGURAE VIII.

*Depressor alae Nasi.*

- a a b Principium, quo oritur ab offe maxillari superiore, extrinsecus ubi gingiva, ab alveolis dentium incisorum a a, & canini b.  
c c Hic se inserit circum alae radicem.  
d Hic subtus se inserit, à septo nasi secundum foramen nasi, qua is cum labio cohaeret, usque ad alam.  
*In Syntaxi*, Tab. III. l m in capite; ubi tecta pars Orbiculari oris n. Dein Tab. II. F in capite; ubi magnam partem tectus Nasali labii superioris G, & Orbiculari oris H.

### ORIS ET LABIORUM, QUORUM ALII ETIAM AD GENAS PERTINENT, ALII AD BUCCAS, ALII AD LOCA, QUAE SUNT A MENTI LATERIBUS.

Adde Latissimum colli Fig. 16.

#### FIGURAE IX.

*Depressores Labii inferioris.*

- a a. a Origo ab exteriori parte maxillae inferioris, paullo supra imum ejus marginem, à latere menti.  
b b Extrema, quae pertinent ad totam prope longitudinem labii inferioris, hoc ubi rubrum esse incipit, desinentia.  
c Hic se decussant.  
Adde Fig. 16. m f.  
*In Syntaxi*, Tab. II. K K L M in capite. Dein Tab. I. M M N in capite; ubi majorem partem tecti Depressoribus angulorum oris Q. Q, & fasciculis subtilibus L L, qui partim procedunt à Zygomaticis majoribus, partim à Depressoribus angulorum oris veluti abludunt.  
d e Orbicularis oris pars, quae est in rubro margine labiorum. Haec addita, quo appareat, quomodo Depressores labii inferioris ad eam in labio inferiore definant.

#### FIGURAE X.

*Levator labii superioris alaeque nasi. Levator labii superioris. Portio ab Orbiculari palpebrarum accedens ad labium superius. Zygomaticus minor, & major. Depressor anguli oris. Nasalis labii superioris. Orbicularis oris.*

- Hi omnes simul exhibiti, quod adeo cohaerent inter se.  
a b c *Levator labii superioris alaeque nasi.*  
a Origo à processu nasali ossis maxillaris superioris, juxta canthum majorem oculi, principio tendinoso.  
b Extremum, quod per labium superius juxta nasi latus decurrit, per priora Nasalis labii superioris, sensim extenuatum, perque labium evanescens. Ubi juxta alam nasi procedit, fasciculos inferere solet superiori ejus parti juxta genam: quod exhiberi hic non potuit.  
c Portio tenuis, quam per pingue lateris nasi demittit ad alam, eam versus paulatim evanescentem.  
d Portio, quae ad anteriorem ejus partem accedit à Frontali, g Fig. 7: à quo rescissa.  
*In Syntaxi*, Tab. I. w x y in capite: ubi principium ejus ex parte tectum Orbiculari palpebrarum q.  
e e f *Levator labii superioris.*  
e e Principium simplex, quo in gena supra foramen, quod infra orbem offeum oculi est, oritur, secundum inferiorem partem orbis illius.  
f Extremum, quod per labium superius super Orbicularis oris partem, quae à Nasali labii superioris efficitur, excurrent, insigniter extenuatum sensim evanescit. In fine conjungit se cum Levatore labii superioris alaeque nasi.  
*In Syntaxi*, Tab. I. z A in capite: ubi principium ejus tectum Orbiculari palpebrarum q m.  
g h *Portio ab Orbiculari palpebrarum accedens ad labium superius.*  
g Hic rescissa ab Orbiculari illo.  
h Extremum, quod se mox ab altera parte adjungit ad Levatorem labii superioris, post ab altera ad Zygomaticum minorem, & cum iis se per labium superius extenuat, definitque.  
*In Syntaxi*, Tab. I. B in capite.  
i k *Zygomaticus minor.*  
i Ortus à priori parte lateris externi ossis jugalis, aliquanto infra quam à media lateris illius altitudine.  
k Extremum extenuatum, quo per labium superius supra Orbicularem oris excurrit, ut proxime praecedentes.  
*In Syntaxi*, Tab. I. C in capite: ubi principium contactum est Orbiculari palpebrarum m.  
l m n *Zygomaticus major.*  
l Origo ab externo latere ossis jugalis, paullo supra ejus marginem inferiorem, ibi ubi processum posteriorem inchoat.  
m Hic abit in Depressorem anguli oris.  
n Subtiles fasciculi, qui per exteriora primum Depressoris anguli, dein Depressoris labii inferioris, excurrunt, à latere anguli per proximam labii inferioris partem in latus oppositum.  
Adde Fig. 13. a b c d e.  
*In Syntaxi*, Tab. I. E F G in capite: ubi principium ex parte tectum Orbiculari palpebrarum m.  
o o m *Depressor anguli oris.*  
o o Origo; ab exteriori parte imi marginis maxillae inferioris, à latere menti.  
m Extremo suo se ab exteriori parte continuat Zygomatico majori.  
Adde Fig. 11. a b c, & Fig. 12. e f g, & Fig. 13. f g h i.  
*In Syntaxi*, Tab. I. Q R R S in capite.  
p Subtiles fasciculi, a Depressore anguli velut abludentes, unaque cum similibus Zygomatici majoris n, per exteriora Depressoris labii inferioris excurrentes.  
*In Syntaxi*, Tab. I. L in capite.  
q r *Nasalis labii superioris*, qui pro capite ad Orbicularem oris accedente haberi potest.



## TABULAE MUSCULORUM UNDECIMAE EXPLANATIO.

q Principium, oriens in globo nasi ab apice cartilaginis, è qua cum pare ejus globus ille majorem partem fit: indeque continuo secundum marginem septi, ex ejus involucris, usque qua labium septo continuatum.

r Hic se ad Orbicularem oris adjungit.

Adde Fig. 11. f.

In *Syntaxi*, Tab. II. G in capite. Dein Tab. I. H in capite: ubi (ut hic) ex parte tectus extremo Levatoris labii superioris alaeque nasi y, Levatoris labii superioris A, portionis ab Orbiculari palpebrarum accedentis B, Zygomatici minoris C.

s t Orbicularis oris.

t Pars, quae est in rubro margine labiorum.

Adde Fig. 11. g h i, & Fig. 12. h i, & Fig. 13. m o, & Fig. 14. f g h i k l.

In *Syntaxi*, Tab. I. I K K in capite: ubi (ut hic) in labio inferiore tectus est Zygomaticis majoribus L. L., & Depressoribus labii inferioris L. Q. L. Q.

u Depressor labii inferioris, hic magnam partem tectus Depressore anguli oris o o m: itemque subtilibus fasciculis, ab eo veluti abludentibus p; & excurrente portione tenui Zygomatici majoris n, ut in *Syntaxi*, Tab. I. M N tectus Q L in capite.

Vide Fig. 9. a a b c.

Ex sinistris his dextri facile cognoscuntur.

### FIGURAE XI.

*Zygomaticus major. Depressor anguli oris. Levator anguli. Nasalis labii superioris. Orbicularis oris.*

k l m Zygomaticus major.

l Hic resecta pars exterior, quae se continuat Depressori anguli, & excurrit per labium inferius. Confer m o Fig. 10.

m Pars tenuis, quae decurrit pone continuationem Depressoris Levatorisque anguli oris, c Fig. 13.

a b Depressor anguli oris.

b Hic resecta pars exterior, quae se continuat Zygomatico majori. Confer o o m Fig. 10.

c Pars, quae abit in Nafalem labii superioris, inque exteriorem partem Orbicularis oris, qua is labium superius ab oris angulo juxta os ambit. Jacet haec pars Depressoris sub fibris Zygomatici majoris, n Fig. 10; hic remotis.

Adde Fig. 12. e f g, & Fig. 13. f g h i.

d d e Levator anguli oris, hic à principio quodammodo biceps.

d d Origo è fossula, quae in priori parte ossis maxillaris superioris, inter dentes molares primos & foramen, quod infra orbem ossium oculi est.

e Hac parte se continuat Depressori anguli.

Adde Fig. 12. a b c d.

In *Syntaxi*, Tab. II. BC in capite. Dein Tab. I. DD in capite: ubi tectus Zygomatici majoris parte exteriore G, quae se continuat Depressori anguli oris, & per labium inferius excurrit: tectus & Zygomatico minore C, & portione ab Orbiculari palpebrarum accedente ad labium superius B, & Levatore labii superioris z A.

f Nasalis labii superioris, nudus: qui se ad Orbicularem oris in labio superiore adjungit, continuatque Depressori anguli oris.

Vide Fig. 10. q r.

In *Syntaxi*, Tab. II. G in capite.

g h i i Orbicularis oris.

g Pars, quae est in labio superiore; hic continuatio Depressorum anguli oris c.

h Pars, quae in labio inferiore.

i. i Partes, quae in rubro margine labiorum.

Adde Fig. 12. h i, & Fig. 13. m o, & Fig. 14. f h i k l.

In *Syntaxi*, Tab. III. n o p p q r s in capite. Dein Tab. II. H I I in capite, ubi in labio inferiore tectus Depressoribus labii illius K K M. Dein Tab. I. I K K in capite: ubi in labio inferiore tectus est Depressoribus labii inferioris L Q. L Q, & Zygomaticis majoribus L. L.

### FIGURAE XII.

*Levator anguli oris, Depressorque. Orbicularis oris.*

a b c d Levator anguli oris.

a b Quodammodo biceps à principio.

c Pars ejus, quae se continuat interiori parti Depressoris anguli oris.

d Pars, quae ad exteriorem partem Orbicularis oris accedit, qua is se per labium inferius flectit.

Vide Fig. 11. d d e.

e Depressor anguli oris.

f Hinc resecta Depressoris pars exterior, quae ex parte se continuat Zygomatico majori, m Fig. 10, & b Fig. 11; ex parte accedit ad Orbicularem oris, c Fig. 11.

g Pars interior, quae Levatori anguli oris continuata.

Vide Fig. 10. o o m.

h i Orbicularis oris.

h Pars, quae est in labio inferiore; hic continuatio Levatorum angulorum oris d.

i Pars, quae in labio superiore.

Vide Fig. 11. g h i i.

k Nasalis labii superioris. Vide Fig. 11. f.

l Hic Orbicularis oris truncatus est, remotaque illa ejus pars, quae Levatorem anguli oris tegit in Fig. 11.

m Zygomaticus major, ut Fig. 11. k l m.

### FIGURAE XIII.

*Zygomaticus major. Depressor anguli oris. Orbicularis oris. Buccinator.*

a b c d e Zygomaticus major.

b Hic resecta pars exterior, quae se continuat Depressori anguli, & excurrit per labium inferius: ut Fig. 11. l.

c Pars tenuis, quae decurrit pone continuationem Depressoris Levatorisque anguli oris: eadem, quae Fig. 11. m. Eaque deinde

d se potissimum adjungit exteriori parti Buccinatoris, cum eoque pergit ad Orbicularem oris, ejus deinde partem in labio superiore efficiens:

e praetereaque aliqua parte se deorsum curvat, continuatque interiori parti Depressoris anguli oris.

f g h i Depressor anguli oris.

g Hinc, ut Fig. 12. f, resecta pars exterior, quae ex parte se continuat Zygomatico majori, m Fig. 10, & b Fig. 11; ex parte accedit ad Orbicularem oris, c Fig. 11.

h Hic resecta pars interior, quae continuata Levatori anguli, g Fig. 12.

i Pars, quae ad interiorem partem Orbicularis oris in labio superiore accedit.

k k Buccinator. Vide Fig. 14. a & c.

l Nasalis labii superioris, k Fig. 12.

m Orbicularis oris pars, quae est in labio superiore, i Fig. 12.

n Hic truncata, ut l Fig. 12.

o Orbicularis oris pars, quae est in labio inferiore, h Fig. 12.

p Hic truncata, ubi ad eam extrinsecus accedit pars Levatoris anguli, d Fig. 12.

### FIGURAE XIV.

*Buccinator. Orbicularis oris.*

a b c d e Buccinator.

b Pars, quae abit in Orbicularis oris partem, quae est in labio superiore.

c Pars, quae abit in Orbicularis oris partem, quae est in labio inferiore.

d Buccinatoris fasciculus, qui ad labium superius procedit, acceditque ibi ad interiorem partem Orbicularis oris.

e Hac parte Buccinator continuat se portioni k l, ad Orbicularem oris accedenti.

Vide Fig. 13. k k, & adde Fig. 23. Tab. XII.

In *Syntaxi*, Tab. III. v w x y z in capite. Dein Tab. II. z in capite: ubi pars tecta Levatore anguli oris B, & Depressore E; pars pone Masseterem r delitescit. Dein Tab. I. T in capite: ubi pariter tectus Levatore anguli oris D, & Depressore Q S, & pone Masseterem V delitescit; & praeterea tectus Zygomatico majore E G, & Latissimo colli d y y.

f g h i Orbicularis oris.

f Pars, quae in labio superiore est.

g Hic resectus Depressor anguli oris, qua abit in exteriorem partem Orbicularis oris, qua is labium superius ab angulo oris juxta os ambit, c Fig. 11.

h Pars, quae est in labio inferiore.

i Hic subit fasciculum d, & continuatur Buccinatori. Extrinsecus autem accipit partem Levatoris anguli, d Fig. 12, hic remotam.

k l Portio, quae ad Orbicularem oris accedit, procedens à maxilla inferiore.

k Origo ejus ab exteriore parte maxillae inferioris, infra eminentem alveolum dentis canini.

l Hinc porro se continuat Buccinatori.

Adde Fig. 11. g h i i, & f, & Fig. 12. h i d, & k, & Fig. 13. m o i, & l.

In *Syntaxi*, Tab. III. t u in capite: ubi primum initium tectum Levatore menti β. Dein Tab. II. ubi inter Depressorem labii inferioris K L & Depressoris anguli oris partem E in capite: caeterum tectus ibi utroque; & quae ibi nuda pars, ea in Tab. I. Depressori anguli Q R R S in capite, subiecta.

### MENTI.

### FIGURAE XV.

*Levatores menti.*

a Principium oriens à priori parte maxillae inferioris, mox infra marginem ejus superiorem, ab alveolo incisoris lateralis, ab eoque ab altera parte usque ad alveolum incisoris medii, ab altera usque ad canini alveolum.

b Hic ad se mutuo curvati, se in mento commiscunt, partimque continuant.

c Fasciculi, quos pingui menti immiscunt.

In *Syntaxi*, Tab. III. β γ δ in capite: ubi à principio tecti Orbiculari oris r. Dein Tab. II. N O in capite: ubi pars major subiecta Depressoribus labii inferioris K K. Dein Tab. I. O P in capite: ubi pariter pars major subiecta Depressoribus labii inferioris M M.

*ORIS, LABII INFERIORIS, VICINAE MALAE, AURICULAE, CUTIS COLLI QUAE EST INFRA MALAM, USQUE IN PECTUS ET HUMERUM.*

### FIGURAE XVI.

*Latissimus colli, cum Depressore labii inferioris.*

a a a & c. Latissimus colli.

a a a Principium è tenuibus magnamque partem sparsis fasciculis constans: quo in pectore infra claviculam, & in humero incipit.

b. b. b Fasciculi, qui in quibusdam hominibus in latere colli accedunt.

c. c Fasciculi sparsi, quibus in mala evanescentibus definit.

d Fasciculus, qui per exteriorem partem Depressoris anguli oris porrectus angulum illum versus.

e Pars tenuis, quae subit Depressorem anguli oris, cum eoque decurrit, seseque conjungit.

f Hic portionem dat Depressori labii inferioris.

g g Hic se maxillae inserit, infra ortum Depressoris anguli oris.



## TABULAE MUSCULORUM UNDECIMAE EXPLANATIO.

h h Hic maxilla, quam conscendit, eminet.  
i k Hic eminent, i Sternomastoïdeus, k Cleidomastoïdeus; quos vestit.  
l l Hic clavicula eminet.  
*In Syntaxi*, Tab. I. Ω &c. in collo.  
m *Depressor labii inferioris*. Vide Fig. 9. a a b c.  
n Depressor anguli oris hic truncatus.

### PALPEBRAE SUPERIORIS. GLOBI OCULI.

#### FIGURAE XVII.

*Syntaxis Musculorum, qui in cavo osseo oculi sinistri collocati sunt, à superiore parte exhibita, una cum tarso palpebrae superioris, globo oculi, nervo optico, cartilagine orbiculi Obliqui superioris.*

a Levator palpebrae superioris. Vide Fig. 21. A principio ex parte subjacet Obliquo superiori. Confer Figuram eandem.  
b Tarsus palpebrae superioris.  
c Rectus attollens, qui Levatori palpebrae magnam partem subjacet. Vide & confer Fig. 23.  
g Rectus deprimens. Vide Fig. 18. d d, & Fig. 19. i k.  
f Rectus abducens. Vide Fig. 18. a b, & Fig. 19. a b c d. Ex parte in fine subjacet Levatori palpebrae superioris: confer Fig. 18. Ab initio Recto attollenti: confer Fig. 18. Itemque nervo optico: vide Fig. 18.  
d Obliquus superior, cum cartilagine orbiculi, circa quam se tendine suo inflectit. Vide Fig. 22. Tendo in fine subjacet Levatori palpebrae superioris, & Recto attollenti. Confer Figuram eandem.  
e Rectus adducens, subjectus Obliquo superiori. Vide Fig. 18. c, & Fig. 19. e f g h.  
h Obliquus inferior. Vide Fig. 19. l l m.  
i Globus oculi. Vide Fig. 18. g.  
k Nervus opticus, truncatus. Vide Fig. 18. i.  
Initia Obliqui superioris, Levatoris palpebrae superioris, Recti attollentis, ambiunt nervum opticum: quemadmodum ab inferiore parte initia Recti abducentis, deprimentis, adducentis, Fig. 20.

#### FIGURAE XVIII.

*Remotis Musculis primis figurae proxime praecedentis, Levatore palpebrae superioris cum tarso, Recto attollente, Obliquo superiore cum cartilagine orbiculi sui, proxima facies exhibita.*

a b Rectus abducens. b tendo scleroticae insertus. Principium crassius jacet sub nervo optico. Vide Fig. 19. c.  
c Rectus adducens. Caput crassius subjacet nervo optico. Confer Fig. 19. f.  
d d Rectus deprimens. Vide Fig. 19. i k.  
e f Obliquus inferior. Vide Fig. 19. l l m.  
Ejus extremum latum e scleroticae innexus, in externo globi latere, inter nervum opticum, & mediam rotunditatem, quae inter eum & corneam intercedit.  
g h Globus oculi. h cornea.  
i Nervus opticus.

#### FIGURAE XIX.

*Musculos eosdem exhibet, quos Figura octava & decima, remoto globo oculi cum nervo optico.*

a Rectus abducens, c caput praecipuum, ab initio tendineum, a Fig. 26.  
b caput gracilius, tendineum, c Fig. 26. d tendo, in quem abit. Confer Fig. 18. a b.  
e Rectus adducens. f caput praecipuum, majorem partem tendineum, a Fig. 25. g caput gracilius, tendineum, b Fig. 25. h tendo, in quem abit. Confer Fig. 18. c.  
i Rectus deprimens, qui à principio subjacet Recto abducenti a, & adducenti e. k tendo, in quem abit. Confer Fig. 18. d d.  
l l Obliquus inferior. m principium tendineum. Confer Fig. 18. e f.

#### FIGURAE XX.

*Est Syntaxis Figurae octavae decimae, ab inferiore parte exhibita.*

a Rectus adducens. c caput crassius, majorem partem tendineum, a Fig. 25. b tendo, in quem abit. Confer Fig. 18. c, & Fig. 19. e.  
d e f Rectus abducens. e caput gracilius, tendineum, c Fig. 26. f tendo, in quem abit. Confer Fig. 18. a, & Fig. 19. a.  
g g Rectus deprimens. Vide Fig. 24. & confer Fig. 18. d d, & Fig. 19. i k.  
h Obliquus inferior. i principium tendineum. Extremo suo subit Rectum abducentem d. Confer Fig. 18. e f, & Fig. 19. l l m.  
k l Globus oculi. l cornea.  
m Nervus opticus.

#### FIGURAE XXI.

*Levator palpebrae superioris.*

a a Principium tendineum, quo à principio cum Recto attollente oculi cohaeret, unaque cum eo & oritur à superiore, & à proxima interiore parte foraminis ossis multiformis, quo nervus opticus cavum osseum oculi intrat; & subtus etiam cohaeret cum vagina nervum opticum continente, portionibus tendineis exiguis, tanquam excursu quodam tendineo.  
b Pars carnea.

c Aponeurosis, in quam abit; pertinens ad palpebrae superioris cartilaginem, cui tarsi nomen.

d Tarsus palpebrae superioris.

e e Globus oculi.

f f Nervus opticus.

*In Syntaxi*, Fig. 17. a; ubi principium ejus ex parte subjacet principio Obliqui superioris d.

Adde & Fig. 27. a.

#### FIGURAE XXII.

*Obliquus superior.*

a Principium tendineum, quo oritur à superiore & eadem laterali exteriori parte ambitus foraminis, quo nervus opticus intrat; & subtus etiam quodam veluti excursu tendineo cum vagina nervi optici cohaeret.

b Venter carneus.

c Tendo, qui d curvat se circum cartilaginem orbiculi, quem transiit: post recurrit ad superiorem partem globi; ad quem appropinquans latefcit & extenuatur, ad postremumque se scleroticae oblique inserit e; & quidem, si globum à priore parte in posteriorem metiaris, paullo post mediam summam partem ejus: si per transversum, aliquanto ultra medium, in latus externum.

f Cartilago orbiculi alicujus, ossi frontis juxta canthum majorem sub supercilio affixi: quem tendo Obliqui superioris transiit.

*In Syntaxi*, Fig. 17. d; ubi tendo sub Levatore palpebrae superioris a primum, dein Recto attollente, incedit. Adde Fig. 27. d.

g h Globus oculi. h cornea.

i Nervus opticus.

#### FIGURAE XXIII.

*Rectus attollens.*

a a Principium tendineum, quod ab initio cohaeret cum Levatore palpebrae superioris, unaque cum eo oritur ab interno latere partis superioris foraminis optici: praetereaque à margine ossis multiformis, qui inter foramen optici, & quod mox infra illud sequitur, medius: & subtus etiam exiguis portionibus tendineis, tanquam tendineo quodam excursu, cohaeret cum vagina nervi optici.

b Venter carneus.

c Superficies tendinosa, qua tendo d hic incipit, scleroticae extremo suo innexus.

*In Syntaxi*, Fig. 17. c; ubi ex parte tectus Levatore palpebrae superioris a. Adde Fig. 27. b c c.

e f Globus oculi. f cornea.

g Nervus opticus.

#### FIGURAE XXIV.

*Rectus deprimens, ab inferiore parte.*

a Principium tendineum, nihil quicquam cum optici nervi vagina cohaerens, oriensque ab inferiore & eadem cavum osseum oculi respiciente parte portionis osseae, quae foramen optici, & quod mox infra illud sequitur, discriminat. Animadverti & exigua parte oriens à ligamento illo, quod à latere inferioris partis foraminis optici, qua respicit foramen, quod mox infra sequitur, pertinet ad illius foraminis marginem oppositum, qua foramen illud rotundum est, juxta principii rimae, in quam abit, marginem inferiorem.

b Venter carneus.

c Superficies tendinosa, qua tendo d hic incipit, extremo suo scleroticae innexus.

*In Syntaxi*, Fig. 20. g g, & Fig. 19. i k, ubi à superiore parte à principio tectus Recto adducente e, & abducente a. Adde & Fig. 18. d d, & Fig. 17. g. Adde & Fig. 27. l.

e f Globus oculi. f cornea.

g Nervus opticus.

#### FIGURAE XXV.

*Rectus adducens, à latere.*

a Caput crassum, idque tendineum, quo oritur ab inferiore parte foraminis optici, & à proxima lateris ejus illius, quo respicit nasum. Cum vagina nervi optici nihil quicquam cohaeret.

b Caput gracile, pariter tendineum; quod ab initio cohaerens cum Levatore palpebrae superioris & Recto attollente, unaque cum iis cum Obliquo superiore; cum iis & à foramine optici oritur, & cum nervi illius vagina cohaeret.

c Venter carneus.

d Superficies tendinosa, qua tendo e hic incipit, scleroticae innexus extremo suo.

*In Syntaxi*, Fig. 17. e; ubi subjacet majorem partem Obliquo superiori d, & à principio etiam Levatori palpebrae superioris. Dein Fig. 18. c, & Fig. 19. e, & Fig. 20. a. Adde Fig. 27. e f g.

f g Globus oculi. g cornea.

#### FIGURAE XXVI.

*Rectus abducens, à latere.*

a Caput crassius, à principio tendineum: quod primum cum Recto depresso oritur, ab inferiore autem parte foraminis optici, juxta latus externum: continuoque inde inferiore parte sui à ligamento i, & ubi ligamentum illud definit, continuo inferiore pariter parte sui (hic truncata b) oritur à proxima parte marginis foraminis, quod mox infra opticum sequitur. Atque hoc caput nihil quicquam cum optici vagina cohaeret.

c Caput gracilius, tendineum; quod ab initio cohaeret cum Recto attollente,



## TABULAE MUSCULORUM UNDECIMAE EXPLANATIO.

te, unaque cum eo & à foramine optici oritur, & cum vagina nervi illius cohaeret.

d Venter carneus.

e Superficies tendinosa, qua tendo f hic incipit, extremo suo innexus scleroticae.

In Syntaxi, Fig. 17. f, & Fig. 18. a, & Fig. 19. a, & Fig. 20. d. Adde Fig. 27. h i k.

g h Globus oculi. h cornea.

i Ligamentum, quod à latere inferioris partis foraminis, quo nervus opticus intrat, qua parte foramen illud respicit foramen quod mox infra sequitur, incipit, indeque pertinet ad oppositum sibi marginem foraminis illius, qua id rotundum est, juxta inferiorem marginem principii rimae, in quam abit.

### FIGURAE XXVII.

*Musculi oculi omnes cum Levatore palpebrae superioris, in cavo osseo oculi, à priori parte. Rescissae partes anteriores Rectorum, Obliqui superioris, & Levatoris palpebrae.*

Haec Figura aliquantum differt à Tab. IV. quemadmodum in aliis animadverti.

a Levator palpebrae superioris. Cujus origo ob Rectum attollentem exhiberi nequivit. Confer Fig. 21. a a.

In Syntaxi, Tab. IV. a b b in capite. Rescissa autem pars anterior, Tab. II. c d in capite: qua in Tab. I. jacet post Orbicularem palpebrarum, o in capite.

b Rectus attollens, c c oriens à superiore parte foraminis optici, & à margine ossis multiformis, qui inter foramen illud, illudque, quod mox infra sequitur, medius. Adde Fig. 23. a a.

In Syntaxi, Tab. IV. e f in capite. Rescissa pars anterior, Tab. III. e in capite: quae in Tab. II. jacet post Levatorem palpebrae superioris, c d in capite.

d Obliquus superior. Exhiberi origo nequivit, utpote hic delitescens post principia Recti adducuntis, & attollentis, Levatorisque palpebrae. Adde Fig. 22. a.

In Syntaxi, Tab. IV. c d in capite. Rescissa pars anterior, Tab. III. c d in capite: quae ibi subit Rectum attollentem e, & qua parte nuda, ea in Tab. II. jacet post Levatorem palpebrae superioris, c d in capite.

e f g Rectus adducens, f capite graciliore oriens à superiore parte lateris externi foraminis optici: ubi ab initio cohaeret cum Recto attollente, Levatore palpebrae superioris, & Obliquo superiore. Adde Fig. 19. g, & Fig. 25. b.

g Crassiore capite oritur ab inferiore parte foraminis optici, & à proxima lateris ejus illius, quo respicit nasum. Adde Fig. 19. f, & Fig. 25. a.

Inter caput crassius & nervum opticum procedit arteriola à carotide interna.

In Syntaxi, Tab. IV. g h in capite. Rescissa pars anterior, Tab. III. f in capite.

h i k Rectus abducens, i capite graciliore oriens à margine ossis multiformis, qui inter foramen optici, & quod mox infra illud sequitur, medius: eoque capite cohaerens cum Recti attollentis initio. Adde Fig. 19. b, & Fig. 26. c.

k Crassiore, ab inferiore parte foraminis optici, juxta latus externum. Adde Fig. 19. c, & Fig. 26. a b.

Inter illa capita procedit, osseumque oculi cavum intrat truncus sexti paris nervorum cerebri, & tertii, ejusque ramus ad Rectum attollentem.

In Syntaxi, Tab. IV. i l in capite. Rescissa pars anterior, Tab. III. g in capite.

l Rectus depressor; cujus origo exhiberi hic nequivit, quippe quae delitescit sub principis adducuntis & abducuntis, g k. Vide Fig. 24. a.

In Syntaxi, Tab. IV. m n in capite. Rescissa pars anterior, Tab. III. h in capite.

m n o p Obliquus inferior. m Pars exterior, n interior. o principium tendineum, oriens in fundo foraminis oculi, juxta oram ejus, ab osse maxillari superiore, inter futuram ibi loci ossis illius propriam, & os unguis. Adde Fig. 19. l m.

p Extremum à globo resectum.

In Syntaxi, Tab. IV. o p q in capite. Et Tab. III. i k in capite; ubi extremo suo Rectum abducuntem g subit.

q Foramen, quo nervus opticus intrat.

r Foramen, quod mox infra opticum sequitur.

### MALLEI & MEMBRANAE TYMPANI. STAPEDIS.

Hi in Tabulis superioribus exhiberi nulla ex parte potuerunt. In hac, ob parvitatem, magnitudine naturali exhibiti.

### FIGURAE XXVIII.

*Musculi, qui vocantur auris internae, una cum ossiculis auditus, osseque temporis, in quo siti; & multiformis parte.*

a Laxator tympani, oriens à superiore parte marginis tympani, juxta finem porii acustici, ibi ubi membrana tympani adhaeret. Insertus manubrio mallei juxta radicem processus brevioris. Confer Fig. 30.

b c d Externus mallei.

b Origo ab exteriori parte acuti processus, quem ultimus ossis multiformis angulus, inter os squamosum & petrosum interfertus, exigit.

c Venter tumidulus.

d Tendo, qui intrat rimam s, quae ad finem commissurae ossis squamosi & petrosi relicta: posteaque pergit per eum extremi osseae partis illius, quae porum acusticum continet, finem, per quem malleus processum suum longissimum eundemque gracillimum porrigit, totique se processum illius longitudini affigit. Confer Fig. 31.

Mox supra e Tensoris tympani tendo, exeuns ex ostiolo canalis offei, in quo continetur. Vide & Fig. 29. d: & confer Fig. 32.

Mox infra i Stapedii tendo, exeuns ex ostio colli cavernulae, in qua Stapedius ille continetur; decurrensque ad stapedem. Confer Fig. 29. f, & Fig. 34.

k Tympanum.

n Canalis osseus continens Tensorem tympani. Vide Fig. 29. s.

o Collum cavernulae, quae continet Stapedium.

p Porii acustici pars integra, quae est in osse squamoso, & mammillari.

q q Hinc rescissa porii acustici pars, quae fit ab osse petroso: r hic illa ab osse squamoso rescissa.

s Rima, ad finem commissurae ossis squamosi & petrosi (quae commissura hic tecta musculo Externo mallei) relicta; quam rimam intrat Externus mallei.

Supra rimam illam s, qua tendo d conspicuus, ut conspicuus sit, per longitudinem incisus & apertus finis, qui in extremo osseae partis illius est, quae porum acusticum continet; is, per quem malleus processum suum longissimum eundemque gracillimum porrigit, tendoque procedit d Externi mallei, processui illi insertus.

t Os squamosum.

u u Os petrosum.

v Pars ossis multiformis. w acutus processus, quem ultimus ossis multiformis angulus, inter os squamosum & petrosum interfertus, exigit.

x Foramen, quo exit tertius ramus quinti paris nervorum cerebri.

Malleus, incus, stapes, fenestrae, aquaeductus, in Figura proxime sequente indicata.

### FIGURAE XXIX.

*Tensor tympani, & Stapedius, una cum ossiculis auditus, osseque temporis, in quo sita; & portione partis mollis tubae Eustachianae. Remotus Laxator tympani, & Externus mallei.*

a b c d Tensor tympani.

a Principium tendineum, tenuissimum, oriens b à superiore parte tubae Eustachianae, qua tuba illa calvariae basem spectat, assimilisque est naturae cartilagineae, circa ossis multiformis foramen admittens vasa ad duram matrem, sub squama ossis multiformis, quae ad internum latus foraminis illius cum osse petroso connexa.

c Pars carnea, qua illa procedit per canalis offei principium, quod semicanalis est: unde porro per canalem illum pergit: post tendine suo ex ostio canalis illius exit, juxta d; flectitque se circum illud, ac deinde procedit, pertinetque ad mallei manubrium, infra processum ejus gracillimum, qua manubrium illud spectat fundum tympani, oppositum membranae. Vide Fig. 32. & 33.

e f Stapedius.

e Venter, haerens in cavernula ossis petrosi, quae in tympano ante inferiorem partem aquaeductus Falloppii est: & ab ea à principio oriens. f Tendo, qui in cavernula ortus, exit deinde ex ejus rotundo ore, & quamprimum exiit, flectit se, rectaque deinde petit posteriorem partem capituli stapedis, cui se inserit. Adde Fig. 28. i: & confer Fig. 34.

g Incus.

h Malleus. Vide Fig. 32. d e f g.

i Stapes, base sua insidens fenestrae ovali. Confer Fig. 34. d e.

k Aquaeductus Falloppii; cujus etiam pars apparet inter malleum & incudem.

l Cavernulae, quae Stapedium continet, paries anterior, intra tympanum eminens, per longitudinem à fundo cavernulae, ad ostiolum ejus usque truncatus.

m Truncatum os petrosum, qua hic finem facit porii acustici. Truncatum usque ad posteriorem partem cavernulae, quae Stapedium continet: eaque ossis pars crassa est.

Itaque inter l & m aperta cavernula est, excisso osse intermedio; quo cerni Stapedius integre possit.

n Fenestra rotunda.

o Ossis petrosi pars usque ad tubae Eustachianae osseam partem truncata.

p Truncatum os squamosum. Confer Fig. 28.

Quicquid ossis est inter duas illas truncatas partes, o & p, id remotum, quo cerni integre possit canalis r r s, & musculus c.

q Hinc rescissa squama ossis petrosi, quae cum osse squamoso conveniens, tympanum hic loci à cavo calvariae discernit.

r r s Canalis osseus, hic à principio semicanalis r r, post integer s, (in aliis autem in totum semicanalis est) qui, recipiendo Tensori tympani paratus, partim supra tubae Eustachianae osseam partem est, partim in superiore & eadem priore parte tympani, è regione membranae tympani.

t u Pars ossea tubae Eustachianae. u hic ad tympanum patet.

v v w Tubae Eustachianae pars, quae assimilis naturae cartilagineae. x x x x hinc resecta pars membranacea. y portio partis membranaceae, quae continuo ductu ad finem tubae usque truncata. v v partis, quae naturae cartilagineae assimilis, partes exteriores: w pars interior, magnam partem concavi tubae efficiens.

z Ossis petrosi pars ad cavum calvariae pertinens.

a Tympani concavum.

β β Hinc rescissa porii acustici pars, quae fit ab osse petroso: ut q q Fig. 28.

γ γ Hinc rescissa porii acustici pars, quae continuata ossi squamoso: ut r Fig. 28.

δ Porii acustici pars integra, quae est in osse squamoso, & mammillari.

ε Os petrosum.

### FIGURAE XXX.

#### Laxator tympani.

a Laxator tympani insertus manubrio mallei, juxta radicem processus brevioris.

In Syntaxi, Fig. 28. a, positu eodem.

De malleo vide Fig. 32. d e f g.

### FIGURAE XXXI.

#### Externus mallei.

a Venter.

b Tendo, insertus longitudini toti processus mallei gracillimi longissimique.



## TABULAE MUSCULORUM UNDECIMAE EXPLANATIO.

*In Syntaxi*, Fig. 28. b c d, positu eodem.  
De malleo vide Fig. 32. d e f g.

### FIGURAE XXXII.

#### *Tensor tympani.*

- a Principium tendineum.
- b Venter.
- c Tendo.

*In Syntaxi*, Fig. 29. a b c d, positu eodem. Adde Fig. 33.  
d e f g Malleus. d e caput. e processus gracillimus idemque longissimus. f  
processus brevior. g manubrium.

### FIGURAE XXXIII.

#### *Tensor tympani, à parte opposita Fig. 32.*

- a Principium tendineum.
  - b Venter.
  - c Tendo, d infertus manubrio mallei, infra processum gracillimum, qua  
manubrium spectat fundum tympani, oppositum membranae.
- De malleo vide Fig. 32. d e g.

### FIGURAE XXXIV.

#### *Stapedius.*

- a Venter.
  - b Tendo, c infertus capitulo stapedis, qua illud posteriora spectat.
- In Syntaxi*. Fig. 28. i, & Fig. 29. e f, positu eodem.  
d Stapedis capitulum, unde crura duo procedunt ad basem c.

### OSSIS HYOIDIS.

### FIGURAE XXXV.

#### *Coracohyoideus.*

- a a Principium, oriens à summa ora superioris marginis scapulae, juxta  
lunulam, quae ad radicem processus coracoidei est. Unde se flectit b.

- c Venter primus.
- d Tendo medius.
- e Venter secundus.

- f Infertus basis ossis hyoidis inferiori eidemque priori parti, juxta cornu;  
extremo tendinoso.

*In Syntaxi*, Tab. II.  $\alpha\beta$  in collo; ubi tectus Sternocleidomastoideo  $\eta\theta$ ,  
& à principio pone claviculam, Subclavium  $\sigma$ , & Serratum magnum  $\psi$  deli-  
tescit. Et quibus partibus nudus in Tab. II. iis subjacet Latissimo colli Tab. I.  
 $\Omega$  in collo. Subjacet & Cucullari.

### FIGURAE XXXVI.

#### *Geniohyoideus, à parte inferiore.*

- a Principium-tendinosum, quo oritur ab inferiore parte asperae eminentiae  
b, quam maxilla inferior ex interiore parte ex adverso menti habet.

- c Corpus carneum.

- d e Extremum, infertum d scrobi, quae in superiore & eadem priore parte  
basis hyoidis, juxta basis illius medium est; continuoque reliquae parti basis;  
à scrobe ad cornu usque, e proximaeque parti cornu. Craffius qua scrobi in-  
fertum, tenuius qua reliquae parti basis, cornuque.

*In Syntaxi* à latere exhibitus Tab. X. Fig. 2. r s; ubi parte extremi fui  
fitus pone Basioglossum o. In Fig. 1. non apparet, utpote jacens post My-  
lohyoideum d.

- f f Maxilla à parte inferiore: eadem quae in Tabulis offium exhibita.

- g h h i k k Os hyoides à parte inferiore. g h h basis; g pars anterior, h h  
posterior. i. i cornua. k. k officula graniformia.

### FIGURAE XXXVII.

#### *Stylohyoideus.*

- a Exilis tendo, quo incipit, quique oritur à posteriore parte processus sty-  
loformis ossis temporis, juxta officulum, quod illi processui adjunctum, in  
multis mobile est.

- b Venter carneus.

- c Tendo, d infertus priori & eidem inferiori parti basis hyoidis, qua cornu  
cum ea connexum.

- e Fissura in carne, inque tendine, per quam transit Biventer maxillae infe-  
rioris: supra quam fissuram sinus impressus ab adjacente Biventre illo.

*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 1. e f; ubi ex parte tectus Biventre maxillae g i.  
Dein Tab. IX.  $\lambda$  in capite; ubi ex parte tectus Latissimo colli  $\mu$ , ex parte  
Sternocleidomastoideo  $\epsilon$ . A priori parte, Tab. II. R in collo.

- g h i Os hyoides. g basis, h cornu, i officulum graniforme.

- k Hic processus mammillaris resectus juxta radicem processus styloformis.

- l l Processus styloformis ossis temporis.

### FIGURAE XXXVIII.

#### *Mylohyoidei, à parte inferiore.*

- a a Principium majorem partem tendinosum, oriens ab eminentia b per  
longitudinem maxillae, à dente molare intimo fere usque ad symphysem  
maxillae, ex inferiore parte oblique porrecta.

- c Hic se dexter cum sinistro conjungit, continuatque, parte carnea. c d  
hic lineam tendineam cum eo efficit. e hic aponeurosem.

- f Aponeurosis infertio priori eidemque inferiori parti basis hyoidis.

- g Hic eminet, qua circum Geniohyoideum incedit.

*In Syntaxi*, à latere exhibitus Tab. X. Fig. 1. d; ubi partem Biventer maxil-  
lae h i tegit. In Fig. IX. ob superinductum Latissimum colli,  $\mu$  in collo, nihil  
ejus apparet. A priori parte, Tab. III.  $\eta$  in collo, & Tab. II. Q in collo.

De maxilla & offe hyoide vide Fig. 36.

### FIGURAE XXXIX.

#### *Sternohyoideus.*

- a b c d Principium tendineum, oriens a ab offis pectoris interiore parte, &  
quidem ab eminente margine partis ejus illius, qua sustinet claviculam, juxta  
cartilaginem costae primae: b continuoque à cartilagini illius finitima superiore  
eademque posteriore parte, c ligamentoque, quo clavicula cartilagini illi alli-  
gatur, d & praeterea à capitis claviculae parte proxima, eadem & posteriore  
& inferiore.

- e Extremo tendinoso infertus inferiori parti basis hyoidis, juxta ejus me-  
dium.

*In Syntaxi*, Tab. II.  $\gamma\gamma\delta$  in collo; ubi ex parte tectus Sternomastoideo  $\eta\theta$ ,  
& clavicula, sterno, costae primae cartilagine. Dein Tab. I.  $\iota$  in collo; ubi  
maximam partem Latissimum colli  $\Omega$  superinductus.

- f f g h Truncatum f f sternum, g costae primae cartilago, h clavicula: quo  
apparere possit principium Sternohyoidei, pone ea situm.

### LINGUAE.

### FIGURAE XL.

#### *Styloglossus. Ceratoglossus. Basioglossus.*

- a b c d *Styloglossus.*

- a Hic oritur à priore eademque interiore parte extremae fere illius partis pro-  
cessus styloformis, quae mobilis in junioribus.

- b Hic se primum ad linguam applicat, juxta finem Ceratoglossi: indeque  
juxta eum, juxtaque finem Basioglossi, ulteriusque in priora ad apicem linguae  
excurrit c.

- d Hic partem aliquam deorsum curvat, eaque se continuat Ceratoglossio.

- Adde Fig. 43. e f g.

*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 2. k l m; ubi à principio delitescit pone processum  
mammillarem ossis temporis. Dein Fig. 1. mox supra k; ubi maximam partem  
tectus Mylohyoideo d, & Stylohyoideo e, & Biventre maxillae g. Dein Tab.  
IX. inter  $\kappa$  &  $\lambda$  in collo; ubi tectus Stylohyoideo  $\lambda$ .

- e e f *Ceratoglossus.*

- e e Origo à parte exteriori marginis inferioris cornu hyoidis, ab ipso ejus  
extremo ad eam partem fere usque, qua cum basi connexum.

- f Hic ad linguam pertinet.

- d Hic continuat se Styloglossio.

- Adde Fig. 43. h.

*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 2. n. Dein Fig. 1. m; ubi tectus ex parte Biven-  
tre maxillae g i, ex parte Stylohyoideo e. In Tab. IX. post Sternomastoideum,  
g in collo, delitescit. A parte priore, Tab. III.  $\iota$  in collo, & Tab. II. T in  
collo.

- g h i *Basioglossus.*

- g h Origo, g à basis hyoidis inferiore & eadem priore parte, juxta cornu;  
& h ab ipsius cornu proxima priore.

- i Hic ad linguam pertinet.

- Adde Fig. 43. h.

*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 2. o; ubi pars principii, quae à basi hyoidis oritur,  
tectus Geniohyoideo r. Dein Fig. 1. k l; ubi ex parte tectus Mylohyoideo d,  
& Stylohyoideo e f, & Biventre maxillae inferioris i. Dein Tab IX. mox infra  
Styloglossum, qui inter  $\kappa$  &  $\lambda$  in collo.

- k Pars Lingualis. Vide Fig. 41. e.

- l m Lingua. l pars, quae in ore est. m pars, quae se in fauces curvat.  
Confer Tab. X. Fig. 5. h i.

- n Hic truncatus processus mammillaris, ut Fig. 37. k.

- o Processus styloformis ossis temporis.

- Os hyoides est idem, quod Fig. 37.

### FIGURAE XLI.

#### *Chondroglossus. Genioglossus. Lingualis.*

- a b *Chondroglossus.*

- a Origo à superiore parte principii officuli graniformis ossis hyoidis.

- b Hic se Genioglossio intermiscet, immergitque deinde linguae, juxta Lin-  
gualis initium.

*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 4. t. Dein Fig. 3. mox supra  $\eta$ ; ubi maximam  
partem tectus fasciculis Genioglossi, quos per latus pharyngis curvat l: & quod  
in ea nudum, id in Fig. 2. post Ceratoglossum o delitescit.

- c d *Genioglossus.*

- d Principium tendinosum, quo statim supra Geniohyoideum oritur ab as-  
pera eminentia k, quae in interiore parte maxillae inferioris est, propter ejus  
symphysem. Inde ad linguam pertinet.

Remotus autem ab eo fasciculus, quem inserit officulo graniformi hyoidis.  
Remoti & tenues illi, quos in latus per membranam pharyngis curvat.

- Adde Fig. 42. & Fig. 43. k l l l m n o p.

*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 5. o p q. Dein Fig. 4. s f. Dein Fig. 3. i k. Dein  
Fig. 2. q; ubi pars tecta Basioglossio o: & quod nudum est, id in Fig. 1. jacet  
post Mylohyoideum d.



## TABULAE MUSCULORUM UNDECIMAE EXPLANATIO.

e *Lingualis*. Vide Fig. 43. a b c d.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 5. n. Dein Fig. 4. r, & Fig. 3. h. Dein Fig. 2.  
p; ubi pars tecta Basioglossi o.  
f Styloglossus. Vide Fig. 40. a b c.  
Inter Styloglossum f, Chondroglossum a b, & Lingualem e, truncatus Ceratoglossus, & Basioglossus. Confer Fig. 40. f. i.  
g Epiglottis.  
h Maxillae inferioris pars interior. i pars secta, ut Tab. X. Fig. 2. t.  
k Aspera eminentia, quae in interiore parte maxillae inferioris est, propter ejus symphysem.  
De Lingua vide Fig. 40. l m. De osse hyoide, Fig. 37. g h i.

### FIGURAE XLII.

#### *Genioglossus, ab inferiore parte.*

a Principium tendinosum, quo statim supra Geniohyoideum oritur ab aspera eminentia b, quae in interiore parte maxillae inferioris est, propter ejus symphysem.  
c d e Tendinosa tenuitas, quae d d ad basem hyoidis pertinet; inferitque se e officulo graniformi.  
f Hic truncati fasciculi tenues, qui accedunt ad interiore partem Ceratoglossi.  
g Hic, qui per latus pharyngis decurrunt, & qui se Constrictori superiori pharyngis continent.  
Adde Fig. 41. c d, & Fig. 43. k l l m n o p.  
Maxilla, & os hyoides, cognoscentur ex Fig. 36.

### FIGURAE XLIII.

#### *Linguam in longitudinem porrectam exhibet à parte inferiore, cum Lingualibus, Genioglossis, Styloglossorum, & Ceratoglossorum, Basioglossorumque extremis.*

a b c d *Lingualis*.  
a b Duo principia, quibus hac in lingua, circa radicem ejus, inter Genioglossi fibras prodibat: & primo quidem a, inter Genioglossi partem illam, quae se in latus curvans, accedit ad Ceratoglossum; illamque, quae se linguae ibidem inferit.  
c Hic conjungit se cum Styloglossi, cum eoque deinde decurrit ad apicem linguae d.  
Vide Fig. 41. e.  
e f g *Styloglossus*.  
e Hic truncatus.  
f Hic conjungit se cum Linguali, cum eoque decurrit ad apicem linguae g.  
Vide Fig. 40. a b c.  
h i *Ceratoglossus cum Basioglossi*, qui ad linguam accedunt inter Styloglossum & Lingualem. i hic truncati.  
Vide Fig. 40. e e f. g h i.  
k l l m n o p *Genioglossus*. Quia autem rescissus ab origine sua, linguaeque in longitudinem tota porrecta, mutavit figuram suam; ut apparet, si conferatur Fig. 41. c d.  
k Principium à maxilla rescissum.  
l l l Hic ad linguam pertinet, juxta Lingualem.  
m Fibrae, quae se ad interiore partem Ceratoglossi adjungunt, & cum eo ad linguam pergunt.  
n Fibrae, quas per latus pharyngis curvat; quarum aliquae ad Constrictorem superiorem pharyngis accedunt.  
o Tendinosa tenuitas, ad basem hyoidis pertinens. p portio, inserta superiori parti principii officuli graniformis hyoidis.  
Vide Fig. 41. c d.  
q Lingua.  
De osse hyoide vide Fig. 36.

### LARYNGIS.

Adde *Stylopharyngeum* Fig. 27. 28. & 30. Tab. XII.

### FIGURAE XLIV.

#### *Sternothyreoideus.*

a b c Principium latum, a b oriens ab amplitudine interna ossis pectoris, è regione inferioris partis cartilaginis costae primae; & à margine ejusdem ossis, juxta eandem dictae cartilaginis partem: atque b c ab illius etiam ipsius cartilaginis finitima interiore parte,

d e Principium alterum, angustius, oriens d à superiore & eadem posteriore parte mediae longitudinis cartilaginis costae primae, & e à vicino ligamento, quo clavicula ad cartilaginem illam alligata.

f g Extremi pars lata tenuisque; g hic tendinea: eaque inserta externae parti lateris cartilaginis thyreoideae, primum mox supra marginem inferiorem juxta partem priorem; indeque oblique retrorsum sursumque, tuberculum versus, quod cartilago illa ad priorem partem processus superioris habet; quo loci thyreoidea in quibusdam eminet.

h Extremi pars angustior, crassiorque, i extremo tendineo inserta k tuberculo modo dicto.

*In Syntaxi*, Tab. III. π π σ σ in collo; ubi principium post claviculam, sternum, costae primae cartilaginem. Dein Tab. II. ε ε ε in collo; ubi tectus Sternohyoideo γ γ, & Coracohyoideo α β, & Sternocleidomastoideo η η: & quod ejus ibi tum supra tum infra Sternomastoideum nudum est, id in Tab. I. post Latissimum colli, Ω in collo. Dein Tab. I. ν in collo.

l m n Cartilago thyreoidea. m m processus superiores, n inferior.

o Cartilago cricoidea.

p p p Truncatum sternum: q r s truncata costae primae cartilago; ut appareat hujus musculi principium, quod post ea situm.

### FIGURAE XLV.

#### *Hyothyreoideus.*

a b Origo, a ab inferiore & eadem interna parte basis hyoidis juxta cornu, b & basi propincae ipsius cornu longitudinis fere dimidia.

c d e Insertio, c d inferiori parti lateris externi cartilaginis thyreoideae, mox supra insertionem extremi lateris Sternothyreoidei, f g Fig. 44: & ante insertionem illam, exteriori parti ini marginis thyreoideae d e, juxta partem priorem mediam.

*In Syntaxi*, Tab. III. σ in collo. Dein Tab. II. Y in collo; ubi majorem partem tectus Coracohyoideo α β, & Sternohyoideo γ δ: & qua parte ibi nudus, ea post Latissimum colli, Ω in collo Tab. I. A latere, Tab. X. Fig. 1. q.

### FIGURAE XLVI.

#### *Cricothyreoideus, à parte priore.*

Hic è duabus partibus constat, priore & posteriore.

a b Pars prior, quae a oritur superiore margine cartilaginis cricoideae, in latere partis prioris: b inferit exteriori parti marginis inferioris thyreoideae, juxta partem ejus mediam priorem.

c d d Pars posterior, quae c oritur in exteriori parte cricoideae, à media longitudine lateris ejus, fere per totam illius latitudinem: d d in fine se exteriori parte sui adjungit ad Constrictorem inferiorem pharyngis.

Adde Fig. 47. & 48.

*In Syntaxi*, Tab. III. ο in collo; ubi tecta pars magna Sternothyreoideo π σ: & quod nudum, id in Tab. II. jacet post Sternohyoideum, γ in collo.

### FIGURAE XLVII.

#### *Cricothyreoideus, à latere.*

a b Pars prior, quae hic a oriebatur ab ipso usque inferiore margine partis prioris lateris externi cricoideae: b inserta exteriori parti marginis inferioris thyreoideae, juxta partem ejus mediam priorem.

c d d Pars posterior, quae se in fine d d exteriori parte sui adjungit ad Constrictorem inferiorem pharyngis; unde hic rescissa.

Adde Fig. 48. & 46.

*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 1. v w x y.

e Cartilago thyreoidea.

f Cartilago cricoidea.

### FIGURAE XLVIII.

#### *Cricothyreoidei pars posterior, à latere.*

a a Oritur in exteriori parte cricoideae, à media longitudine lateris ejus, fere per totam lateris illius altitudinem.

b Hic rescissa pars ejus exterior, quae se adjungit ad Constrictorem inferiorem pharyngis: sub qua se inferit thyreoideae, c c implens totum lunatum marginem, qui fit tum à processu inferiore thyreoideae, tum ab ipso cartilaginis illius margine imo, à processu mododicto usque ad tuberculum, quod è media fere marginis longitudine eminet.

Pars, quae ad interiore marginem thyreoideae ibi pertinet, exhiberi hac in Figura non potuit.

Adde Fig. 47.









# TABULAE ANATOMICAE DUODECIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

## GLOTTIDIS & EPIGLOTTIDIS.

### FIGURAE I.

#### *Arytaenoïdeus transversus, à posteriore parte.*

a a Hic affixus cartilagini arytaenoïdeae sinistreae, margini interiori partis ejus posterioris, qui supra basem est.

b b Hic eidem margini dextrae.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 13. 0000; ubi ex parte tectus Arytaenoïdeus obliquus n. n. Caeterum in Fig. 12. velatus membrana pharyngis v. A latere, Tabula eadem, Fig. 6. o, pariter ex parte tectus obliquus l. m m.

Laryngis cartilagineae tum hujus, tum proxime sequentis Figurae, cognoscuntur ex Fig. 14. Tab. X.

### FIGURAE II.

#### *Arytaenoïdeus obliquus, & Cricoarytaenoïdeus posticus, à posteriore parte.*

a b c *Arytaenoïdeus obliquus.*

a Origo à superiore parte partis posterioris ejusdemque exterioris basis cartilaginis arytaenoïdeae.

b Extremitas pars inferior, quae se Thyreoarytaenoïdeo continuat.

c Extremitas pars superior, ad epiglottidem procedens.

Antequam in extrema illa abeat, flectit se in priora tum circum posteriorem partem verticis arytaenoïdeae, tum circum cartilagineum verticis illius additamentum.

Adde Fig. 3. a b c d.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 13. n; ubi dextrum decussat sinister. In Figura autem 12. velati membrana pharyngis v.

d d d e *Cricoarytaenoïdeus posticus.*

d d d Origo à cartilagine cricoïdea, cujus occupat sinuatam superficiem, quam in postica parte à latere eminentiae mediae habet.

e Extremum insertum extremo tuberculo, quod basis arytaenoïdeae à postica parte in latere externo exigit.

Adde Fig. 4. f f g.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 13. t; ex parte subeunt cartilaginem thyreoïdeam µ. In Fig. 12. velatus membrana pharyngis v, praeter partem exiguam, infra x; quae & in Fig. 11. A, & in Fig. 10. n, & in Fig. 9. I.

### FIGURAE III.

#### *Arytaenoïdeus obliquus, Thyreoarytaenoïdeus, Thyreoëpiglotticus major, & minor, à latere.*

a b c d *Arytaenoïdeus obliquus.*

b Extremitas pars inferior, quae se Thyreoarytaenoïdeo e continuat.

c d Extremitas pars superior, quae secundum glottidis marginem, qui inter arytaenoïdeam & epiglottidem intercedit, porrigit se ad epiglottidem, ad marginem ejus lateralem pertinens d.

Adde Fig. 2. a b c.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 6. l. m m; ubi sinister l decussat dextrum m m.

e *Thyreoarytaenoïdeus.* Vide Fig. 4. a b c d e.

f g h *Thyreoëpiglotticus major.*

g Origo ejus à cartilagine thyreoïdea juxta exteriorem partem partis superioris originis Thyreoarytaenoïdei: unde primum per exteriorem partem Thyreoarytaenoïdei illius, & per superiorem quidem partis illius, ascendit, dein secundum latus glottidis; h pertinetque ad marginem lateralem epiglottidis, adjungens se extremo Arytaenoïdei obliqui, ad eundem marginem pertinenti.

Adde Fig. 7. a a b c d d e f g.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 6. f g; ex parte tectus Thyreoarytaenoïdeo altero c.

i *Thyreoëpiglotticus minor*, five depressor epiglottidis.

k Origo ejus ab interiore parte cartilaginis thyreoïdeae, juxta ejus medium.

l Pertinet ad marginem lateralem epiglottidis, supra radicem ejus.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 6. i, extremo suo ibi delitescens post Thyreoarytaenoïdeum alterum c.

Cartilagineae laryngis tum hujus, tum proxime sequentium quatuor Figurarum, cognoscuntur ex Fig. 7. Tab. X.

### FIGURAE IV.

#### *Thyreoarytaenoïdeus, Cricoarytaenoïdeus posticus, à latere.*

a a b c d e *Thyreoarytaenoïdeus.*

a a Origo ab interiore parte partis internae thyreoïdeae, juxta ejus medium.

b Principium alterum, oriens à ligamento, quo colligatae à priori parte sunt cricoïdea & thyreoïdea.

c Pars exterior, quae magis ascendit.

d Pars, quae praecedentem subeunt, magis transversa, decussat eam. Et pars ejus major exteriori illi subjacet.

e Extremum insertum exteriori parti marginis prioris cartilaginis arytaenoï-

deae, supra basem ejus, atque adeo supra finem Cricoarytaenoïdei lateralis, b Fig. 5.

Adde Fig. 3. e.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 6. e; ubi partem ejus integit Thyreoëpiglotticus major f g, & Thyreoarytaenoïdeus alter c.

f f g *Cricoarytaenoïdeus posticus.*

f f Origo à cartilagine cricoïdea.

g Extremum insertum extremo tuberculo, quod basis arytaenoïdeae à postica parte in latere externo exigit.

Adde Fig. 2. d d d e.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 6. a. Et in Fig. 5. d; ubi maximam partem delitescit post cartilaginem thyreoïdeam α, & post membranam pharyngis. Sic & Fig. 4. d. Et quod nudum, id in Fig. 3. delitescit post Constrictorem inferiorem pharyngis z d.

### FIGURAE V.

#### *Cricoarytaenoïdeus lateralis.*

a a Origo à cricoïdeae summi marginis exteriore parte, in latere, statim juxta infidentem ei arytaenoïdeam.

b Extremum insertum basi arytaenoïdeae, à latere, mox ante finem Cricoarytaenoïdei postici, g Fig. 4.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 6. b; ubi extremo majorem partem subit Thyreoarytaenoïdeum alterum c.

### FIGURAE VI.

#### *Thyreoarytaenoïdeus alter, minor.*

a Origo ab interiore eademque superiore parte thyreoïdeae, non longe à fissura cordiformi.

c Extremum insertum arytaenoïdeae, mox supra Cricoarytaenoïdeum lateralem, b Fig. 5.

Adde Fig. 7. h i.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 6. c d.

d Ala sinistra cartilaginis thyreoïdeae, e hic truncata.

### FIGURAE VII.

#### *Thyreoëpiglotticus major, & Thyreoarytaenoïdeus alter.*

a a b c *Thyreoëpiglotticus major*; qualis nonnunquam animadversus.

b Origo ejus à cartilagine thyreoïdea, juxta exteriorem partem partis superioris originis Thyreoarytaenoïdei: unde primum per exteriorem partem Thyreoarytaenoïdei illius ascendit, dein secundum latus glottidis, ad epiglottidem.

c Fasciculus ejus, qui per Thyreoarytaenoïdeum alterum h transit: cum caeterum procedat pone eum.

d d e Portio accessoria, d oriens ab exteriore parte marginis superioris cartilaginis cricoïdeae, à latere.

f Commune extremum, g pertinens ad marginem epiglottidis.

Adde Fig. 3. f g h.

h *Thyreoarytaenoïdeus alter*, i hic ab ortu rescissus. Vide Fig. 6. a c.

## UVULAE.

### FIGURAE VIII.

#### *Azygus uvulae, à parte superiore eademque posteriore.*

a Principium, quod initio tendineo tenui implicatum membranae tendinosae d d, & extremis tendineis Levatorum palati illius, juxta futuram palati ossei, ut ab eo procedere videatur.

b Hinc decurrit per medium palatum molle, c perque uvulae longitudinem.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 13. m.

d d Membrana tendinosa, quae ex naribus veniens, incedit per superiora palati molli, sub ejus tegumento, quod per membranae illius ambitum hic tanquam incisum exhibitum. Vide Tab. X. Fig. 14. m.

e e Palatum molle.

f Uvula.

g g Arcus posteriores, qui se à palato molli per latera faucium demittunt.

Caetera cognosci poterunt ex Fig. 27.

## PALATI MOLLI S.

Adde *Palatopharyngeum* Fig. 27. h & c. & Fig. 28. f & c. & Fig. 29. a & c. & Fig. 11. f g.

### FIGURAE IX.

#### *Levator palati molli, & Circumflexi palati, à parte inferiore, una cum palato molli, uvula, faucium in narium concavum aditu, tubis Eustachianis.*

a b c d e f *Levator palati molli.*



## TABULAE MUSCULORUM DUODCIMAE EXPLANATIO.

a Principium tendinosum, quo oritur ab extremo osse petroso, qua id tuba Eustachiana perforatum est; & ab inferiore quidem parte canalis illius extremi, statim sub principio partis tubae ejusdem illius, quae tota mollis.

b Hac parte ad palatum procedit. c hac per palatum, latefcens magis magisque.

d Pertinetque ad mediam palati longitudinem, fere à postico margine palati ossei, usque ad radicem uvulae: ubi se dexter sinisterque continuant inter se. Vide Tab. X. Fig. 14. k.

e Pars inferior, separatum lacertum efficiens.

f Portio, quae se sine tendineo tenui innectit membranae tendinosae, quae incedit per superiora palati ossei, veniens è naribus; cum eaque ad medium posticum marginem palati ossei pertinere videtur. Vide Tab. X. Fig. 14. i.

In *Syntaxi*, à parte posteriore, Tab. X. Fig. 14. g h i k l. Dein Fig. 13. g h i; ubi pars pone Salpingopharyngeum q; caeterum sub Palatopharyngeo n. Dein Fig. 12. parva pars w à latere membranae pharyngis. Sic & Fig. 11. b, & Fig. 10. i, & Fig. 9. k. A latere, Tab. X. Fig. 5. b, & Fig. 4. b, & Fig. 3. b; ubi pars delitescit post Constrictorem superiorem pharyngis q: & Fig. 2. g. g h i k. g h i k l *Circumflexi palati*.

h Origo ab extremo osse petroso, juxta externum latus Levatoris palati mollis.

i Ejus latus tendo, per palati mollis initium procedens, k infertusque postico lunato margini palati ossei.

l Hic lati tendines, dexter & sinister, conveniunt, & se conjungunt.

Adde Fig. 10.

In *Syntaxi*, à parte posteriore, Tab. X. Fig. 16. i--n. Dein Fig. 15. h i k; ubi pars quae in palato est, testata membrana tendinosa n, quae ex naribus veniens, procedit per superiora palati mollis: testata & principio Palatopharyngei q, & Constrictores pharyngis superioris o. Dein Fig. 14. n; ubi praeterea majorem partem testus Levatore palati mollis g. Sic & Fig. 13. k; & Fig. 12. x, à latere membranae pharyngis: & Fig. 11. c: & Fig. 10. k; ubi & post Constrictorem superiorem pharyngis b delitescit: quemadmodum & Fig. 9. l, & Fig. 8. t.

A latere, Tab. X. Fig. 5. a, & Fig. 4. a, & Fig. 3. a, & Fig. 2. f.

m m Membrana superior palati mollis.

n Uvula.

o o o o Hic membrana faucium per ambitum rescissa.

p Hic fauces in nares patent.

q Tuba Eustachiana. Quae & in altero latere.

r Pars membranacea tubae Eustachianae.

u Extremum os petrosum, qua id tuba Eustachiana perforatum est; unde v in dextro latere tuba r procedit. Est o Fig. 10.

Caetera capitis ossei sunt eadem, quae in Tabulis Ossium.

### FIGURAE X.

#### *Circumflexus palati, à parte inferiore.*

a Principium tendineum, b oriens ab extremo osse petroso, qua id tuba Eustachiana perforatum est; & ab inferiore quidem parte canalis illius extremi, statim à latere externo partis tubae ejusdem illius, quae tota mollis; itemque principii Levatoris palati mollis. Confer h Fig. 9.

a c Inde à superiore parte tendineum illud principium per marginem musculi excurrit, usque ad c. Qui principii excurfus tendineus ab exteriori latere musculi latior fuit, adhaesitque ligamento cuidam tendineo tenui angusto, quod à primo musculi ortu, secundum radicem internam eminentiae acutae ossis multiformis, quae est pone foramen tertii rami quinti nervorum paris; porroque secundum interioriorem partem eminentiae illius oblongae, quae ex eodem osse inter foramen mododictum & os petrosum eminet, porrectum erat.

d Principium anterius, e oriens ab interiore eminente pariete (p Fig. 15.) finis oblongi, impressi radici parietis interni processus pterygoidei ossis multiformis, ab exteriori parte, q Fig. 15.

f Principium tendineum lamellae alterius, adhaerens superiori parti lateris externi cartilagineae naturae, quae adscribitur tubae Eustachianae: unde hic g g rescissum.

h Caro communis.

i Principium tendinis, in quem abit. Qui post circum hamulum k processus pterygoidei ossis multiformis se flectit; latus ibi, sed in angustum corrugatus.

l Et postea quam se flexit, explicat per palati mollis initium, specie aponeurosis, inferitque m postico lunato margini palati ossei, usque ad futuram palati: ad postremumque conjungit cum pare sui, l Fig. 9, à quo hic n rescissus.

Pars ejus, quae se sine tendineo inferere visa imae parti processus pterygoidei, ad externum latus radicis hamuli, non exhibita. Et fortasse pro aberratione quadam ab instituto naturae haberi potest.

Adde Fig. 9. g--l.

o Extremum os petrosum, qua id tuba Eustachiana perforatum est. Confer Fig. 9.

### FIGURAE XI.

#### *Constrictores isthmi faucium, cum Palatopharyngeis, à parte priore.*

a b c d e *Constrictor isthmi faucium.*

a Hic surgit à superiore parte marginis linguae circa radicem ejus.

b Hac parte à lingua ad palatum ante tonsillam procedit, per arcum illum, qui in faucibus à latere linguae pertinet ad palatum molle.

c Hac per palatum molle.

d Hic dexter cum sinistro convenit, unaque subtilibus praeterea portionibus in uvulam excurrunt e.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 17. f g. A latere, Tab. X. Fig. 5. g: & Fig. 4. l: & Fig. 3. c; ubi maximam partem delitescit post Constrictorem pharyngis superiorem s: similiterque Fig. 2. i.

f g *Palatopharyngei* pars, quae per palatum molle decurrit supra Constrictorem isthmi, sub Levatore palati mollis. f pars, quae ante Constrictorem illum nuda est ab eo. g pars, quae post eum nuda.

Adde Fig. 27. h &c. & Fig. 28. f &c. & Fig. 29. & Fig. 30. d &c.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 17. k l; ubi (ut hic) magnam partem testus Constrictore isthmi faucium g.

Ex qua Figura reliqua hujus intelligentur.

## MAXILLAE INFERIORIS.

### FIGURAE XII.

#### *Temporalis, à parte priore.*

abb c d d Primum originis initium, a procedens à processu superiore ossis jugalis, b b c ab eminentia, quae est b b in latere ossis frontis, c in osse verticis; d d ab osse temporis.

e Tendo.

f g h Affixus, f vertici processus coronoidei maxillae inferioris, g marginique posteriori, & h priori, ibi in mucronem exeuns: i alteroque mucrone, & eo longiore crassioreque, affixus eminentiae k, quam processus coronoideus juxta priorem partem radicis suae ex interiore parte habet.

Juxta m n pars ejus posterior & eadem inferior, sub zygomate ad maxillam descensura, se circum sinuatam radicem processus zygomatici inflectit.

Adde Fig. 13. & 14.

In *Syntaxi*, Tab. II. i &c. in capite; ubi zygoma subit, post subjectus Masseteri o r. In Tab. I. subjectus praeterea aponeurosi Epicranii a in capite, & cum ea Attollenti auriculae Γ Δ, & anteriori ejusdem Z, itemque Frontali b d, & Orbiculari palpebrarum m n.

l l Truncatum os jugale. m truncatus processus ejus, qui cum zygomatico ossis temporis convenit. n truncatus zygomaticus.

### FIGURAE XIII.

#### *Temporalis, à parte posteriore.*

a a a b Primum originis initium ab eminentia a a a ossis verticis, b mammillaris. Reliquum originis, ab amplitudine lateris calvariae, quae fit à processu superiore ossis jugalis, à finitimo latere ossis frontis, ab osse verticis & squamoso, à processu maximo ossis multiformis, ejusque eminentiis, quae in inferiore parte lateris ejus sunt; exhiberi his in Figuris nequivit; ut à quibus partibus subitus oritur.

Extrinscus pars se demittit à membrana tendinea, qua ibi vestitus; hic remota. c Tendo.

Adde Fig. 12. & 14.

In *Syntaxi*, Tab. VI. A &c. in capite; ubi subit zygoma, & deinde subjacet Masseteri E G. In Tab. V. praeterea subjacet aponeurosi Epicranii d d, & cum ea Attollenti auriculae f g, & anteriori k.

### FIGURAE XIV.

#### *Temporalis extremum à parte interiore.*

a Pars extremi tendinea tenuis, inserta margini posteriori radicis processus coronoidei maxillae inferioris.

b b Carneae partis insertio amplitudini interiore radicis processus coronoidei.

c Tendinis mucro crassior, d infertus eminentiae, quam processus coronoideus juxta priorem partem radicis suae habet.

e Tendinis mucro tenuior.

Adde Fig. 12 & 13.

f Maxillae inferioris pars sinistra, ex interiore parte.

### FIGURAE XV.

#### *Pterygoideus internus, & externus, à parte inferiore.*

a *Pterygoideus internus.*

b Origo è fundo cavi processus pterygoidei ossis multiformis, principio tendinoso; oriens porro ab interiore parte parietis externi processus ejusdem paullo minus quam tota.

c Pars originis, quae est ab inferiore parte ossis palati, qua dehiscenti processui pterygoideo interfertur. Unde à principio tendinosus. Juxta quam originem oritur etiam d ab osse maxillari superiore.

e Extremum tendinosum, quod inferiori parti amplitudinis internae illius partis maxillae inferioris, quam ea ad caput erigit, ad inum angulum usque infertur f f.

Adde Fig. 17.

g *Pterygoideus externus.*

h Ab hujus parietis externi processus pterygoidei amplitudine exteriori prope tota oritur.

i Origo ab inferiore parte marginis parietis mododicti, qui margo spectat cavum pterygoidis.

k Origo à margine inferiore parietis mododicti.

l Hac parte oritur ab exteriori parte portionis pterygoideae ossis palati, & à finitima parte ossis maxillaris superioris.

k l Principii pars tendinosa.

m Pars, quae procedit ab inferiore parte ossis multiformis, ab externo latere radicis processus pterygoidei.

n n o Extremum tendinosum, insertum n n collo maxillae inferioris, ubi id ab interiore parte partis prioris, statim sub capitulo suo sinuatum est: & priori & eidem internae parti marginis lamellae cartilagineae o, quae articulo maxillae interjecta.

Adde Fig. 16.

p Eminens interior paries sinus oblongi q, impressi radici parietis interni processus pterygoidei ossis multiformis, ab exteriori parte. A quo pariete eminente oritur Circumflexus palati, e Fig. 10.

Caetera capitis ossei sunt eadem, quae in Tabulis Ossium.

### FIGURAE



# TABULAE MUSCULORUM DUODECIMAE EXPLANATIO.

## FIGURAE XVI.

### *Pterygoideus externus, à parte priore.*

- a Pars inferior.  
b c Hic subtus oritur à parietis externi processus pterygoidei amplitudine exteriori prope tota: & infra quoque, juxta c, ab exteriori parte portionis pterygoideae ossis palati, finitimaque maxillaris superioris.  
d Pars tendinosa.  
e Extremum, insertum collo maxillae inferioris, ubi id ab interiori parte partis prioris, statim sub capitulo suo sinuatum est.  
f Pars superior, cujus fibrae cum fibris inferioris ad angulos acutos conveniunt.  
g g Origo ejus ab inferiore parte ossis multiformis, juxta externum latus radicis processus pterygoidei.  
h Extremum, maxillae supra partem inferiorem insertum.  
Adde Fig. 15. g--o.  
In *Syntaxi*, Tab. III. e e in capite, ubi ex parte delitescit post Buccinatorem v, os maxillare superius, & jugale, postque zygoma, & processum coronoidum maxillae inferioris, circa quem post Temporalis extremum sequitur. Dein Tab. II. A in capite; ubi pariter post os maxillare superius delitescit, & post jugale, postque Buccinatorem z; praeterea post Masseterem r.  
A latere, Tab. X. Fig. 1. a, partim testus Pterygoideo interno b, partim subjectus maxillae inferiori.  
i Hic truncatum os jugale, k hic maxillae superius, l hic processus zygomaticus ossis temporis, m hic processus coronoides maxillae inferioris, quo, excisio offe intermedio, cerni musculus queat.  
n Processus lateralis maximus ossis multiformis.  
o Os maxillare superius.

## FIGURAE XVII.

### *Pterygoideus internus, à parte priore.*

- a a Hic subtus principium ejus inhaeret cavo processus pterygoidei ossis multiformis.  
b Extremum tendinosum, quod hic c c inferere se incipit inferiori parti amplitudinis internae illius partis maxillae inferioris, quam ea ad caput erigit: cui se porro ad imum angulum usque inferit. Confer f f Fig. 15.  
Adde Fig. 15. a--f.  
In *Syntaxi*, Tab. IV. r in capite; ubi (ut hic) à principio delitescit pone processum pterygoideum, & praeterea pone maxillam inferiorem, circa quam squitur post Temporalis extremum. Dein Tab. III. ζ in capite; ubi insuper pone Buccinatorem v delitescit, & testus Pterygoideo externo e. Quodque in Tab. III. nudum, id in Tab. II. post Masseterem r in capite.  
A parte posteriore, Tab. VII. c in capite; ubi porro post processum mammillarem delitescit, & Trachelomastoideum z B in cervice. Dein Tab. VI. I in capite, porro delitescens post Splenium capitis P in cervice. Dein Tab. V. g in capite; ubi ex parte testus Latissimo colli t, & porro delitescit post Sternomastoideum u in collo, & post auriculam.  
A latere, Tab. X. Fig. 1. b c, à principio delitescens post processum mammillarem. Dein Tab. IX. i in capite; ubi partem integit Latissimus colli π ζ; pars delitescit post Sternomastoideum g in collo, pars post auriculam.  
d d d Hic truncata maxilla inferior, ut appareat pars musculi, quae pone eam sita.

## FIGURAE XVIII.

### *Biventer maxillae, à latere.*

- a Venter primus  
b Tendo medius.  
c Venter secundus, d insertus posteriori parti imi marginis maxillae inferioris, juxta menti medium.  
Adde Fig. 19.  
In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 1. g h i i; ubi principium (ut hic) post processum mammillarem: partemque integit Stylohyoideus e f. In Tab. IX. totus integit Latissimo colli μ in collo, Sternocleidomastoideo g, Splenio capitis v, Stylohyoideo λ, &c.  
A parte priore, Tab. II. y P in capite; ubi partim post maxillam inferiorem delitescit, partim testus Sternocleidomastoideo λ in collo, partim Stylohyoideo R. Dein Tab. I. Σ in capite; ubi pariter post maxillam inferiorem delitescit, & testus Sternocleidomastoideo Φ in collo, & praeterea post auriculam: infraque, qua nudus in Tab. II. testus Latissimo colli Ω.  
A parte posteriore, Tab. VI. L in capite; ubi porro post Splenium capitis P in cervice, & Levatorem scapulae Z delitescit. Et quod nudum, id in Tab. V. post Sternocleidomastoideum u in collo.

## FIGURAE XIX.

### *Biventer maxillae, à parte inferiore.*

- a Venter primus, b principio tendinoso oriens c c eq incili, quod radicem processus mammillaris ossis temporis ex interiori parte finit; & praecipue quidem ab interiori eodemque humiliore margine ejus.  
d Tendo medius.  
e Venter secundus, f extremo tendinoso insertus g g posteriori parti imi marginis maxillae inferioris, juxta menti medium.  
h Aponeurosis, è tendinis extremo, tendinosque initio ventris secundi, ab inferiore parte exeuns, adnectensque se i priori parti basis hyoidis, juxta partem inferiorem, à latere, inter extrema Mylohyoidei, Sternohyoidei, Coracohyoidei.  
Adde Fig. 18.  
Ossa cognoscuntur ex Tabulis Ossium.

## FIGURAE XX.

### *Masseter, à parte priore.*

- a Pars exterior eademque major.  
b Principii pars tendinea extrinsecus.  
c Oritur ab inferiore & eadem priore parte extremi processus ossis maxillaris superioris, cui os jugale innixum; d d continuoque ab exteriori parte marginis inferioris ossis jugalis, qua illud zygomatis partem efficit; aliquanto ante inferiorem partem futurae zygomatis oriri definens.  
e f Extremum tendinosum, insertum amplitudini exterioris partis lateris maxillae inferioris, usque ad angulum maxillae g g.  
h Pars interior & eadem minor, qua nuda.  
i Origo ejus ab inferiore margine ossis jugalis, juxta processum zygomaticum ossis temporis: k & porro ab inferiore margine processus zygomatici, usque ad tuberculum committendae maxillae inferioris caussa eminens.  
l Portio, quae supra zygoma abscedit ab interiori parte membranae tendinae, qua Temporalis extrinsecus obductus, affixae zygomati: à qua membrana portio haec rescissa.  
Adde Fig. 21. & 22.  
In *Syntaxi*, Tab. II. o--x in capite. Dein Tab. I. V W X Y in capite; ubi partem tegit Zygomaticus major E, & Latissimus colli γ γ.

## FIGURAE XXI.

### *Masseteris pars interior eademque minor, à parte priore.*

- a a b Origo à tota longitudine zygomatis: a a ab inferiore parte marginis inferioris ossis jugalis, qua illud ad zygoma pertinet: b porroque ab inferiore margine processus zygomatici ossis temporis, usque ad tuberculum maxillae inferioris committendae caussa eminens.  
c Pars tendinosa principii.  
d Extremum tendinosum, insertum exteriori parti processus coronoides, à summo ejus ad imum, porroque proximae infra radicem ejus maxillae parti e e e.  
f Portio, quae supra zygoma abscedit ab interiori parte membranae tendinae, qua Temporalis extrinsecus obductus, affixae xygomati: à qua membrana, hic remota, portio haec abscissa.  
Ortus ab interiori parte zygomatis cerni in Figura nequit.  
Adde Fig. 20. & 22.

## FIGURAE XXII.

### *Masseter, à parte posteriore.*

- a Pars exterior eademque major, b b inserta maxillae ad angulum imum.  
c d Pars interior eademque minor. c pars ejus exterior, quae nuda. d pars interior.  
e Origo à processu zygomatico ossis temporis.  
Adde Fig. 20. & 21.  
In *Syntaxi*, Tab. VI. E F G H in capite. Dein Tab. V. p q in capite; ubi partem tegit Latissimus colli t, partem Zygomaticus major r; pars delitescit pone auriculam.  
A latere, Tab. IX. δ--θ in capite; ubi partem integit Latissimus colli ζ o, partem Zygomaticus major y z.

## P H A R Y N G I S.

Adde Palatopharyngeos f g Fig. 11.

## FIGURAE XXIII.

### *Constrictor pharyngis inferior, medius, & superior, cum Buccinatore, à latere.*

- a Constrictor inferior pharyngis.  
b b c d Caput, quod à cartilagine thyreoidea oritur: & quidem b b ab exteriori parte marginis superioris, ante processum superiorem; proximoque tuberculo, quod ad radicem processus illius est; eminentia deinde oblonga, quae est in latere thyreoideae. c à margine inferiore ante processum inferiorem. d ab exteriori parte processus inferioris.  
e e Caput, oriens ab inferiore parte lateris externi cartilaginis cricoideae, juxta partem ejus posteriorem, mox infra processum inferiorem thyreoideae, qui cricoideam continet.  
Inter capita haec duo, juxta d, accipit portionem à Cricothyreoideo, d d Fig. 47. Tab. XI.  
Adde Fig. 24. a.  
In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 3. z. & Fig. 2. δ. Dein Fig. 1. β; ubi pars principii sub Hyothyreoideo q.  
A parte priore, Tab. III. ω in collo; ubi partem integit Hyothyreoideus τ, pars delitescit post Sternothyreoideum π. Dein Tab. II. X in collo; ex parte pariter testus Hyothyreoideo Y, praetereaque delitescens post Sternocleidomastoideum λ. Quae autem pars ibi nuda, ea in Tab. I. delitescit post Latissimum colli Ω in collo.  
f Constrictor medius pharyngis.  
g Caput alterum, quod latius; oriens à superiore & eadem exteriori parte extremi cornu ossis hyoidis.  
h Caput alterum, oriens ab officulo graniformi hyoidis.  
Adde Fig. 24. i. & Fig. 25.  
In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 3. w x y; ubi (ut hic) pars ejus inferior testata Constrictore inferiore z. Dein Fig. 2. α β γ; ubi pariter pars ejus inferior testata Constrictore inferiore δ, & à principio praeterea Ceratoglossio n, & Basioglossio o testatus. Dein Fig. 1. δ ε ζ; ubi similiter pars inferior testata Constrictore inferiore β, & à principio Ceratoglossio m testatus, & Basioglossio l, & Biventre maxillae g.  
i Constrictor superior pharyngis.



# TABULAE MUSCULORUM DUODECIMAE EXPLANATIO.

k Pars summa, quae è parte superiore marginis postici tendinis Circumflexi palati exit, ubi ille ultra hamulum jam processit in palatum. Vide ejus ortum Tab. X. Fig. 15. o.

l Pars, quae oritur ab interiore parte totius longitudinis hamuli processus pterygoidei ossis multiformis, & à lamella interna processus illius, ad hamuli radicem.

m Hic medio Buccinatoris principio continuatus.

n Pars, quae oritur ab interna parte maxillae inferioris, juxta superiora fossulae molaris postremi: unde rescissa.

o Pars pertenuis, quae procedit à latere radice linguae, ubi primum Styloglossus attingit Ceratoglossum.

p Pars, quae accedit à Genioglossi fibris, quas ille per latus pharyngis curvat. Adde Fig. 24. l. & Fig. 26.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 3. p q r s t u n; ubi (ut hic) partem integrit Constrictor medius w. Dein Fig. 2. y y z; ubi similiter partem integrit Constrictor medius a; & praeterea delitescit post Stylopharyngeum w, & Styloglossum k. Dein Fig. 1. n; ubi eodem modo pars tecta Constrictore medio d, & praeterea pone Biventrem maxillae g delitescit.

q Buccinator.

r Origo ab exteriori parte extremi hamuli processus pterygoidei ossis multiformis.

s Origo à fundo intercapedinis, quae est inter hamulum & lamellam externam processus mododisti.

t Hic à maxilla superiore oritur extrinsecus pone molarem intimum, statim supra gingivam.

u Hac parte oritur à maxilla inferiore, ab eminentia oblonga, quam ejus illa caussa habet inter intimi molaris exteriorem partem & radicem processus coronoidi: unde rescissus.

m Intermedio loco continuatus Constrictori superiori pharyngis.

Adde Tab. XI. Fig. 14. a--e. & Fig. 13. k k.

In Syntaxi, Tab. IX. y in capite; tectus porro Zygomatico majore y, Mafetere d, Latissimo colli z o.

v Lingua. Confer Tab. XI. Fig. 41.

w Styloglossus, x hic truncatus. Confer Tab. XI. Fig. 41. f.

y Lingualis. Confer Tab. XI. Fig. 41. e.

z Truncatus Ceratoglossus cum Basiloglossio. Confer Tab. XI. Fig. 41. interf. b.

a Genioglossus, b b oriens ab aspera eminentia, quae in interiore parte maxillae inferioris est, propter ejus symphysem. y hic tenues fasciculos per latus pharyngis curvat, quorum alii d accedunt ad Ceratoglossum & Styloglossum, alii e in membra pharyngis evanescunt, alii p accedunt ad Constrictorem superiorem pharyngis. Confer Tab. XI. Fig. 41. c d, & Fig. 42.

z Maxilla inferior, n n hic truncata.

Caetera cognoscuntur ex Fig. 2. Tab. X.

## FIGURAE XXIV.

### Constrictores pharyngis inferiores, medii, & superiores, à parte posteriore.

a. a Constrictores inferiores pharyngis.

b. b Origo à cartilagine cricoidea.

c Mucro, in quem à superiore parte definunt.

c--d Hic fibrae convenientes, angulos efficiunt, eo minores, quo quaeque superiores.

e Hic dextrae sinistris incurvo ductu continuatae.

Adde Fig. 23. a.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 8. a b. a b c d e.

f Stomachi fibrae interiores, transversae, hac parte nuda. g. g exteriores, ex lateribus oblique retrorsum descendentes.

h Stomachus, truncatus.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 8. f. g. g.

i. i Constrictores medii pharyngis, qui magnam partem subjacent inferioribus a a c.

k Mucro, in quem à superiore parte definunt: qui in multis tendineus tenuis repertus, affixusque ossi occipitis, ante foramen magnum, à parte inferiore.

Adde Fig. 25. & Fig. 23. f g h.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 9. a. a b c. Dein Fig. 8. n n o; ubi (ut hic) magnam partem subjacent Constrictoribus inferioribus a a c.

l. l Constrictores superiores pharyngis, qui magnam partem subjacent mediis i. i k.

m. m Partes, quae n. n oriuntur à maxilla inferiore, juxta dentes molares intimos.

o. o Hic rescissi à Buccinatoribus.

Vide Fig. 26. & adde Fig. 23. i--p.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 10. a--g. a--g; ubi ex parte post Stylopharyngeos o p. o p. Dein Fig. 9. d e f. d e f; ubi pariter post Stylopharyngeos r q. r q, & praeterea magnam partem (ut hic) subiecti Constrictoribus mediis a. a. Eodem modo Fig. 8. p q r. p q r; magnam partem subiecti mediis n n o; & praeterea Stylopharyngeis v w. v w.

p. p Dentes molares intimi.

Caetera ex Tab. X. Fig. 8. si opus, cognoscuntur.

## FIGURAE XXV.

### Constrictores pharyngis medii, à parte posteriore.

a Mucro superior, in quem conveniunt.

b Mucro inferior.

Inter quos mucrones, à b ad c, fibrae in angulos conveniunt: supremae in acutos deorsum patulos: sequentes, ut sequuntur, in majores, donec directo convenient: post has sequentes in angulos sursum patulos, eoque minores, quo inferiores.

Adde Fig. 24. i. i k, & Fig. 23. f g h.

c. c Cornua extrema ossis hyoidis.

## FIGURAE XXVI.

### Constrictores pharyngis superiores, à posteriore parte.

a Pars inferior, quae partem superiorem b decussat.

c Pars, quae d oritur ab interna parte maxillae inferioris, juxta dentem molarem intimum.

e Hic rescissa à Buccinatore.

f Mucro, in quem dexter finisterque à superiore parte conveniunt.

Inter f & g fibris suis in angulos conveniunt.

Adde Fig. 24. l m n o. l m n o. & Fig. 23. i & c.

h. h Dentes molares intimi inferiores.

## FIGURAE XXVII.

### Stylopharyngei, Palatopharyngei, Salpingopharyngei.

a Stylopharyngeus.

b Principium tendineum, c oriens ab interiore parte partis posterioris principii portionis illius, quae adjuncta processui styloformi ossis temporis, mobilis est aetate junioribus.

d Pars superior & eadem minor, quae se ad Palatopharyngeum l adjungit.

e Pars inferior & eadem major; cujus portio f inserta lateri externo marginis cartilaginis thyreoideae, ad radicem processus superioris: portio g inserta subsequenti parti marginis usque ad radicem processus inferioris.

Adde Fig. 28. a & c. & Fig. 30. a & c.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 11. f & c. Dein Fig. 10. l & c. ubi ex parte tectus Constrictore pharyngis superiore a e e. Dein Fig. 9. o & c. ubi pariter ex parte tectus Constrictore superiore d, & praeterea medio a. Eodemque modo Fig. 8. u & c.

h--l Palatopharyngeus.

h Pars, quae per palatum molle incedit, supra Levatorem palati illius.

i Hic juxta posticum marginem palati ossei exit ex membrana tendinosa, quae è naribus veniens, procedit per superiora palati mollis.

Caeterum in medio latitudinis palati mollis, fere à palati ossei postico margine usque ad radicem uvulae, dexter finisterque continuati inter se.

k Pars, quae sub Levatore palati mollis à principio jacens, exit ex aponeurosi Circumflexi palati. Vid. Fig. 29. b.

l Hic è palato molli veniens, se curvat per lateralem pharyngis partem, porroque per posteriorem pergit, conjungens se cum Stylopharyngeo d.

Adde Fig. 28. f & c. & Fig. 29. & Fig. 30. d. & c. & Fig. 11. f g.

In Syntaxi, pars, quae in pharynge est, Tab. X. Fig. 11. e: quae in Fig. 10. post Constrictorem pharyngis superiorem a. Pars, quae in palato est, Tab. X. Fig. 13. n o p; ubi ex parte post Salpingopharyngeum q delitescit, & Azygo uvulae m subjacet.

m Commune extremum Stylopharyngei & Palatopharyngei, per posteriorem membranae pharyngis incedens.

n o Hic extrema illa, dextrum finistrumque, fibris suis conveniunt inter se, per pharyngis longitudinem mediam. p o p hic in posticam partem membranae pharyngis evanescunt, & ad p. p inferuntur cartilagini thyreoideae.

Adde Fig. 30. i.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 11. o. Dein Fig. 10. t; ubi à superiore parte subjacet Constrictori pharyngis superiori a. Dein Fig. 9. s; ubi praeterea subjacet Constrictori medio a: & quod nudum, id in Fig. 8. tectum Constrictore inferiore a.

q Salpingopharyngeus, qui se ad interiorem partem Palatopharyngei adjungit.

r Origo ab inferiore eademque priore parte cartilagineae, quae tubae Eustachianae inest, naturae prope extremae.

Adde Fig. 28. k l.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 13. q.

Pharynx à superiore parte aperta est, rescisso quicquid à basi cranii usque ad Palatopharyngeorum marginem superiorem l n l est.

s s Hinc rescissa pharyngis pars posterior.

t u v Tuba Eustachiana, t hic adhuc tecta membrana, quae interiora faucium efficit, aut vestit. u hic nuda, qua parte adiacebat Levator palati mollis. v ostium, quo ad latus narium foraminis postici pertinet.

w Septum narium, vestitum membrana mucipara.

x. x Concava narium.

y Os spongiosum inferius, vestitum membrana mucipara.

z z Hinc rescissa membrana, quae narium concavum ex interiore parte vestit. Haec ut Fig. 15. Tab. X.

a Membrana tendinosa, quae incedit per superiora palati mollis, veniens ex naribus, m Fig. 14. Tab. X.

b Paries externus processus pterygoidei ossis multiformis, cum suo hamulo y, ut Fig. 16. Tab. X.

d Uvula, ut Fig. 15. Tab. X.

e e Cartilago thyreoidea.

z Pharyngis partis inferioris, eique continuatae stomachi partis, membrana nuda; n hic truncata.

Haec ut Fig. 10. Tab. X.

o Processus styloformis ossis temporis, ut Fig. 9. Tab. X.

## FIGURAE XXVIII.

### Stylopharyngei, Palatopharyngei, Salpingopharyngei.

Posteriore pharyngis parte tota, à summo per laterum longitudinem rescissa, remotaque, interior pars, quae tunc apparet, exhibita est: detracta etiam membrana, qua pars illa interior obtegatur; ut Fig. 13. Tab. X. Remota etiam cartilago cricoidea cum arytaenoidis, earumque additamentis; ut Fig. 15. Tab. X.

a b c d e Stylopharyngeus.

b Prin-



## TABULAE MUSCULORUM DUODECIMAE EXPLANATIO.

b Principium tendineum, c hic rescissum à processu styliformi ossis temporis.  
d Pars Stylopharyngei superior eademque minor. e inferiore eademque major.  
Adde Fig. 27. a &c. & Fig. 30. a &c.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 13. r &c. & Fig. 14. p &c. & Fig. 15. x &c.  
f g h *Palatopharyngeus*.  
f Pars, quae per palatum molle incedit, supra Levatorem palati illius: cum  
pare sui per mediam palati longitudinem continuata.  
g Hic exit ex membrana tendinosa, quae è naribus veniens, procedit per  
superiora palati mollis.  
h Pars, quae sub Levatore palati mollis à principio jacens, exit ex aponeu-  
rosi Circumflexi palati. Vide Fig. 29. b.  
Ab i ad i rescissae Palatopharyngei & Stylopharyngei partes, quae per poste-  
riora membranae pharyngis decurrunt, l d e m Fig. 27.  
Adde Fig. 27. h &c. & Fig. 29. & Fig. 30. d &c. & Fig. 11. f g.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 13. n o p; ubi ex parte (ut hic) post Salpingopha-  
ryngeum q delitescit, & subjacet quoque Azygo uvulae m.  
k *Salpingopharyngeus*, qui se ad anteriorem partem Palatopharyngei adjun-  
git.  
l Origo ab inferiore eademque priore parte cartilagineae, quae tubae Eusta-  
chianae inest, naturae prope extremae.  
Adde Fig. 27. q r.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 13. q.  
m Commune extremum Palatopharyngei & Salpingopharyngei, quod se  
per latus pharyngis demittit, eminetque intra eam, ac facit arcum posteriorem,  
qui per latus faucium à palato molli descendit.  
Adde Fig. 29. c.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 13. w.  
n o Communis extremi Stylopharyngei & Palatopharyngei pars à Stylopha-  
ryngeo producta: cujus haec n pars decurrit intus per ligamentum laterale epi-  
glottidis ad lateralem epiglottidis marginem: haec o inserta margini superiori  
cartilaginis thyreoideae, inter processum ejus superiorem & epiglottidem.  
Adde Fig. 29. e f.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 13. x y. & Fig. 14. y z.  
p Uvula.  
q. q Palati mollis marginem postici.  
r. r Tonillae.  
s Lingua.  
t Epiglottis.  
u Cartilago thyreoidea.  
Ut in Fig. 15. Tab. X.  
Caetera hujus Figurae sunt eadem, quae in Fig. 27.

### FIGURAE XXIX.

#### *Palatopharyngei.*

Remotae partes eorum, quae per palatum molle incedunt supra Levatores  
palati illius, f g. f g Fig. 28. Remoti & Salpingopharyngei, k. k Fig. eadem.  
a Pars, quae per palatum molle incedit sub extremo Levatoris palati illius.  
Quae se pari sui per mediam palati longitudinem continuat.  
b b Hic exit ex aponeurosi Circumflexi palati mollis.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 15. p &c. Dein Fig. 14. w; ubi testā Levatore  
palati mollis k l.  
c Pars, quae se per latus pharyngis demittit, eminetque intra eam, arcum-  
que facit posteriorem, qui per latus faucium à palato molli descendit.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 15. t, & Fig. 14. x.  
Ab d ad d rescissae Palatopharyngei & Stylopharyngei partes, quae per poste-  
riora membranae pharyngis decurrunt, l d e m Fig. 27.  
e f Communis extremi Stylopharyngei & Palatopharyngei pars à Stylopha-  
ryngeo producta: cujus haec e pars decurrit intus per ligamentum laterale epi-  
glottidis ad lateralem epiglottidis marginem: haec f inserta margini superiori  
cartilaginis thyreoideae, inter processum ejus superiorem & epiglottidem.  
*In Syntaxi*, Fig. 15. v w.  
Adde Fig. 28. f g h i m n o: & Fig. 27. h i k l m: & Fig. 30. d &c. & Fig.  
11. f g.  
Caetera hujus Figurae intelligentur partim ex Fig. 27. partim ex 28.

### FIGURAE XXX.

#### *Stylopharyngeus & Palatopharyngeus à latere.*

a *Stylopharyngeus*, b hic truncatus. Est a &c. Fig. 27. & a &c. Fig. 28.  
c Portio ejus, quae se adjungit ad superiorem partem Palatopharyngei, d  
Fig. 27.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 4. d e. Dein Fig. 2. w; ubi partem integit Con-  
strictor pharyngis medius β: & quod nudum, id in Figura 1. subjacet Biventri  
maxillae g.  
d æ *Palatopharyngeus*, æ hic truncatus. Est l Fig. 27.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 4. ff; ubi (ut hic) ex parte delitescit post Stylopha-  
ryngeum d.  
e Commune extremum Stylopharyngei & Palatopharyngei.  
f Ejus haec pars, ad Stylopharyngeum pertinens, inserta margini superiori  
cartilaginis thyreoideae, inter processum ejus superiorem & epiglottidem. Ad-  
de Fig. 28. n o: & Fig. 29. e f.  
g. h Hae, ad Stylopharyngeum pariter pertinentes, insertae margini cartila-  
ginis mododictae: & g quidem lateri externo marginis illius, ad radicem pro-  
cessus superioris; h autem, reliquo margini. Sunt f. g Fig. 27.  
i Pars infra in membranam pharyngis evanescens, o p Fig. 27.  
*In Syntaxi*, Tab. X. Fig. 4. g g h i k; ubi pars pone ossis hyoidis cornu w de-  
litescit; pars pone ligamentum x, quod ab extremo hyoidis cornu ad processum  
superiorem thyreoideae pertinet; pars (ut hic) pone cartilaginem thyreoideam  
y z. Dein Fig. 3. inter x & y, itemque ε; ubi pars pariter post cornu hyoi-

dis θ, & ligamentum t, & thyreoideam x: & praeterea testum Constrictore  
pharyngis medio w x y, & inferiore z. Dein Fig. 2. inter β & γ, itemque  
x; ubi praeterquam quod pariter post cornu hyoidis v, ligamentum modo  
dictum, Constrictorem pharyngis mediam α β γ, & inferiore δ, thyreoideam  
t, etiam post Ceratoglossum n. Dein Fig. 1. inter ε & ζ, itemque p; ubi eo-  
dem modo post cornu hyoidis n, ligamentum idem, Constrictorem medium  
δ ε ζ, inferiorem β, thyreoideam; & praeterea post Hyothyreoideum q r.  
A parte priore, Tab. III. χ in collo; portio nuda inter cornu hyoidis λ, li-  
gamentum ψ, cartilaginem thyreoideam, Hyothyreoideum τ, & Constricto-  
rem pharyngis inferiorem ω; quibus porro subjacet. Sic & Tab. II. W in col-  
lo, caeterum subjacens iisdem, cornu hyoidis, ligamento V, thyreoideae, Hyo-  
thyreoideo Y Z, Constrictori inferiori X. Nudaeque in Tabulis mododictis  
pars, in Tab. 1. delitescit post Latissimum colli Ω in collo.  
k Membrana pharyngis cum continuata ipsi membrana stomachi.

## EXTREMI INTESTINI RECTI & ANI. URETHRAE VIRILIS & BULBI EJUS. PENIS.

### FIGURAE XXXI.

#### *Levatores ani cum Sphinctere interno, à parte posteriore.*

a a--k *Levatores ani*, quandam infundibuli formam referentes, unamque,  
praeter portiones coccygi affixas, simul taeniam efficientes, quae circum in-  
testinum rectum inprimis ducta, extremis suis pelvis lateribus, angulis penis, &  
bulbo urethrae, ut indicabitur, affixa. Inque ambitu ejus praeter intestinum  
rectum, etiam inferiora vesicae cum vesiculis seminalibus & prostata continen-  
tur: vaginaque in foemina.  
a. a Partes priores ex interiore parte.  
b c d Origo ab interiore parte ossis pubis, b circa inferiora synchondrosis;  
indeque, b c parte carnea, c d tendinea, per superiora retrorsum circum princi-  
pium Obturatoris interni.  
e Tendo, qui marginem superiorem facit, à summo ortus ab osse pubis, per  
latus pelvis, fere usque ad acutum ischii processum.  
f Origo ab acuto ischii processu.  
g Pars posterior, ab exteriore parte.  
h Hic se subtus inserit priori margini coccygis ossium ultimi & penultimi h.  
i Extremum tendineum, quo se alter alteri mox infra coccygem continuat,  
fibris in ipso coitu angulos facientibus deorsum patulos.  
k Hic se carne sua continuant.  
Adde Fig. 32. a--g. a--g: & Fig. 33. & 34.  
*In Syntaxi*, Tab. VI. e e in inferiore trunci parte; ubi subeunt Sphincterem  
ani externum f. Dein Tab. V. ε in natibus; ubi pariter subeunt Sphincterem  
externum n, & post Gluteos magnos γ. γ delitescunt.  
l l *Sphincter ani internus*.  
Adde Fig. 32. l.  
*In Syntaxi* non exhibitus.  
m m Extremum intestini recti.  
n Anus.  
o o Locus synchondrosis ossium pubis p. p.

### FIGURAE XXXII.

#### *Levatores ani cum Sphinctere interno, à parte priore.*

a--g. a--g *Levatores ani*.  
a b c Origo ab interiore parte ossis pubis, a circa inferiora synchondrosis; in-  
deque, a b parte carnea, c tendinea, per superiora retrorsum circum princi-  
pium Obturatoris interni.  
d Tendo, qui marginem superiorem facit à summo ortus ab osse pubis per  
latus pelvis, fere usque ad acutum ischii processum.  
e pars tenuis, quae venit f ex angulo, in quem caput penis cum corpore  
spongioso urethrae coit: porroque, usque ad g, à latere superioris partis bulbi  
urethrae.  
Adde Fig. 31. a--k. a--k: & Fig. 33. & 34.  
*In Syntaxi* non conspicui ab hac parte, quippe qui in Tab. IV. testis Erec-  
toribus penis ζ. ζ in trunco, & Transversis perinaei ι. ι.  
h Bulbus urethrae, in corpus spongiosum urethrae i abeuns.  
k Urethra cum corpore spongioso suo truncata.  
l *Sphincter ani internus*.  
Adde Fig. 31. l l.  
m m Extremum intestini recti.  
n Anus.  
o o o o o. o o o o o Hic ossa pubis truncata, excisssaeque pars, ad cernendos Le-  
vatores.

### FIGURAE XXXIII.

#### *Levator ani sinister à latere, ab exteriore parte.*

a Tendo, qui marginem superiorem facit à summo ortus ab osse pubis, per  
latus pelvis, fere usque ad acutum ischii processum.  
b c d Origo ab interiore parte ossis pubis, b c parte tendinea, c d carnea,  
circum principium Obturatoris interni.  
e Origo ab interiore parte processus acuti ischii.  
f Pars tenuis, quae venit ex angulo, in quem caput penis cum corpore  
spongioso urethrae coit: porroque è latere superioris partis bulbi urethrae.  
g Insertio priori margini coccygis ossium penultimi, h ultimi.  
i k Hac parte se alter alteri infra coccygem continuat.  
Adde Fig. 34. & Fig. 31. a--k: & Fig. 32. a--g.  
l l l Truncatum ischion, m m m n os pubis, n o o ischii tuber; quo, excisso  
[y]



# TABULAE MUSCULORUM DUODECIMAE EXPLANATIO.

osse, cerni Levator possit.

## FIGURAE XXXIV.

### *Levator ani dexter à latere, ex interiore parte.*

- a Tendo, qui marginem superiorem facit à summo ortus ab osse pubis, per  
latus pelvis, fere usque ad acutum ischii processum.  
b c d Origo ab interiore parte ossis pubis, b c parte tendinea, c d carnea,  
circum principium Obturatoris interni.  
e Origo ab interiore parte processus acuti ischii.  
f Pars tenuis, quae venit ex angulo, in quem caput penis cum corpore  
spongioso urethrae coit: porroque è latere superioris partis bulbi urethrae.  
g Insetio priori margini coccygis ossium penultimi, h ultimi.  
i k Hac parte se alter alteri infra coccygem continuat: i parte tendinea, k  
carnea. Unde alter rescissus.  
Adde Fig. 33. & Fig. 31. a--k: & Fig. 32. a--g.  
l Sinistrum os ischium, m pubis.

## FIGURAE XXXV.

### *Sphincter externus ani, à parte posteriore.*

- a Mucro posterior, qui adhaeret coccygi extremo. Unde fibrae, ad anum  
usque b, ex utroque latere convenientes, angulos efficiunt deorsum patulos:  
superiores acutos, sequentes, ut sequuntur, majores.  
Adde Fig. 36. a b c c.  
In Syntaxi, Tab. VI. f in inferiore trunci parte. Dein Tab. V. n circa na-  
tes.

## FIGURAE XXXVI.

### *Sphincter externus ani, à parte priore.*

- a Fibrae ex utroque latere convenientes, angulos efficiunt deorsum patulos,  
quorum superiores acuti, sequentes, ut sequuntur, majores.  
b Cauda, in quam abit; quae ad postremum evanescit in perinaeo.  
c c Haec pars supra caudam mododictam exit in mucronem quasi triangula-  
rem, qui se innectit inferiori parti Acceleratorum, qua illi coeunt inter se.  
Adde Fig. 35.  
In Syntaxi, Tab. IV. θ in trunco; ubi mucro ob propendentem penis par-  
tem non conspicuus. Dein eodem modo Tab. III. λ in trunco.  
d Bulbus urethrae, abeuns in corpus spongiosum e urethrae.  
f Urethra cum corpore suo spongioso truncata.

## FIGURAE XXXVII.

### *Acceleratores. Transversus perinaei. Transversus perinaei alter. Erectores penis.*

- a a b c c Acceleratores, bulbum urethrae, qua is eminet, amplectentes.  
Conjungit se alter cum altero b per mediam bulbi longitudinem. Et ubi con-  
jungunt se, fibrae angulos faciunt, posteriores quidem vix, prope directo con-  
venientes: sequentes ut ab his longius distant, minores.  
c c Mucrones priores, quibus à pene procedunt.  
Caeterum origo cerni nequit in Figura.  
In Syntaxi, Tab. IV. μ in trunco; ubi partim testis Sphinctere externo ani  
θ, partim Transversis perinaei ι ι, partim Erectoribus penis ζ ζ: pars ob pro-  
pendentem penis portionem non conspicua. Dein Tab. III. μ in trunco; ubi  
pars eodem modo testis Sphinctere externo λ, pars Erectore penis ν.  
d Transversus perinaei.  
e Extremum, quod partim adjungit Acceleratori, partim Sphincteri ani ex-  
terno, & quod pari etiam sui continuare solet.  
Adde Fig. 38.  
In Syntaxi, Tab. IV. ι in trunco; ubi subit Sphincterem ani externum θ.

f Transversus perinaei alter.

- i Hic se extremo suo ad Erectorem penis inflectens, inter eum & Accele-  
ratorem pertinebat in angulum, in quem caput penis cum bulbo urethrae coit.  
Adde Fig. 39.  
k l m. k l m Erectores penis.  
l Extremum tendineum, m m insertum corpori spongioso majori penis, ul-  
tra caput ejus. Caeterum autem se etiam capiti, qua id pubis ossi non adja-  
cet, inserit, fere à capitis illius principio; ultraque caput ad hunc m m locum  
usque inserit.  
Adde Fig. 40.  
In Syntaxi, Tab. IV. ζ ζ in trunco; ubi extrema non conspicua ob penis  
portionem propendentem.  
n n o Penis. n. n corpora spongiosa majora. o corpus spongiosum urethrae. p  
penis hic truncatus.

## FIGURAE XXXVIII.

### *Transversus perinaei, à parte posteriore.*

- a Origo ab interiore parte tuberis ischii.  
Adde Fig. 37. d e.  
In Syntaxi, Tab. VI. h in inferiore parte trunci; ubi extremum subit Sphin-  
cterem ani externum f. Dein Tab. V. inter ζ & η in nate; ubi pariter subit  
Sphincterem externum η, & post Gluteum magnum γ delitescit.

## FIGURAE XXXIX.

### *Transversus perinaei alter, à parte posteriore.*

- a Origo ab interna parte ossis pubis, circa ejus locum illum, qui medius  
inter ima tuberis ischii, pubisque synchondroses.  
Adde Fig. 37. f i.  
In Syntaxi, Tab. VI. g in inferiore trunci parte; ubi extremo subit Levato-  
rem ani e: & quod nudum, id in Tab. V. delitescit post Gluteum magnum γ  
in nate.

## FIGURAE XL.

### *Erector penis, à parte posteriore.*

- a Principium tendineum, quod b b oritur ab interiore parte tuberis ischii,  
paullo ante quam id in os pubis abeat.  
Adde Fig. 37. k l m.

## VESICAE.

## FIGURAE XLI.

### *Musculus vesicae, à latere.*

- Hunc, quamvis tantummodo perraro invenerim, addere tamen ob elegan-  
tiam visum est. An fortasse is est, qui olim visus ad prostaticam pertinere,  
Compressor ejus vocatus?  
a Oriebatur ab interiore parte ossis pubis, loco inter ima synchondrosis fi-  
nitimamque superiorem foraminis magni partem fere medio, juxta internam  
partem ortus Levatoris ani.  
b Inde flectebat se circum vesicae latus, mox supra prostaticam, latefcens fen-  
sim.  
c c Ad postremum valde extenuatus, continuabat se vesicae fibris, vel in  
eas potius abibat.  
d Vesica.  
e Prostata.  
f f Hic os pubis sinistrum truncatum, remotumque reliquum ossis coxae,  
quo Musculus cum vesica & prostata cerneretur.






I.  
*Obliquus externus abdominis.*




II.  
*Obliquus externus abdominis.*




III.  
*Obliquus internus abdominis.*



IV.  
*Obliquus internus abdominis.  
cum cremastere.*



V.  
*Obliquus internus abdominis.*



VI.  
*Rectus abdominis.*



VII.  
*Pyramidalis.*





# TABULAE ANATOMICAE TERTIAE ET DECIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

## ABDOMINIS. TESTIS.

Adde Tab. XIV.

### FIGURAE I.

#### *Obliquus externus abdominis, à latere.*

a a Pars carnea.  
b c d d Caput primum. c principii pars tendinea. d d origo à costa quinta.  
e f g g Caput secundum. f pars tendinea. g g origo à costa sexta.  
h i k k Caput tertium. i pars tendinea. k k origo à costa septima.  
l m n n Caput quartum. m pars tendinea. n n origo à costa octava.  
o p q q Caput quintum. p pars tendinea. q q origo à costa nona.  
r s t t Caput sextum. s pars tendinea. t t origo à costa decima.  
u v w w x Caput septimum. v pars tendinea. w w origo à costa undecima.  
x haec pars connexa cum Transverso abdominis principio, ibi ex ejus tendinea parte exeuns.  
y z A Caput octavum. z pars tendinea. A origo à cartilagine costae duodecimae.

Capita oriuntur margine oblique posito, ab ora inferiore costae, per costae exteriorem partem, in priora marginem ejus superiorem versus ducto.

B B B B C C D E E E E F F F G H I K L M Aponeurosis.

C C Hic sub ea eminet caro Obliqui interni.

D Hic sub eadem simul & sub aponeurosi Obliqui interni, eminet caro Transversi.

E E E E Hic Recti caro.

F F F Hic per aponeuroses illas apparent lineae tendineae Recti.

G Hic sub iisdem eminet Pyramidalis.

H H. I K Duae partes, in quas aponeurosis se findit, inde ad pubem usque distinctae, tendinum specie: ex quo fissura fit, per quam elabatur funiculus vasorum spermaticorum cum Cremastere.

K Hic se partium mododictarum exterior inserit tuberculo, quod è superiore eademque priore parte ossis pubis eminet; proximaeque spinae, quae ab illius tuberculi latere externo est: ex parte etiam ab interno ejusdem tuberculi latere cum ligamentis, quae pubis synchondrosen à priori parte continent, commiscet.

L Pars tenuior, ab altero tendinum mododictorum ad alterum pertinens eosque connectens inter se. Sub qua parte funiculus spermaticorum vasorum decurrit, cum Cremasteris principio; M hic exeuntia.

N N Imus margo tendineus, à cristae ilium extremo priore pertinens ad pubem.

O P Hic aponeurosis, P Q hic pars carnea, aliis in tendinosum finem extenuata, inserta superiori eidemque exteriori parti partis prioris longitudinis cristae ossis ilium.

R Aponeurosis inserta cartilagini costae sextae.

Quomodo à superiore parte aponeurosis cum ima Pectoralis parte connexa sit, id vide in Tab. I s in trunco.

Adde Fig. 2.

In Syntaxi, Tab. IX. S &c. in trunco: ubi à superiore parte Pectorali H I subjacet; dein capitibus suis Serrato magno N R O R P R Q; dein Latissimo dorso Ω E D, & inter D & C.

### FIGURAE II.

#### *Obliquus externus abdominis, à parte priore.*

a a Pars carnea.  
b c d d Caput primum. c pars tendinea. d d origo à costa quinta.  
e f g g Caput secundum. f pars tendinea. g g origo à costa sexta.  
h i k k Caput tertium. i pars tendinea. k k origo à costa septima.  
l m n n Caput quartum. m pars tendinea. n n origo à costa octava.  
o p Caput quintum. p origo à costa nona.  
q q q q r r s t t t t t u u v w x x y y z A B B B C D E F F F G H I K Aponeurosis.  
r r Hic caro Obliqui interni sub ea eminet.  
s Hic sub ea simul & sub aponeurosi Obliqui interni eminet Transversi caro.  
t t t t Hic Recti caro eminet.  
u. u. u. u Hic per aponeuroses illas apparent lineae tendineae Recti.  
v Hic Pyramidalis sub iisdem eminet.  
w w Imus margo tendineus, à cristae extremo priore pertinens ad pubem.  
x x. y. y Duae partes, in quas aponeurosis se findit, inde ad pubem usque distinctae, tendinum specie: ex quo fissura fit, per quam funiculus vasorum spermaticorum cum Cremastere elabatur: in foemina exit ligamentum rotundum uteri.

z Pars tenuior, ab altero tendinum mododictorum ad alterum, qua primum à se invicem ad fissuram faciendam discedere incipiunt, pertinens, eosque connectens inter se. Sub qua parte funiculus vasorum spermaticorum cum Cremasteris principio decurrit. Infraque eam, juxta ipsam pubem, funiculus elabitur per annulum Obliqui hujus; qui annulus parvus est A, relinquiturque inter partem hanc z, tendines x. y, & os pubis.

B. B. B. &c. Fila tendinea subtilia, rara; quae decussant aponeurosis fila illa,

quae carneorum in modum porrecta sunt. Ab iis fit pars z, ab altero tendinum y. x x per alterum excurrentibus.

C Pars summa aponeurosis, inserta priori parti cartilaginis costae sextae.

D Pars inserta priori parti extremae cartilaginis costae septimae.

E Pars inserta ossi cartilaginis mucronatae.

E F F F Linea alba, in qua Obliquorum externorum aponeuroses se decussant, continuantque, & cum subiectis conjungunt.

G Foramen in linea alba, per quod in embryone exibant vasa umbilicalia.

H Hinc procurentes aponeuroses dextri & sinistri se decussant, & commiscet cum ligamentis, quae pubis synchondrosen à priori parte continent.

I Pars ima procurrens, seseque commiscens cum ligamentis, quae pubis synchondrosen à priori parte continent, & cum iis inferens K ossi pubis opposito.

Adde Fig. 1.

In Syntaxi, Tab. I. d &c. in trunco: ubi à superiore parte subjacet Pectorali ξ in trunco; dein capitibus suis Serrato magno ω a b; dein Latissimo dorso τ υ.

A posteriore parte Tab. V. W in dorso; ubi partem tegit Latissimus dorso P Q.

L Pubis ossium synchondrosis, ligamentis à priori parte constricta.

### FIGURAE III.

#### *Obliquus internus abdominis, à parte posteriore.*

a a Latus tendo, qui duabus aponeurosis incipit: quarum exterior subiecta hic lato tendini Latissimi dorso i, ipsi superinducto, & adnexo.

b b Principium tendineum, oriens à superiore parte cristae ilium.

c Pars carnea.

d e Extremum, insertum exteriori parti marginis inferioris costae duodecimae, d partis osseae extremae, e cartilagineae.

f g Extremum, insertum exteriori parti marginis inferioris costae undecimae, f osseae partis extremae, g cartilagineae.

h Extremum, quod ad costam decimam pertinet.

i Latus tendo, quo Latissimus dorso incipit: quem tendinem vide Tab. XVIII. Fig. 2..

k k Hinc rescissus latus tendo Latissimi dorso, ubi tendo ille subtus non amplius cohaeret cum lato tendineo principio Obliqui interni.

Adde Fig. 4. & 5.

In Syntaxi, Tab. VI. M. &c. in inferiore trunci parte; ubi à principio, ut hic, superinducto lato Latissimi dorso tendine U tectus. Quaque parte nudus est in Tabula illa, ea in Tab. V. subjacet Latissimo dorso P Q, & Obliquo externo abdominis, W in dorso.

### FIGURAE IV.

#### *Obliquus internus abdominis, à parte priore; cum Cremastere.*

a Pars carnea.

b Origo à superiore parte cristae ilium.

c c Margo procedens à margine tendineo Obliqui externi abdominis.

d d Carnea pars inserta inferiori parti cartilaginis costae decimae.

e e e Aponeurosis, hac parte simplex, antequam Rectum attingat: quae f f inserta inferiori parti cartilaginis costae nonae.

g g g h Lamella prior earum, in quas se aponeurosis illa juxta Rectum dividit.

h Hic lamella illa prior affixa inferiori parti costae nonae.

Inter g inferiorem & i inferiorem, quod aponeurosis est infra locum, qui circa medium inter umbilicum pubisque synchondrosen, simplex manet, à posteriore parte conjunctum cum aponeurosi Transversi, cum eaque incedens ante Rectum.

i i i Hic lamella prior, continuoque aponeurosis pars inferior, quae simplex manet, per longitudinem abdominis resecta, ibi ubi se primum cum aponeurosi Obliqui externi conjungunt; posteriorem partem ejus ad lineam albam usque vestientes. Supraque lamella prior secundum marginem thoracis evanescit in illam Obliqui externi aponeurosem. Infra aponeurosis se cum aponeurosi Obliqui externi inserit, pubis spinae, tuberculo, ligamentis.

k k Lamella posterior earum, in quas se aponeurosis juxta Rectum dividit; post Rectum incedens. In superiore parte ejus, fibrae quaedam tenues fibras praecipuas decussant.

l m n Hic se affigit imo thoracis margini, qui fit è cartilaginibus costae octavae l m, & septimae m n.

o p Hic se inserit margini osseae partis cartilaginis mucronatae: p q hic cartilaginis ipsius. q r hic priori parti cartilaginis, non longe ab ipsius mucrone.

s s s Hic ad lineam albam pertinet.

t Pars carnis, sub qua decurrit funiculus vasorum spermaticorum, leviter eminens, per eamque conspicuus. Quae pars deinde supra funiculum spermaticum decurrit.

u Haec pars in principium Cremasteris abit. Post eam funiculus spermaticus y per carnem exit.

Adde Fig. 3. & 5.

In Syntaxi, Tab. II. M &c. in trunco; ubi pars superior eademque major lamellae posterioris earum, in quas se aponeurosis ejus juxta Rectum dividit, Recto illi Z Z &c. subiecta; infraque ante eum funiculus spermaticus r cum Cremasteris principio q, ut hic, dependet. In Tabula autem I. Obliquo externo, d &c. in trunco, subjacet.



## TABULAE MUSCULORUM TERTIAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

v w x x *Cremaſter.*

w Principium, ab Obliquo interno abſcedens, & adjungens ſe funiculo vaſorum ſpermaticorum.

x x Extremum extenuatum, ad tunicam vaginalem teſtis definens. In aliis autem alio modo definire viſus: conſer Hiſtor. Muſc. Lib. III. cap. 80.

Adde Fig. 5.

In *Syntaxi*, Tab. II. p q in trunco; ubi, ut hic, pars etiam pone funiculum ſpermaticum & teſtem. Dein Tab. I. z in trunco; ubi principium latet ſub aponeuroſi Obliqui externi abdominis.

y Funiculus vaſorum ſpermaticorum.

z Synchrondroſis oſſium pubis, ligamenti à priori parte conſtrictor.

### FIGURAE V.

#### *Obliquus internus abdominis, à latere.*

a Aponeuroſis, duarum illarum, quibus incipit, exterior: quae veſtit internam partem lati tendinis, quo Latiffimus dorſi incipit; cum eo oriens à ſpinis vertebrarum lumborum inferiorem trium, & ſequentibus oſſis ſacri, & à ſuperiore parte criſtae ilium b b.

Aponeuroſem, earum, quibus incipit, internam, vide Tab. XIV. Fig. 3.

c c Latus tendo, in quem gemina ejus aponeuroſis ſe conjungit.

d d Origo à ſuperiore parte criſtae ilium, principio tendineo.

e e Hac parte procedit à margine Obliqui externi abdominis.

f f Pars carnea.

g h Inſertio exteriori parti marginis inferioris coſtae duodecimae: g oſſeae partis extremae, h cartilagineae.

i Hoc margine procedit ſecundum Intercoſtalem internum undecimum.

k l Inſertio exteriori parti marginis inferioris coſtae undecimae. k oſſeae partis extremae, l cartilagineae.

m Hoc margine procedit ſecundum Intercoſtalem internum decimum.

n n Inſertio inferiori parti cartilaginis coſtae decimae.

o o o Aponeuroſis, hac parte ſimplex, antequam Rectum attingat. Eaque hoc p margine ſecundum Intercoſtalem internum nonum procedit: dein q q affixa inferiori parti cartilaginis coſtae nonae.

r r Lamella prior earum, in quas ſe aponeuroſis illa juxta Rectum dividit.

Inter r inferiorem & s inferiorem, quod aponeuroſis eſt infra locum, qui circa medium inter umbilicum pubiſque ſynchrondroſem, ſimplex manet, à poſteriore parte conjunctum cum aponeuroſi Tranſverſi, cum eaque incedens ante Rectum.

s s s Hic lamella prior, continuoque aponeuroſis pars inferior, quae ſimplex manet, per longitudinem abdominis reſecta, ibi ubi ſe primum cum aponeuroſi Obliqui externi conjungunt, poſteriorem partem ejus ad lineam albam uſque veſtientes.

t t t Lamella poſterior earum, in quas ſe aponeuroſis juxta Rectum dividit, poſt Rectum incedens. In ſuperiore parte hujus lamellae, fila quaedam tendinea tenuia decuſſant fila ejus praecipua.

u Pars carnis, ſub qua decurrit funiculus vaſorum ſpermaticorum, leviter eminens, per eamque conſpicuus.

v Haec pars in principium Cremaſteris abit.

Adde Fig. 3. & 4.

In *Syntaxi*, in Tab. IX. jacet poſt Obliquum externum abdominis S &c. in trunco, & Latiffimum dorſi Ω A.

w Cremaſteris principium, ab Obliquo interno abſcedens.

x Funiculus vaſorum ſpermaticorum.

y Cremaſter cum funiculo vaſorum ſpermaticorum truncatus.

In *Syntaxi*, Tab. IX. l in trunco; ubi principium latet ſub aponeuroſi Obliqui externi abdominis f.

### FIGURAE VI.

#### *Rectus abdominis.*

a b c Tendo praecipuus, quo incipit, quique b venit è ſuperiore eademque priore parte ligamenti, quo ſynchrondroſis oſſium pubis à priori parte conſtricta: & c exigua portione à proximo oſſe pubis oritur.

d e Tendo alter, longius veniens è priori parte e ligamenti ejusdem; & ſe cum altero tendine a conjungens in unum.

f g h i. Carnea partes quatuor.

k Linea tendinea dimidia, infra umbilicum.

l Linea tendinea, quae è regione umbilici eſt.

m Linea tendinea, quae eſt media inter umbilicum, & locum ubi Rectus pectus primum conſcendit.

n Linea tendinea, ibi ubi Rectus pectus primum conſcendit, aut conſcenſurus eſt.

o o. Extremum inſertum inferiori proximaeque exteriori parti extremae cartilaginis coſtae ſeptimae.

p p Extremum inſertum exteriori parti marginis inferioris cartilaginis coſtae ſextae, propius mediam ejus longitudinem, ad externum primi latus.

q q Extremum exteriori eidemque inferiori parti cartilaginis coſtae quintae inſertum, fere ubi cartilago illa incipit, ad externum latus extremi ſecundi.

In *Syntaxi*, Tab. II. Z Z &c. in trunco, in dextro latere; ubi à principio ſubjacet Pyramidali l: in ſiniſtro praeterea ex parte teſtus, ſupra quidem lamella priori earum, in quas aponeuroſis Obliqui interni ſe juxta Rectum dividit; infra autem communi aponeuroſi Obliquorum & Tranſverſi; cujus illa tantum pars apparere ibi poteſt, quae fit à lamella priore earum, in quas ſe aponeuroſis Obliqui interni juxta Rectum dividit, W X &c. In Tabula autem I. reliquum ejus ſubjacet, infra quidem communi aponeuroſi Obliquorum & Tranſverſi, dein communi Obliquorum aponeuroſi; quarum ſola pars, quam aponeuroſis Obliqui externi efficit, ibi apparere poteſt, o p &c. in trunco: dein, ubi thoracem conſcendit, ſoli aponeuroſi illi Obliqui externi: denique Pectorali ξ in trunco.

r Synchrondroſis oſſium pubis, ligamenti conſtricta.

### FIGURAE VII.

#### *Pyramidalis abdominis.*

a b Principium tendineum, quo a oritur è ſuperiore parte ligamenti, quo pubis oſſium ſynchrondroſis à priori parte conſtricta; & b à proxima pubis oſſis parte.

c Pars carnea.

d Extremum latum, quo ad lineam albam pertinet.

In *Syntaxi*, Tab. II. l m in trunco; ubi ex parte teſtus communi aponeuroſi Tranſverſi & Obliquorum, cujus ſola apparere ibi poteſt lamella prior earum, in quas ſe aponeuroſis Obliqui interni dividit, Y Q in trunco. Et quod nudum ibi, id in Tab. I. aponeuroſi communi mododictae ſubjectum, cujus ſola apparere pars poteſt, quae Obliqui externi eſt, q w in trunco.

e Synchrondroſis oſſium pubis, conſtricta ligamenti.






I.  
*Transversus abdominis*  
*cum Triangulari sterni.*



II.  
*Transversus abdominis.*




III.  
*Transversus abdominis.*




IV.  
*Diaphragma.*



V.  
*Diaphragma.*



VI.  
*Diaphragma.*



VII.  
*Diaphragma.*





# TABULAE ANATOMICAE QUARTAE ET DECIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

## ABDOMINIS RELIQUI.

Adde Tab. XIII.

### FIGURAE I.

*Transversus abdominis cum Triangulari sterni, à parte priore.*

a--v *Triangularis sterni.*

a b c d Capitis, quod ab interiore parte costae tertiae oritur, principium tendineum, oriens b c ab extrema ossea parte, & c d cartilagineae principio.

e f g h Capitis, quod à costae quartae interiore parte oritur, principium tendineum, oriens f g ab extrema ossea parte, & g h cartilagineae principio.

i k l m Capitis, quod à costae quintae parte interiore oritur, principium tendineum, oriens k l ab extrema ossea parte, & l m à cartilagineae principio.

n n Pars tendinea, in quam caro, ex conjunctione duorum capitum superiorum nata, abit: quae in aliis conjuncta cum u u extremo tendineo capitis inferioris, in aliis separata. Inferta interiori parti o extremae cartilaginis costae quartae; p ossis pectoris inter extrema cartilaginum costae quartae & quintae; q extremae cartilaginis costae quintae; r ossis pectoris inter extrema cartilaginum costae sextae & sextae; s extremae cartilaginis costae sextae, t septimae.

u u Extremum tendineum, in quod abit caro capitis tertii: v insertum margini ossis cartilaginis mucronatae. Quomodo porro inde continuo inferatur reliquo margini ossis illius, usque ad cartilaginem mucronatam, illiusque ipsius cartilaginis margini; id cerni hic nequit, ob lamellam anteriorem aponeurosis Obliqui interni abdominis  $\pi$ , hic superinductam. Vide autem Tab. X. Fig. 24. v w.

In *Syntaxi*, Tab. III. x in trunco; ubi extremo superinducta lamella anterior aponeurosis Obliqui interni abdominis s: caeterumque costis subjectus, sternoque, & Intercostalium internorum sexto h, quinto b, quarto a, tertio Z. Quae vero nuda ibi pars est, ea lamellae interioris aponeurosis Obliqui interni parti, hic rescissae, subjecta. A posteriore parte, Tab. X. Fig. 24.

w--v *Transversus abdominis.*

w Caput primum, x principio tendineo oriens ab interiore parte costae sextae: y ab extrema parte ossea, & z proxima cartilaginea. Hoc caput accenseri Triangulari posset, quod cum ejus capite inferiore & citius, & ductu magis consimili conjunctum est, quam cum capite, quod mox infra sequitur.

$\alpha$  Caput secundum,  $\beta$  principio tendineo oriens  $\gamma \gamma$  ab interiore parte cartilaginis costae septimae.

$\delta \delta \delta \delta$  Principium, in partes aliquot (hic quatuor) fissum, quo oritur  $\delta \delta \delta \delta$  ab interiore parte cartilaginis costae octavae.

$\epsilon$  Aponeurosis, qua ex intervallo costae octavae & nonae venit. Vid. Fig. 2. i.

$\zeta$  Origo ab interiore parte cartilaginis costae nonae.

$\eta$  Aponeurosis, qua venit ex intervallo costae nonae & decimae. Vide Fig. 2. m.

$\theta$  Origo ab interiore parte cartilaginis costae decimae.

$\iota$  Origo ab interiore parte cartilaginis costae undecimae.

$\kappa$  Origo à crista ilium.

$\lambda \lambda$  Margo, qui procedit à margine tendineo Obliqui externi abdominis.

$\mu$  Pars carnea.  $\nu \nu$  Aponeurosis, in quam abit.

Adde Fig. 2. & 3.

In *Syntaxi*, Tab. III. l--q in trunco; ubi capita ejus subjecta costis: & primum etiam Intercostali interno quinto b, & sexto h; quartum octavo e, quintum nono f. Reliquum in Tab. II subiacet Obliquo interno M &c. in trunco.

$\xi \xi \xi$  Truncata lamella posterior aponeurosis Obliqui interni, qua se primum cum aponeurosi Transversi, extremoque tendineo Triangularis sterni, conjungit.

$\omicron \omicron$  Truncata aponeurosis Obliqui interni, qua se primum conjungit cum aponeurosis Transversi parte illa, quae ante Rectum & Pyramidalem incedit.

$\pi$  Lamella posterior aponeurosis Obliqui interni abdominis, superinducta aponeurosis Transversi parti illi, quae Recto subjecta: unaque cum ea inserta  $\sigma$  priori parti cartilaginis mucronatae, non longe ab ipsius mucrone; &  $\sigma$  inferiori parti marginis cartilaginis ejusdem; porroque eidem margini, &  $\tau$  margini partis osseae, conjuncta ibi cum extremo tendineo Triangularis sterni.

Adde Fig. 2. & Tab. XIII. Fig. 4.

$\nu$  Aponeurosis Obliqui interni, qua simplex remanet, superinducta aponeurosis Transversi parti illi, quae ante Rectum & Pyramidalem incedit.

Adde Fig. 2. & Tab. XIII. Fig. 4.

$\phi \phi \phi \chi \chi$  Hic aponeurosis Transversi, una cum superinductis sibi partibus aponeurosis Obliqui interni, ad lineam albam pertinet.

$\psi$  Fissura aponeurosis Transversi, circa medium inter umbilicum & pubis synchondroses locum: effecta ex eo, quod aponeurosis illa ibi se juxta Rectum, indeque ad lineam albam usque ex transverso findit, ac superiore parte earum, in quas se findit, pone Rectum, inferiore ante eum Pyramidalemque incedit. Per quam itaque fissuram Rectus transit, cui magnitudine & figura respondet. Repperitur tamen etiam pone Recti inferiorem partem aponeurosis Transversi continuatio tenuis, aliis crassior, tenuior aliis, quibusdam plus minus velut interrupta, latitudinis majoris aliis, aliis minoris.

$\omega \omega$  Linea alba. A qua hic A A rescissa aponeurosis Obliqui externi, una cum lamella priore aponeurosis Obliqui interni.

B. &c. Hic truncatae costae; C. D. E. F hic cartilagineae earum, C quartae, D quintae, E sextae, F septimae; G G hic os pectoris, ut cerni possint Triangularis & Transversus; qua post ea fiti.

### FIGURAE II.

*Transversus abdominis, à latere.*

a b c d Caput primum. a pars carnea. b principium tendineum, oriens ab inte-

riore parte costae sextae: c ab extrema ossea parte, & d à proxima cartilaginea.

e f g Caput secundum. e pars carnea. f principium tendineum, oriens g ab interiore parte cartilaginis costae septimae.

h h h h Principium, quod in partes aliquot (hic quatuor) fissum, oritur h h h h ab interiore parte cartilaginis costae octavae.

i Aponeurosis, qua venit ex intervallo costae octavae & nonae, è superficiei interna Intercostalis interni, & partim ab ipsa costa nona. k hic truncata: venit enim longius, tenuitate.

l Origo ab interiore parte cartilaginis costae nonae.

m Aponeurosis, qua venit ex intervallo costae nonae & decimae; ut i.

n Origo ab interiore parte cartilaginis costae decimae.

o Aponeurosis, qua venit ex intervallo costae decimae & undecimae; ut i.

p Origo ab interiore parte cartilaginis costae undecimae.

q Aponeurosis, qua venit ex intervallo costae undecimae & duodecimae; ut i.

r Origo ab interiore parte extremae cartilaginis costae duodecimae, principio tendineo.

s Latus tendo, quo in lumbis incipit. t Pars carnea.

u u Margo, qui procedit à margine tendineo Obliqui externi abdominis.

v Aponeurosis, in quam caro abit.

Adde Fig. 1. & 3.

w w Truncata lamella posterior aponeurosis Obliqui interni,  $\xi \xi \xi$  Fig. 1.

x x Truncata aponeurosis Obliqui interni,  $\omicron \omicron$  Fig. 1.

y Lamella posterior aponeurosis Obliqui interni,  $\pi$  Fig. 1.

z Aponeurosis Obliqui interni, qua simplex remanet;  $\nu$  Fig. 1.

A Fissura aponeurosis Transversi,  $\psi$  Fig. 1.

B B &c. Hic costae truncatae, ut appareat Transversus, qua post eas fitus.

### FIGURAE III.

*Transversus abdominis, à parte posteriore.*

a--r Principia lati tendinis, quo Transversus incipit, una cum principiis lamellae interioris, qua communis aponeurosis Obliqui interni & Serrati postici inferioris procedit à processibus transversis lumborum, quartae, tertiae, secundae.

In *Syntaxi*, Tab. VII. subjacent capiti communi Sacrolubmalis & Longissimi dorsi  $\delta \epsilon$  in trunco.

a Caput tendineum Transversi, quod oritur b b ab exteriori parte imi marginis costae duodecimae, & c à posteriore extremi processu transversus vertebrae quintae lumborum.

d e f g h h i Caput tendineum, quod oritur e f à posteriore parte extremi processu transversus lumborum quartae. g tendinea tenuitas, quae ipsi superinducta, cum eo oritur f à processu transverso, & praeterea h h ab illo ipso capite abscedit, seseque affigit i i exteriori parti imi marginis costae duodecimae.

k l m n o o Simile caput tendineum, quod oritur l m ab exteriori parte extremi processu transversus vertebrae lumborum tertiae. n similis, qua obductum, tenuitas tendinea, cum eo oriens m, & praeterea ab eo abscedens o o.

p q Caput tendineum, cui in totum superinducta est tenuitas tendinea, cum eo oriens q à posteriore parte processu transversus extremi secundae lumborum.

r. r Hic fibrae se decussant, implicantque; & obscurius, quam exhiberi potuit. Ad hunc autem maxime modum eo in corpore, unde haec figura sumpta; cum in aliis plus minus discrepaverint.

s s Hinc rescissa lamella exterior aponeurosis communis Serrati postici inferioris & Obliqui interni abdominis.

t t Aponeurosis communis Serrati postici inferioris & Obliqui interni; u u hic rescissa, ubi cum lato tendine, quo Transversus incipit, non amplius cohaeret.

v Latus tendo, quo Transversus incipit, adhaerens imo margini costae duodecimae, w x partis osseae, x y cartilagineae, ad mucronem usque.

z Origo ab interiore parte cartilaginis costae duodecimae, principio tendineo.

$\alpha$  Aponeurosis q Fig. 2. Hic  $\beta$  truncata.

$\gamma$  Pars carnea.

Adde Fig. 2. & 1.

In *Syntaxi*, Tab. VII. Y Z in trunco; ubi ex parte subjacet aponeurosi communi Serrati postici inferioris & Obliqui interni abdominis  $\gamma \gamma$ ; itemque Intercostali interno undecimo X. Quod vero nudum, in Tab. VI. delitescit post Serratum posticum inferiorem C K, & Obliquum internum M N in trunco.

$\epsilon$  Truncata cartilago costae duodecimae.

### FIGURAE IV.

*Diaphragma, à latere.*

a Caro secunda sinistra, quae abit in extremum laterale finistrum.

b b Ejus extremum, insertum interiori parti cartilaginis costae septimae.

c c Quod insertum interiori parti cartilaginis costae octavae.

d e f Quod parti interiori costae nonae, d e partis cartilagineae, e f osseae. d pars tendinea extremi hujus.

g h i Quod interiori parti decimae, g h partis cartilagineae, h i osseae. g pars tendinea hujus extremi.

k l m Quod partim k l pertinet ad ligamentum w, partim l m insertum interiori parti osseae partis costae undecimae, juxta cartilagineam. l pars tendinea.

n o p Quod partim n o pertinet ad ligamentum v, partim o p insertum interiori parti costae duodecimae: o cartilaginis, o p osseae partis. o pars tendinea.

q r r r s Aponeurosis p--s Fig. 7. hic q r r r super tendinem, hic r r r s carnem.

[A a]



## TABULAE MUSCULORUM QUARTAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

- t Tendo medius Diaphragmatis.  
 u Caput magnum finistrum, a æ b c Fig. 5.  
 Adde Fig. 5. 6. & 7.  
 v Ligamentum, quod fere à mucrone cartilaginis costae duodecimae pertinet ad ossæam partem undecimae, juxta cartilagineam.  
 w Ligamentum, quod fere à principio cartilaginis costae undecimae pertinet ad ossæam partem costae decimae, juxta cartilagineam.  
 x. & c. Truncatae costae, quo cerni Diaphragma possit, qua post eas situm.

### FIGURAE V.

#### *Diaphragma, à parte priore.*

- a æ b c d. a æ b c d Capita duo prima, quorum finistrum dextro minus. a a te-  
 nitas tendinea, quae nascens è ligamentis, quae per superficiem corporum  
 vertebrarum lumborum infra ortum horum capitum excurrunt, ad ea extrinse-  
 cus accedit. æ æ hic subitus capita haec crassis tendinibus c. c oriuntur ab inferio-  
 re parte corporis vertebrae lumborum tertiae, & quidem à lateribus partis ejus  
 prioris. Alias & hic b. b, à superiore parte corporis secundae. Quidam ten-  
 dinem utrumque bifidum habuerunt; alii alterutrum. d. d carnes, in quas ten-  
 dines illi ab exterioribus lateribus abeunt. Principia, quae ad haec capita acce-  
 dere solent, eo quod subjacent iis, hic non conspicua.  
 efg. efg Capita secunda, e. e principio tendineo nascentia f è ligamento, quod  
 inter corpus tertiae & quartae lumborum intercedit. g. g carnes, in quas abeunt.  
 h i k. h i k Capita tertia, h. h principio tendineo orientia i. i à lateribus supe-  
 rioris marginis corporis quartae lumborum. k. k carnes, in quas abeunt.  
 l m n Caput quartum finistrum. l principium tendineum, m oriens à priori  
 parte radicis processus transversii lumborum quartae. n caro, in quam abit.  
 o o Principium, aliquoties inventum, nasceas è superficie Quadrati lumborum.  
 p. p Diaphragmatis carnae partes primae, è capitum conjunctione natae.  
 q Capitis primi finistri portio accedens ad carneam partem primam dextram,  
 posteaque excurrans per marginem dextrum foraminis, quo stomachus exit.  
 r Capitis primi dextri pars, quae post portionem q incedens, eam decussat,  
 abique in carnem primam finistram. Fit ut plures fasciculi se decussent.  
 s Foramen, quo stomachus exit.  
 t Tendinis medii pars.  
 u u u u Pars carnea finistra secunda. Confer Fig. 6.  
 v v v v w w Pars carnea secunda dextra, w w hic primam supercandens, &  
 decussans eam, mox tendinea.  
 x y z æ ß Portio, qualis aliquando in uno, aliquando in utroque latere inveni-  
 tur, faciens inferiorem Diaphragmatis ab hac parte marginem; quae hic (alias  
 autem aliter) oritur à processu transversio quartae lumborum vertebrae y, item-  
 que à quintae; & primum x tendinea (pariter autem alio alioque in aliis aliif-  
 que modo) deinde z carnea, adjungit se carnae parti secundae v, post æ con-  
 jungit cum ea, inferitque ß cartilagini costae duodecimae.  
 γ γ Truncatus margo, qui C C Fig. 6.  
 δ Tendinis medii mucro anterior, in quem exit: in quo fasciculi se decussant.  
 ε Extremum carneum medium, quod ad interiorem partem cartilaginis mu-  
 cronatae fere extremae pertinet ζ ζ.  
 η. η Partes carnae duae secundae; quae abeunt in duo extrema lateralia.  
 θ. θ Earum extrema, quae se peritoneaeo innectunt.  
 ι ι Extremum, insertum interiori parti cartilaginis costae septimae. λ λ hoc  
 rescissum ab ea.  
 μ μ Hoc insertum interiori parti cartilaginis costae octavae. ν ν hoc rescissum ab ea.  
 ξ ξ Hoc insertum interiori parti cartilaginis costae nonae. ο ο hoc rescissum ab ea.  
 π π Hoc insertum interiori parti cartilaginis costae decimae. ς ς hoc rescissum ab ea.  
 σ. σ Extrema, inserta interiori parti cartilaginis costarum undecimarum.  
 Adde Fig. 6. 7. & 4.  
*In Syntaxi*, Tab. IV. M--o in trunco; ubi caput quartum finistrum ex par-  
 te subjacet Psoae magno t; dextrum, Psoae parvo r, & magno t: primum ex  
 parte Psoae magno, inter v & w.  
 τ τ. & c. Hic costae exsectae, quo cerni Diaphragma possit, qua post eas.  
 υ υ Truncata cartilago mucronata: cujus haec φ cartilaginea pars, χ χ haec ossæa.

### FIGURAE VI.

#### *Diaphragmatis pars posterior, à parte priore.*

- a æ b c d. a æ b c d Capita prima duo, a æ b c d. a æ b c d Fig. 5.  
 efg. efg Capita secunda, efg. efg Fig. 6.  
 h i k. h i k Capita tertiae, h i k. h i k Fig. 5.  
 l m n Caput quartum finistrum, l m n Fig. 5.  
 o o Principium, quod o o Fig. 5.  
 p Diaphragmatis carnea pars prima finistra; q dextra: è conjunctione ca-  
 pitum natae, ad postremum implent totum posticum lunatum tendinis ambitum.  
 r r Haec pars venit à processu transversio vertebrae lumborum quartae, ut  
 l m n: venit autem pone partem D E F; ut Fig. 7. e f.  
 s Capitis primi finistri portio accedens ad carnem primam dextram: q Fig. 5.  
 t Capitis primi dextri pars, abeunt in carnem primam finistram: r Fig. 5.  
 u Foramen in carnea parte prima, quo stomachus exit.  
 v In cujus angulo superiore caro dextra decussat finistram; dextra priore.  
 w w x y Tendinis medii pars finistra. x pars tendinis supercandens reli-  
 quum w, decussans eum. y pars, quae super partem x decurrit, decussans  
 eam, & abit in carnis finistram secundae partem inferiorem.  
 z Aponeurosis quaedam, quae per lateralem tendinis ambitum porrecta, à  
 carne, quae est ad mucronem posticum finistrum tendinis, incedens in priora,  
 decussansque tendinis fibras, & à priori parte definens in carnem priorem.  
 æ æ Pars aponeurosis v x x x Fig. 7. penetrans ad inferiorem tendinis partem;  
 acceptaque, cum penetravit, portione ab inferiore parte tendinis, juxta finis-  
 tram foraminis stomachi, flectit se dextrorsum, ß supraque foramen illud ince-  
 dit ad priorem partem carni extremi dextri: partimque decurrit γ secundum  
 priorem partem foraminis, quo cava intrat; seseque adjungit ad aponeurosem τ.  
 δ Portio ad aponeurosem æ accedens, procedensque è carne finistra prima,  
 juxta tendinis initium.

- ε ε ζ ζ η Fasciculi tendinei, qui è tendine w exeunt ε ε, & ad postremum par-  
 tim se ζ ζ implicant tendini, partim η continuant.  
 θ θ Pars carnea secunda finistra, in quam tendo w w x y abit.  
 ι ι Ejus extremum, insertum interiori parti costae duodecimae, ι ossæae par-  
 tis, κ cartilagineae.

- λ λ Truncatus margo, ubi continuabatur Transverso abdominis, inter costas  
 duas postremas: alias autem oritur à ligamento v Fig. 4.

- μ μ μ Tendinis medii pars dextra, producta à carne prima dextra.

- ν ν Lata aponeurosis, à carne, quae est ad mucronem posticum dextrum ten-  
 dinis, procedens, & carni quidem primae ξ ο continuata; juxta secundam autem  
 ο π è tendinis fasciculis exeunt; incedit in priora, decussans tendinis fibras:  
 & à priori parte partim ε ε implicant se tendini, partim σ σ σ definit in carnem prio-  
 rem, partim τ decurrit secundum dextram partem foraminis cavae.

- υ υ υ Aponeurosis μ μ μ μ Fig. 7. circa ima foraminis cavae ad inferiorem par-  
 tem tendinis penetrans; posteaque se flectens φ circum finistram foraminis ca-  
 vae, ad ejus oram pertinens. Post procurrit per priorem tendinis mucronem.

- χ Est A Fig. 7.

- ψ Pars tendinea, in quam carnea pars prima dextra, qua in angulo superiore  
 foraminis, quo stomachus exit, decussat finistram, abit: quae dein post tendi-  
 nem ß decurrit, posteaque ω per inferiora tendinis.

- A Margo tendineus, qui ad posteriorem partem foraminis, quo vena cava  
 exit, pertinet, effectus ab illa praecipua tendinis parte, quae à carne prima  
 dextrorsum procedit ad secundam. Est B Fig. 7.

- B B Pars carnea secunda dextra, in quam tendo μ μ μ abit.

- C C Ejus truncatus margo, qui λ λ in latere finistro.

- D E F G H Portio, quae x--β Fig. 5. Eadem origo E, pars tendinea D,  
 carnea F, conjuncta G cum carnea parte secunda B, insertaque H cartilagini cos-  
 tae duodecimae.

- I Foramen in tendine, quo vena cava exit.

- K K K K Pars prior Diaphragmatis per hunc ambitum rescissa.

- Adde Fig. 5. 7. & 4.

### FIGURAE VII.

#### *Diaphragma, à parte posteriore.*

- a. b Capita prima duo.  
 c d. e f Capita secunda. c. e principia tendinea. d. f partes carnae.  
 g Principium, quod o o Fig. 5.  
 h Capitis primi dextri pars, quae accedit ad carnem primam finistram.  
 i Caro effecta ex capitis primi dextri parte, & accedente ad eam capitis pri-  
 mi finistri portione q Fig. 5. & s Fig. 6.  
 k. l Partes carnae primae, k dextra, l finistra.  
 m Partis carnae primae finistae portio decussans dextram in angulo supe-  
 riore foraminis, quo stomachus exit.  
 n Foramen in carnea parte prima; quo stomachus exit.  
 o o o Tendinis medii pars finistra, è carne prima nata.  
 p & c. Lata aponeurosis, quae ad latus tendinis ex carne sensim nascens p p p,  
 inde secundum lateralem marginem tendinis, & per initium carnis secundae, in-  
 ter p p p q & r r r; & per tendinem, inter r r r & s s s; incedit ad mucronem ten-  
 dinis posticum, circumeunusque eum, partim t subitus continuat se carni primae,  
 partim v pergit secundum lunatum posticum tendinis marginem: & x x x penetrat  
 in inferiorem tendinis partem, fitque α Fig. 6: ad postremum w decurrit secun-  
 dum superiorem partem foraminis cavae dextrorsum. u u hic se fasciculi decussant.  
 y Lata aponeurosis, quae à carne prima finistra oriens, hic z z sub aponeu-  
 rosi v emergit; diuque conjuncta s s s cum aponeurosi p p p q r r r s s s, post ab ea  
 recedit, & partim α decurrit secundum partem superiorem foraminis cavae,  
 conjuncta cum aponeurosi w; partim ß per superiora tendinis decurrit in priora.  
 γ γ Pars carnea secunda finistra, in quam tendo o o o abit.  
 δ Ejus truncatus margo, λ λ Fig. 6.  
 ε Ejusdem extremum, quod se inferit costae duodecimae: ι ι Fig. 6.  
 ζ Tendinis medii pars dextra, è carne prima nata.  
 η η η & c. Lata aponeurosis, quae ad latus tendinis, ex carne sensim nascens  
 η η η tenuitate tendinea, inde secundum lateralem marginem tendinis, maxime  
 per initium carnis secundae, inter η η η θ & ι ι ι; & per tendinem, inter ι ι inferio-  
 res & κ κ; incedit ad mucronem tendinis posticum, circumeunusque eum, pergit  
 λ secundum lunatum posticum tendinis marginem: & in decursu μ μ μ μ pene-  
 trat ad inferiorem tendinis partem, fitque υ υ υ Fig. 6: ad postremum pertinet ν ad  
 inferiorem partem foraminis cavae, partimque ξ se secundum marginem fora-  
 minis cavae dextrorsum flectit. ο hic se fasciculi decussant.

- π ξ σ τ υ υ υ υ Quaedam ab aponeurosi mododicta veluti abludentes partes,  
 per tendinem decurrentes, seseque ei υ υ υ υ innectentes. τ τ hic fasciculi se decussant.  
 φ φ φ Fasciculi tendinei, qui è tendine exeunt, decurrunt per eum in priora.  
 χ Fasciculustendineus, è tendine exeunt; & pertinens ad carnem secundam ψ.  
 ω Est φ Fig. 6.

- A Pars tendinis, ad oram foraminis, quo vena cava exit, hic pertinens. Est  
 χ Fig. 6.

- B Margo tendineus ad posteriorem partem foraminis, quo vena cava exit,  
 pertinens. Is potissimum fit ab illa praecipua tendinis parte, quae à carne pri-  
 ma dextrorsum procedit ad secundam. Est A Fig. 6.

- C Foramen in tendine, quo vena cava exit.

- D D Pars carnea secunda dextra, in quam tendo ζ abit.


- E E Ejus truncatus margo, C C Fig. 6.

- F Extremum portionis D E F G H Fig. 6.

- Adde Fig. 6. 5. & 4.

- In Syntaxi*, Tab. VIII. μ in lumbis; ubi partem integit Quadratus lumborum λ.  
 Advertendum autem, quod, cum multae & magnae in Diaphragmate va-  
 rietates occurrerint, eligendum hic unum aliquod fuerit.







# TABULAE ANATOMICAE QUINTAE ET DECIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

## SPINAE DORSI.

### FIGURAE I.

#### Multifidus Spinae.

a Caput, quod oritur inde à spina tertia ossis sacri usque ad tuberculum ejusdem ossis, quod fit ex concretionem processus obliqui descendentes quartae ipsius vertebrae cum obliquo ascendente quintae; & ab ipso illo tuberculo.

Reliqua capita tria, quae oriuntur à tuberculis, quae fiunt ex concretionem processus obliqui descendentes tertiae ossis sacri vertebrae cum ascendente quartae, descendentes secundae cum ascendente tertiae, descendentes primae cum ascendente secundae; illa, inquam, capita apparere hic nequeunt, quod musculo subjacent.

b c Caput, quod oritur b partim ab eminentia, quam os sacrum in dorso suo ad externum latus foraminis sui secundi & tertii habet: partim c à ligamento, quod ab eminentia mododictae ad finitimam ossis ilium partem deductum.

d Hic jacet post os ilium, ubi ab eo etiam oritur.

e Tendinosus excursus capitis, quod oritur à processu obliquo ascendente vertebrae primae ossis sacri. f Similis illius, quod ab ascendente primae lumborum. g illius, quod à secundae. h quod à tertiae. i quod à quartae. k quod à quintae. l quod à superiore parte extremi processus transversus primae dorfi.

m Caput tendinosum, oriens à processu transversus secundae dorfi: & quidem à processu fere extremi parte superiore & eadem posteriore.

n Simile, oriens à processu transversus tertiae dorfi parte posteriore & eadem superiore, inter radicem ejus, radicemque tumoris, in quem definit. o simile, simili modo oriens à quarta. p simile à quinta. q à sexta. r à septima. s ab octava. t à nona. u à decima. v ab undecima. w à duodecima.

x Simile, oriens à posteriore & eadem superiore parte processus oblique descendentes colli vertebrae secundae. y simile à tertiae. z à quartae.

α Extremum tendinosum, quod se inserit inferiori margini spinae prope extremam lumborum primae vertebrae. β quod secundae. γ quod tertiae. δ quod quartae. ε quod quintae. ζ quod primae dorfi. η quod secundae. θ quod tertiae. ι quod quartae. κ quod quintae. λ quod sextae. μ quod septimae. ν quod octavae. ξ quod nonae. ο quod decimae. π quod undecimae. ς quod duodecimae. σ quod primae colli. τ quod secundae. υ quod tertiae. φ quod quartae. χ quod quintae. Omnia autem inde subius inferere se pergunt inferiori margini vertebrae ad earum processum obliquum descendentes usque; ut in extremo supremo ψ ω exhibitum.

ψ ω Extremum supremum, quod se colli sextae vertebrae inserit: ψ inferiori margini primum spinae prope extremam; porroque ω ad processum obliquum descendentes usque, sine extrinsecus tendineo.

Capitum caudarumque decursus, fibrarumque conjunctio, quales extrinsecus sunt, in Figura apparent.

In extremo quoque ad vertebrae colli sextam pertinente, exemplum apparet portionum à pluribus uno capitibus ad unam eandemque vertebrae pertinentium, & antequam se inferant, in unam veluti caudam confluentium. Extremum quippe ψ ω, quod ad vertebrae illam pertinet, fit à capitibus tribus z. y. x; ejusque portio, quae à capite proximo, hoc est z, accedit, inserta juxta processum obliquum ω: juxta hanc, quae à proximo inferiore y: juxta hanc ψ, quae rursus à proximo x, ita quaeque propius spinam extremam, ut à capite remotiore. Ad quem modum etiam in reliquis fit, quarum solae portiones longae extrinsecus apparent, cum breviores proximis longioribus subjaceant.

Adde Fig. 2.

In Syntaxi, Tab. VIII. 14. 14. in latere sinistro; ubi summum ejus extremum tectum Obliquo inferiore capitis, k l in capite & collo. Dein 14. 14. in latere dextro; ubi praeterea tectus Spinali cervicis 2, & Semispinali dorfi, p in dorso. Dein Tab. VII. x in trunco; ubi praeter partem illam in totum tectus capite communi Longissimi dorfi & Sacrolumbalis, δ ε in trunco; & Longissimo dorfi, Σ in trunco; & Spinali dorfi, i in trunco; & Complexo, u in cervice. Pars autem, quae nuda ibi est, ea in Tab. V. jacet sub Gluteo magno, γ in nate.

### FIGURAE II.

#### Multifidus Spinae, à latere.

Illam ejus portio, quae in lumbis proximaque dorfi parte est, à latere hic exhibita; ad ostendenda, quae in Fig. 1. apparere non possunt.

a Pars, quae procedit ab ossis sacro, ligamento ab eo ad os ilium deducto, ossis ilium; a b c d Fig. 1.

b Caput tendinosum, quod procedit à processu obliquo ascendente primae vertebrae ossis sacri. Cujus capitis principium, utpote pone os ilium jacens, apparere hic nequit. Oritur autem à processu illo, ut caput proximum c ab obliquo ascendente primae lumborum.

c d Caput tendinosum, oriens d à margine processus obliqui ascendentes primae vertebrae lumborum, juxta externum latus obliqui descendentes vertebrae secundae, cum quo ascendens ille commissus est.

e f Simile, ab obliquo ascendente secundae lumborum f.

g h Simile, ab obliquo ascendente tertiae h.

i k Simile, ab obliquo ascendente quartae k.

l m Simile, ab obliquo ascendente quintae m.

n Extremum tendinosum, quod pertinet ad spinam secundae lumborum. o quod ad tertiae. p quod ad quartae. q quod ad quintae. r quod ad primae dorfi. s quod ad secundae.

t Hic truncatus.

u v. w x. y z. α β. γ Portiones, quae aut ad Multifidum referri possunt, aut pro distinctis musculis haberi. Duabus quibusque proximis inter se vertebrae lumborum inserta una: suprema, quintae lumborum imaeque dorfi.

u v Prima oritur u ab exteriori parte radicis processus obliqui ascendentes. v inserit se inferiori parti radicis tuberculi illius, quod inter processum transversum & obliquum ascendentes eminet; porroque inferiori parti marginis ipsius illius obliqui. Ut haec, sic reliquae.

w x Secunda. w origo, x insertio.

y z Tertia. y origo, z insertio.

α β Quarta. α origo. β insertio.

γ Quinta. γ origo.

Sola autem secunda, w x, in totum cerni ab hac parte potest; cum reliquae in fine ex parte deliteant pone processus transversos; quinta in totum: & prima à principio ex parte pone os ilium.

Adde Fig. 1.

## LUMBORUM ET DORSI.

### FIGURAE III.

#### Longissimus dorfi cum Sacrolumbali, & Cervicali descendente.

a b Caput commune, quo Longissimus dorfi & Sacrolumbalis incipiunt. a pars tendinea, b carnea.

c d e Hac parte caput illud oritur à crista ossis ilium, c parte carnea, d e tendinea. e f hac cum Gluteo magno cohaeret. g h hic pars tendinea oritur à tuberculis duobus superioribus, quae sunt juxta hiatum extremi canalos ossis sacri. h i pars tendinea interrupta, constans è tendinibus à spinis vertebrae lumborum duarum inferiorum, omnibusque ossis sacri orientibus.

k. l. m Tendines, qui oriuntur à spinis vertebrae lumborum, k tertiae, l quartae, m quintae.

n Capitis communis divisio in Longissimum dorfi & Sacrolumbalem.

o Longissimus dorfi.

p Pars tendinea capitis communis, una cum illa, quae à tendinibus i. k. l accedit, per Longissimum extrinsecus excurrens.

q Cauda per cervicem ascendens; quae in tendinem r abit, ad postremum se cum Cervicali descendente tendine E E conjungentem.

f Abibat hic & in tendinem alterum f, pertinentem ad imam partem extremi cornu posterioris processus transversus vertebrae colli tertiae.

Portio, quam Trachelomastoideo tendo r dat, Tab. VII. Ω in cervice, hic rescissa.

Adde Fig. 5. & 6.

Ex parte subjacet Sacrolumbali s. Confer Fig. 5.

s Sacrolumbalis.

t u v. &c. Ejus caudae ad costas pertinentes; quarum t. w. z. γ. ζ. ι. μ. ο. σ partes carnae; u. x. α. δ. η. κ. ν. π. τ. φ. ψ tendines, in quos abeunt. Pertinentque tendines ad costas: v ad undecimam, y ad decimam, β ad nonam, ε ad octavam, θ ad septimam, λ ad sextam, ξ ad quintam, ς ad quartam, υ ad tertiam, χ ad secundam, ω ad primam. Caudam, quae ad costam duodecimam pertinet, vide Fig. 6. t.

Insertae autem imae parti superficiei inaequabilis, quae est in exteriori parte costarum non longe à spina dorfi, in ipso earum sese in latus flectentium cubito. Praeter duas supremas ad costas duas superiores pertinentes: quae fere juxta tuberculum illud insertae χ. ω, cui affixum ligamentum alligans costam processui transversus vertebrae. Et quae ad primam pertinet, & costae primae, quo dictum loco, inserta ω, & praeterea processui transversus vertebrae dorfi summae.

Adde Fig. 4.

A Cervicalis descendens.

B Excursus tendineus capitis ejus illius, quod oritur à costa sexta. Vide Fig. 4.

C C C. D D. E E Tres ejus caudae tendineae, quae circum subiectos musculos se flectunt: pertinentque C C C ad colli vertebrae secundam, D D ad tertiam, E E ad quartam; ad imam partem extremi cornu posterioris processus earum transversus. Earum E E, quae ad quartam, conjuncta cum tendine r Longissimi dorfi.

A principio hic subjacet Sacrolumbali. Confer Fig. 4. z.

Adde Fig. 4.

In Syntaxi, Tab. VII. δ---Ω in trunco, cum D in cervice; ubi postremus tendo Longissimi cum Cervicalis descendentes tendine conjunctus, se flectit post Transversalem cervicis, C C in cervice. Dein Tab. VI. x---υ in trunco, & X in cervice; ubi majorem partem tecti lato tendine, quo incipiunt Serratus posticus inferior & Obliquus internus abdominis, cui superinductus latus tendo U, quo Latissimus dorfi incipit: tecti & Serrato postico inferiore C D, & Rhom-

[B b]



## TABULAE MUSCULORUM QUINTAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

boideo majore p p q, & Serrato postico superiore a b, & Levatore scapulae Z, Et quod illa in Tabula in dextro latere nudum est, id in Tab. V. tegit Latissimus dorsi P, & Cucullaris B, in dorso: praeter exiguum partem, M ibidem.

### FIGURAE IV.

#### *Sacrolumbalis cum Cervicali descendente.*

a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. Hic truncatae tendineae caudae Sacrolumbalis, quas Figura tertia integras ostendit u. x. & c. in qua latent sub iis portiones à costis accedentes.

m Portio, quae ad Sacrolumbalem à costa duodecima accedit. n quae ab undecima, o quae à decima, p quae à nona, q quae ab octava, r quae à septima.

s. s. & c. Principia tendinea, quibus portiones illae à costis oriuntur, à posteriore parte earum, paullo propius spinam, quam ubi caudae Sacrolumbalis infertae.

t. u. v. w. x Capita Cervicalis descendentes; quorum t oritur à costa sexta. u à quinta, v à quarta, w à tertia, x à secunda.

y. y. & c. Tendines, quibus capita illa incipiunt, oriunturque à posteriore parte costarum, paullo propius spinam, quam ubi caudae Sacrolumbalis infertae. Hi tendines hic ab exteriori parte cito carnem producant; ab interiori autem longiores sunt.

z Cervicalis descendens, cum Sacrolumbali ita conjunctus, ut ejus continuatio sit, hoc est, portionum ejus illarum, quas à costis accipit.

α Tendineus excursus capitis primi, illius scilicet, quod à costa sexta procedit, t. In aliis autem non excurrit tam longe.

β β γ. δ δ ε. ζ ζ η Cervicalis descendens tres caudae tendineae, quae se circum musculos subiectos flectunt: pertinetque β β ad colli vertebrae secundam, δ δ ad tertiam, ζ ζ ad quartam: ac se inferunt imae parti extremi cornu posterioris processus earum transversi, γ. ε. η.

θ Hic truncatus Longissimus dorsi. Confer Fig. 3. n o. Ex qua caetera quoque hujus Figurae repetenda.

Adde Fig. 3.

### FIGURAE V.

#### *Longissimus dorsi.*

a Longissimus dorsi.

b. c. d. e. f. g. h. i Caudae, hic majorem partem tendineae, quas costis inferit, exteriori scilicet earum parti, postquam costae non longe à processibus transversis recessere. b quam decimae inferit. c quam nonae. d quam octavae. e quam septimae. f quam sextae. g quam quintae. h quam quartae. i quam tertiae. Sunt autem latiores, subjacentque ex parte proximae cuique caudae. Quam inferit costae undecimae, & quam duodecimae, eae non apparent, quia subjacent musculo.

l Illarum caudarum, quas processibus transversis vertebrarum dorsi inferit, postrema, tendine longiore l inserta, & m posteriori eidemque inferiori parti processus transversus extremi, & n proximae parti costae primae.

o Cauda per cervicem ascendens. Quae hic in duas caudas se dividit, in tendines p p q. r s abeuntes, qui se flectunt circum subiectos musculos. Eorumque alter p p se inferit q imae parti extremi cornu posterioris processus transversus vertebrae colli quartae: alter r s eidem parti vertebrae tertiae s.

t Hinc Sacrolumbalis resectus.

Adde Fig. 3. & 6.

Caetera hujus Figurae sunt eadem, quae in Fig. 3.

### FIGURAE VI.

#### *Longissimi dorsi & Sacrolumbalis.*

Longissimus & Sacrolumbalis una cum communi suo capite resecti sunt, relictis portionibus, quas caput commune vertebrae lumborum inferit, & quam costae imae: illisque, quas Longissimus processibus transversis vertebrarum dorsi; praeter illam, quam supremam: relictis praeterea principiis portionum, quae ad Longissimum accedunt. Quae omnia aut capiti communi, aut Longissimo subjacent.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. Quinque caudae à capite communi rescissae; quarum a b inserta imo tuberculo, quod est juxta posteriorem partem radicis processus transversus vertebrae lumborum primae; c d secundae, e f tertiae, g h quartae (quae & ad finitimam inferiorem eandemque posteriorem partem processus obliqui ascendens quartae pertinet h), i k quintae. Earum b, d, f, h, k pars tendinea, qua se inferunt.

l m. n. o. p. q. r. s. Quinque caudae, à capite communi rescissae; quarum l m inserta margini inferiori partis posterioris processus transversus vertebrae lumborum primae, ad extremum processus illius: n o secundae, p q tertiae, r quartae, s quintae. Earum duae inferiores hic in fine tendineae m, o: media ex parte q: duae superiores totae carnae.

t Portio lata, quam caput Sacrolumbalis commune, à quo rescissa, hic inferit u u inferiori margini costae ultimae, ab exteriori parte. A principio conjuncta cum portione s ad extremum processum transversum quintae lumborum pertinente.

v. w. x. y. & c. Caudae Longissimi, quas processibus transversis vertebrarum dorsi inferit; posteriori & eidem inferiori parti extremi eorum. v w quam vertebrae primae inferit; cujus w extremum tendineum, quo inserta. x y quam secundae; cujus y extremum tendineum, quo inserta. z α quam tertiae; cujus α extremum tendineum, quo inserta. β γ quam quartae; quae primum bifida, extremo tendineo γ communi inserta. δ ε quam quintae, pariter primum bifida, communique extremo tendineo ε inserta. ζ η quam sextae, similiter primum bifida, dein extremum tendineum commune η efficiens, quo inserta. θ quam septimae, inserta extremo tendineo ι. Ad octavam duae caudae extremis tendineis κ. λ. pertinebant. Similiter ad nonam μ. ν. Ad decimam

una, extremo tendineo ξ ei inserta. Similiter ad undecimam ο. Omnes à Longissimo rescissae. Quae ad duodecimam, eam vide in Fig. 5. l m.

π. ρ. σ. τ Principia tendinea capitis, quae ad interiorem partem Longissimi hic accedebant, orientia π. ρ. σ. τ à superiore & eadem posteriore parte processum transversum fere extremorum vertebrarum dorsi, primae, secundae, tertiae, quartae. υ. υ. υ. υ. hic truncata.

Adde Fig. 3. & 5.

### DORSI.

Adde *Interspinales dorsi*, ex Fig. II. repetendos.

### FIGURAE VII.

#### *Spinalis dorsi.*

a. b. c. d. e. Quinque tendines, quibus oritur à spinis vertebrarum lumborum duarum superiorum, triumque inferiorum dorsi. Eorum inferior a, qui oritur à quarta lumborum, longissimus, crassissimusque: proximus b, qui à quinta lumborum, brevior & tenuior: hoc brevior & tenuior alter c, qui à prima dorsi: hoc quartus d, qui à secunda: brevissimusque, gracillimusque superior e, qui à tertia. Ad postremum in carnem abeunt.

f Corpus carneum.

g. h. i. k. l. m. n. Septem caudae, in quas abit: quae primum carnae, dein tendineae g. h. i. k. l. m. n. pertinent ad spinas septem dorsi vertebrarum, quae mox infra summam sunt; & lateri quidem extremi fere mucronis earum inferuntur. Inferior brevissima, exilis: quae sequuntur, ut sequuntur, longiores, insigniores. Extremaque tendinea eo insigniora, & longiora, quo superioris caudae sunt. g quae ad quintam pertinet, h quae ad sextam, i quae ad septimam, k quae ad octavam, l quae ad nonam, m quae ad decimam, n quae ad undecimam.

In *Syntaxi*, Tab. VII. i in trunco. Dein Tab. VI. α in dorso; ubi magnam partem tectus Serrato postico inferiore C, & Rhomboideo majore p p q, & Splenio colli, V in latere sinistro. Et quod nudum in illa Tabula, id in Tab. V. contextum Latissimo dorsi P, & Cucullari B, in dorso.

### FIGURAE VIII.

#### *Semispinalis dorsi.*

a. b. c. d. e. f. g. h. Quatuor capita, diu tendinea a. c. e. g; quae incipiunt à posteriore & eadem superiore parte processuum transversorum fere extremorum, b tertiae, d quartae, f quintae, h sextae dorsi vertebrarum. Tendines breviores, quo superiores.

i Corpus carneum.

k. l. m. n. o. p. q. Septem, in quas abit, caudarum tendines, pertinentes ad inferiorem partem lateris spinarum vertebrarum dorsi superiorum quinque, collique proximarum duarum, non longe à mucrone earum: k ad spinam octavae dorsi, l ad nonae, m ad decimae, n ad undecimae, o ad duodecimae: p ad colli primae, q ad secundae. Eo longiores, quo superiores. Caudae autem superiores, contra quam sunt, angustiores apparent in Figura, ob perspectivae rationem.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. p in dorso. Dein Tab. VII. a b c d e f g h; ubi caeterum tectus Spinali dorsi i, Longissimo dorsi Σ, & Biventre cervicis h, in cervice. Dein Tab. VI. z in dorso; ubi praeterea tectus Splenio colli U V, & Splenio capitis, P in cervice: & qua nudus ibi, in dextro latere jacet post Rhomboideum majorem, p p q in dorso.

### FIGURAE IX.

#### *Intertransversarii dorsi.*

a b Primus, qui a oritur ab anteriore parte processus transversus primae dorsi vertebrae, b inferitque se inferiori & eidem posteriori parti processus transversus secundae.

c d Secundus, qui c oritur à superiore & eadem posteriore parte processus transversus secundae dorsi; d insertus inferiori & eidem posteriori transversus tertiae.

e Tertius, f quartus, g quintus, h sextus, i septimus, k octavus, l nonus. Oriuntur, inferuntque se, ut secundus.

Inferiores insigniores: qui sequuntur, quo superiores, exiliores, minusque carni: superiores, k. l, ita exiles tendineique, ut potius ligamenta referant, quam musculos.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. f. g. h. i. k. l. m. n. o in dorso, in latere sinistro. In dextro tertius h, quartus i, quintus k, & sextus l, ex parte tecti Semispinali dorsi q r s t: septimus m, octavus n, & nonus o, Spinali cervicis 3. 4. 5. Et qua ibi nudi, subiecti Longissimo dorsi, Σ in trunco Tab. VII.

### LUMBORUM.

### FIGURAE X.

#### *Intertransversarii lumborum.*

a b Primus, qui a oritur à superiore parte processus transversus vertebrae lumborum imae, non longe ab ejus extremo. b insertus inferiori parti processus transversus secundae, pariter non longe ab ejus extremo.

c d Secundus, similiter c oriens à superiore parte processus transversus secundae, & d insertus inferiori parti transversus tertiae.

e f Tertius, similiter e oriens à superiore parte transversus tertiae, & f insertus inferiori quartae.

g h Quartus, similiter g oriens à superiore parte transversus quartae, & h insertus inferiori quintae.

i k Quintus, similiter i oriens à superiore parte transversus quintae, k insertus

au-



## TABULAE MUSCULORUM QUINTAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

autem tuberculo, quod ab exteriore eademque posteriore parte transversum imae dorsi infra eminet.

*In Syntaxi*, Tab. VIII.  $\Psi$ .  $\Omega$ .  $\alpha$ .  $\beta$ .  $\gamma$  in lumbis. Qui in Tab. VII. post commune principium Sacrolumbalis & Longissimi dorsi,  $\delta$  & in trunco.

### FIGURAE XI.

#### *Interspinalis lumborum, à latere.*

Exhibitus tantummodo unus, & is quidem, qui à secunda lumborum spina pertinet ad tertiam.

a a Principium tendinosum, quod oritur ab eminentia, quae in inferiore parte lateris spinae à processu obliquo inferiore ad spinae extremum porrecta jacet.

b Extremum tendinosum, insertum inferiori parti lateris spinae, infra eminentiam modo dictam.

Tales & inter reliquas lumborum spinas. Talis & inter spinam summam lumborum, imaeque dorsi.

*In Syntaxi* à posteriore parte exhibiti Tab. VIII.  $\Theta$ .  $\Lambda$ .  $\Xi$ .  $\Pi$ .  $\Sigma$ .  $\Phi$  secundum spinam; ubi à latere iis adjacet Multifidus 14: & Tab. VII. A posteriore autem parte jacent post latum tendinem, quo incipiunt Serratus posticus inferior & Obliquus internus abdominis, cui tendini superinductus latus tendo, quo Latissimus dorsi incipit, U Tab. VI. in trunco.

*Interspinales dorsi* similes sunt, inter imas dorsi spinas reperti.

*In Syntaxi* pariter à posteriore parte exhibiti Tab. VIII.  $\Gamma$ .  $\Delta$  secundum spinam; ubi & à latere iis adjacet Multifidus 14. Et à posteriore etiam parte jacent post latum tendinem, quo incipiunt Serratus posticus inferior & Obliquus internus abdominis, cui tendini superinductus latus tendo, quo Latissimus dorsi incipit, U Tab. VI. in trunco.

### FIGURAE XII.

#### *Quadratus lumborum, à parte priore.*

a a b Principium tendineum, quod a a oritur à superiore & eadem interiore parte cristae ossis ilium, mox à posteriore mediae longitudinis ejus; & b à ligamento, quod à processu transversum vertebrae lumborum imae ad os ilium ex transversum pertinet.

c c Extremum tendineum latum, quod inserit interiori parti marginis inferioris costae duodecimae, non longe à capite ejus primo.

d e Extremum exile tendineum, quod inserit e lateri corporis vertebrae dorsi imae, juxta costam imam.

Adde Fig. 13.

*In Syntaxi*, Tab. IV. p in trunco; ubi caeterum testus Psoa magno t, & delitescit post Diaphragma, T S R in trunco, &  $\Psi$  R.

f Ligamentum, quod à processu transversum vertebrae lumborum imae ad os ilium ex transversum pertinet

### FIGURAE XIII.

#### *Quadratus lumborum, à parte posteriore.*

a Pars principii, oriens à ligamento, quod à processu transversum vertebrae lumborum imae ad os ilium ex transversum pertinet.

b c. d e. f g. h i Portiones tendineae, insertae imae parti extremorum processuum transversorum, c secundae, e tertiae, g quartae, i quintae lumborum vertebrae.

k. l. m. n Capita, quae tendineo principio oriuntur à superiore parte extremorum processuum transversorum, k secundae, l tertiae, m quartae, n quintae lumborum vertebrae. Dein carnem, in quam vertuntur, adjungunt posteriori parti musculi; ut supremum n, sic reliqua, ante processus transversos.

Adde Fig. 12.

*In Syntaxi*, Tab. VIII.  $\delta$  in lumbis; ubi ex parte subjacet Intertransversariis lumborum  $\Psi$ .  $\Omega$ .  $\alpha$ .  $\beta$ .  $\gamma$ . Et quod ibi nudum, id testum principio tendineo Transversi abdominis cum superinducto ei communi principio tendineo Obliqui interni abdominis & Serrati postici inferioris, & capite communi Sacrolumbalis & Longissimi dorsi,  $\delta$  & in trunco Tab. VII.

o Ligamentum, quod à processu transversum vertebrae lumborum imae ad os ilium ex transversum deductum.

*In Syntaxi*, Tab. VIII.  $\zeta$  in lumbis.

### FIGURAE XIV.

#### *Psoas parvus.*

a Principium tendineum, quo adhaeret b imo margini corporis vertebrae dorsi imae, à latere; c itemque ligamento, inter corpus illud, corpusque summam lumborum interjecto; d & summo etiam margini summam lumborum.

f Principium tendineum alterum, adhaerens e corporis lumborum summam vertebrae margini imo, f ligamentoque proxime inferiori.

g Tendo, in quem abit; quemque circa mediam lumborum longitudinem inchoat. h hinc se tendo ad Psoam magnum inflectit. i hic lato fine inserit margini ossis coxae, qui summam pelvis oram ante os ilium facit, juxta spinam k, quam margo ille supra foramen magnum habet.

l l Per hanc longitudinem rescissa aponeurosis, quae ab hoc tendine abscedens, Psoam magnum simul cum Iliaco interno à priori parte, qua ante ischion delabuntur, ambit.

*In Syntaxi*, Tab. IV. r s in trunco; ubi à principio post Diaphragma R delitescit: in fine post Psoam magnum t.









# TABULAE ANATOMICAE SEXTAE ET DECIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

## COLLI.

Adde *Cervicalem descendente*, Tab. XV. Fig. 3. A. & Fig. 4. z.

### FIGURAE I.

#### *Splenius colli.*

a b Caput tendineum, quod b oritur à latere extremae spinae vertebrae dorfi nonae.

c d Caput tendineum, quod d oritur à latere extremae spinae vertebrae dorfi decimae: praecedente brevius.

e Venter carneus.

f g h Extremum, quod primum carneum f, dein tendineum g, pertinet h ad extremam posteriorem partem tuberculi posterioris processus transversus vertebrae colli quintae.

i k l Extremum, primum carneum i, dein tendineum k, pertinetque l ad extremi processus transversus vertebrae colli sextae inferiorem partem.

m n o Extremum, quod primum carneum est m, dein tendineum n, pertinetque o ad processus transversus vertebrae colli septimae maxime eminentis mucronis priorem partem.

In *Syntaxi*, Tab. VI. TUV in sinistra parte cervicis & dorfi; ubi majorem partem tectus Serrato postico superiore æ b, & Levatore scapulae Z. Dein T in dextra parte cervicis & dorfi Tab. eadem; ubi pariter tectus Levatore Z, & Serrato postico superiore æ b, & ab inferiore praeterea parte Rhomboideo majore p p q: & quae ibi nuda pars ejus, ea in Tab. V. subjacet Cucullari B in collo & dorso. A latere autem Tab. IX. φ in collo, nudus parte illa; ibi caeterum tectus Cucullari ω, & in fine subjectus Sternocleidomastoideo g.

### FIGURAE II.

#### *Interspinales cervicis, à parte posteriore.*

a b Primus, qui à latere superioris partis spinae colli imae a, juxta ejus tumorem extremum; procedit ad inferiorem & eandem interiorem partem b cornu secundae.

c d Secundus, qui à superiore parte cornu secundae c, procedit ad inferiorem & eandem interiorem tertiae d.

e f Tertius, qui à superiore parte cornu tertiae e, procedit ad inferiorem & eandem interiorem quartae f.

g h Quartus, qui à superiore parte cornu quartae g, procedit ad inferiorem & eandem interiorem quintae h.

i k Quintus, qui à superiore parte cornu quintae i, procedit ad inferiorem & eandem interiorem sextae k.

Adde Fig. 3.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. n. o. p. q. r in colli sinistra parte. Dein in dextra; ubi tres superiores, n. o. p, ex parte subjacent Spinali cervicis 2. Dein Tab. VII. p. q. r. s. t in cervicis; ubi superiores tres, r. s. t, pariter Spinali cervicis o ex parte subjacent; supremus t etiam Biventre cervicis l. Et qua nudi ibi, in Tab. VI. subjacent Splenio capitis P in cervicis: supremus etiam ex parte nudus ab eo, mox infra O; subjacens Cucullari B in collo & dorso Tab. V.

### FIGURAE III.

#### *Interspinales cervicis, à latere.*

a b Primus. b origo à latere superioris partis spinae colli imae, juxta ejus tumorem extremum.

c Secundus. d Tertius. e Quartus. f Quintus. g &c. origo cujusque à superiore parte cornu spinae.

Inferio cerni nequit, quippe pone cornu spinae delitescens.

Adde Fig. 2.

### FIGURAE IV.

#### *Scalenus medius, à parte posteriore.*

a a Origo à costa prima.

b Caput ad eum accedens à superiore parte extremi processus transversus vertebrae colli primae. c alterum à superiore parte extremi tuberculi posterioris processus transversus secundae.

d. e. f. g. h. i. k. l Extrema, inserta processibus transversis vertebrae colli, d primae, e secundae, f tertiae, g quartae, h quintae, i sextae, extremo tendineo; k l septimae, extremo maximam partem tendineo k, partim carneo l.

Adde Fig. 5.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. s &c. in collo; ubi infra tectus Levatore costae primae x: supra, Intertransversario colli posteriore sexto δ. Dein Tab. VII. E in cervicis; ubi praeterea tectus Scaleno postico F G H, Cervicali descendente D cum supremo Longissimi dorfi tendine, Transversali cervicis C, Trachelomastoideo z: & quod nudum, id in Tab. VI. subjacet Levatori scapulae Z in cervicis. A latere autem Tab. IX. x in collo.

## FIGURAE V.

#### *Scalenus medius, à parte priore.*

a Pars tendinea principii, quo oritur b à costa prima, totam tenens costae altitudinem.

c d Cauda prima, d extremo tendineo pertinens ad priorem & eandem inferiorem partem processus transversus vertebrae colli imae.

e f Cauda secunda, f extremo tendineo pertinens ad inferiorem partem extremi tuberculi posterioris, & ad extremum lunatum marginem processus transversus colli secundae.

g h Cauda tertia, h extremo tendineo pertinens ad extremum lunatum marginem tertiae.

i k Cauda quarta, k extremo tendineo pertinens ad extremum lunatum marginem quartae.

l m Cauda quinta, m extremo tendineo pertinens ad extremum lunatum marginem, itemque ad imum tuberculum prius quintae.

n o Cauda sextae, o extremo tendineo pertinens ad priorem partem processus extremi sextae.

p q r Cauda septima, extremo partim carneo p, partim tendineo q, pertinet r ad priorem partem marginis inferioris processus transversus atlantis, circa longitudinem ejus mediam.

Adde Fig. 4.

In *Syntaxi*, Tab. IV. β γ &c. in collo; ubi à principio post claviculam. Dein Tab. III. A B C &c. in collo; ubi à principio pariter post claviculam, & magnam praeterea partem tectus Scaleno priore Π &c. inque fine Recto capitis interno majori Γ. Dein Tab. II. ο ο in collo; tectus Coracohyoideo α juxta claviculam, & Sternocleidomastoideo λ. Et quae nuda sunt in illa Tabula, ea post Latissimum colli Ω &c. in collo Tab. I.

## FIGURAE VI.

#### *Longus colli.*

a Caput tendineum, quo b oritur à media laterali parte corporis decimae dorfi vertebrae.

c Tendinea pars capitis, quo oritur à corpore vertebrae undecimae dorfi. Vide Fig. 7. c.

d Pars, è qua inferior pars musculi, ab externo latere sit, nonnihil oblique in latus procedens, abeunisque in caudam unam e f, partim carneam e, partim tendineam f, desinentemque g ad inferiorem partem tuberculi prioris processus transversus vertebrae colli secundae.

h Pars altera, praecipua musculi, ad corpora vertebrae pertinet.

i k Caput primum eorum, quae ad partem illam praecipuam accedunt à processibus transversis: principio tendineo i oriens à superiore & eadem interiore, id est, corpora vertebrae spectante, parte tuberculi prioris processus transversus secundae colli vertebrae. k pars carnea.

l m Secundum, l principio tendineo oriens à superiore & eadem interiore parte tuberculi prioris tertiae. m pars carnea.

n o Tertium, n principio tendineo oriens ab eadem parte tuberculi quartae. o pars carnea.

p q Quartum, p principio tendineo oriens ab eadem parte tuberculi quintae. q pars carnea.

r Pars tendinea, ad extremum s inserta corpori vertebrae colli sextae.

t Cauda tendinea, u inserta atlantis tuberculi, quod in media priore parte sua habet, parti inferiori.

Adde Fig. 7.

In *Syntaxi*, Tab. IV. t &c. in collo. Dein Tab. III. Δ Θ in collo; ubi partim tectus Recto capitis interno majore Γ; partim post Constrictorem inferiorem pharyngis ω; partim post Sternothyreoideum π delitescit, &c. Quod autem in Tabula illa nudum, id in Tab. II. delitescit post Sternomastoideum η λ in collo.

## FIGURAE VII.

#### *Longi colli capita & caudae.*

a b Caput tendineum, quo a oritur à media laterali parte corporis decimae dorfi vertebrae. b hic truncatum. Est a b Fig. 6.

c d Caput, quod tendineo principio c oritur à media laterali parte corporis undecimae dorfi vertebrae. d pars carnea, truncata.

e f Caput, quod tendineo principio e oritur fere à media laterali parte corporis duodecimae dorfi. f pars carnea, truncata.

g h Caput tendineum, quod g oritur circa mediam lateralem partem corporis primae colli. h hic truncatum.

i k Caput tendineum, quod i oritur circa mediam lateralem partem corporis secundae colli. k hic truncatum.

l m Caput, quod tendineo principio l oritur à principio costae primae. m pars carnea, truncata.

n o Caput, quod tendineo principio n oritur à superiore & eadem interiore,

[D d]



## TABULAE MUSCULORUM SEXTAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

id est, corpus vertebrae spectante parte tuberculi prioris processus transversus vertebrae colli secundae. o pars carnea, truncata. Est i k Fig. 6.

p q Caput, quod tendineo principio p oritur à superiore & eadem interiore, id est, corpus vertebrae spectante parte tuberculi prioris processus transversus vertebrae colli tertiae. q pars carnea, truncata. Est l m Fig. 6.

r s Caput, quod tendineo principio r similiter oritur à tuberculo priore processus transversus quartae. s pars carnea, truncata. Est n o Fig. 6.

t u Caput, quod tendineo principio t pari modo oritur à tuberculo priore processus transversus quintae. u pars carnea, truncata. Est p q Fig. 6.

v w Cauda tendinea, quae inserta v corpori vertebrae colli tertiae, priori parti ejus, à latere, non longe à margine inferiore. w hic truncata.

x y Cauda similis, simili modo x inserta vertebrae quartae. y hic truncata.

z α Cauda, extremo tendineo z inserta corpori vertebrae quintae, ad praecedentium similitudinem. α pars carnea, truncata.

β γ Cauda similis, sed multo insignior, extremo tendineo latiore β inserta circa mediam altitudinem prioris partis corporis vertebrae sextae, à latere. γ pars carnea, truncata.

δ ε Cauda, quae extremo tendineo δ inserta inferiori parti tuberculi atlantis, quod is in media priore parte sua habet. ε pars carnea, una cum tendinea truncata. Est t u Fig. 6.

ζ η θ Cauda, quae ζ inserta inferiori parti tuberculi prioris processus transversus vertebrae colli secundae. Constat è parte carnea η, & tendinea θ; utraque truncata. Est e f g Fig. 6.

ι κ Cauda tendinea, pertinens ι ad priorem partem radices spinae, quae est juxta priorem partem processus transversus primae colli. κ hic truncata.

Adde Fig. 6.

### FIGURAE VIII.

#### Intertransversarii priores colli.

a b Primus, qui ab eminentia vertebrae colli primae, quam illa habet loco radices prioris processus sui transversus, oritur a: insertusque b inferiori eidemque priori parti tum radices tuberculi, tum ipsius tuberculi prioris processus transversus secundae.

c d Secundus, cujus origo à superiore & eadem posteriore parte tuberculi prioris, radicesque processus transversus vertebrae secundae, hic, quod post tuberculum illud delitescit, nequit apparere: confer autem a Fig. decimae. d insertus inferiori eidemque priori parti radices, ipsiusque tuberculi prioris tertiae.

e f Tertius, cujus origo, ut secundi, apparere nequit. f insertus vertebrae quartae, ut secundus tertiae.

g h Quartus. Origo pari modo delitescit. f insertus vertebrae quintae, ut secundus tertiae.

i k Quintus. Origo pariter delitescit. i pars tendinea. k k insertus inferiori parti radices processus transversus vertebrae sextae, marginisque prioris illius partis ejus, qua sustinet atlantem; & proximae corporis parti, mox infra marginem modo dictum.

l m n Sextus, qui l oritur à priori parte radices prioris processus transversus vertebrae sextae; m inseritur imo priori margini radices processus transversus septimae. n principii pars tendinea.

Adde Fig. 10.

In Syntaxi, Tab. IV. ζ quartus, o tertius, π secundus, ε primus, in collo; ubi illi ex parte subjacent Scalenii medii caudis μ. λ. ι. η: & primus Longi colli caudae z α pertinenti ad processum transversum vertebrae colli secundae; secundus, tertius, & quartus, ejusdem Longi capitibus, quae oriuntur à processibus transversis vertebrarum colli, x. w. v. Dein Tab. III. primus A in collo; ubi pariter ex parte subjacet Longi colli caudae Θ pertinenti ad processum transversum vertebrae colli secundae; & praeterea Scalenii prioris caudae Φ: reliqui autem tres delitescunt post Rectum capitis internum majorem Γ.

### FIGURAE IX.

#### Intertransversarii posteriores colli.

a b Primus, qui tendineo principio a oritur à parte eadem & superiore & priore processus transversus primae colli vertebrae. b inseritur inferiori & posteriori parti tuberculi posterioris, vicinoque margini extremo lunato secundae.

c d Secundus, qui tendineo principio c oritur à superiore parte tuberculi posterioris processus transversus secundae. d inseritur inferiori & eidem posteriori parti tuberculi posterioris, marginisque lunati tertiae.

e f Tertius, qui tendineo principio e oritur à vertebra tertia, ut secundus à secunda. f insertusque quartae, ut secundus tertiae.

g h Quartus, qui pariter tendineo principio g oritur à quarta, ut secundus à secunda. h insertusque quintae, ut secundus tertiae.

i k Quintus, qui tendineo principio i pariter oritur à quinta, ut secundus à secunda. k inseritur autem inferiori eidemque posteriori parti processus transversus sextae.

l m Sextus, qui tendineo principio l oritur à superiore parte extremi processus transversus sextae. m inseritur septimae processus transversus extremi parti inferiori, juxta partem priorem. Adde Fig. 16. r. & Fig. 18. q r.

In Syntaxi, Tab. IV. jacent post Intertransversarios priores ζ. o. π. ε in collo, & Scalenii medii caudas μ. λ. ι. η. A posteriore parte, Tab. VIII. δ. ε. ζ. η. θ. ι in collo; ubi sextus δ ex parte post Obliquum capitis inferiorem k.

n. n Hic truncata tubercula priora harum vertebrarum, ut Intertransversarii integri appareant.

### FIGURAE X.

#### Intertransversarius prior quartus colli.

Hic separatim à latere exhibitus, ut origo ejus cerni posset. Ad cujus exemplum secundus, tertius, & quintus oriuntur.

a Origo à superiore & eadem posteriore parte tuberculi prioris, radicesque processus transversus vertebrae colli quartae.

Adde Fig. 8.

### FIGURAE XI.

#### Scalenus prior.

a Principium tendineum, quo oritur à summo margine costae primae, non longe ab ejus cartilagine.

b c Cauda prima, eaque latior, c extremo tendineo inserta inferiori parti tuberculi prioris processus transversus vertebrae colli secundae: continuoque imo lunato margini.

d e Cauda secunda, eaque quam prima angustior; e extremo tendineo inserta processui transversus vertebrae colli tertiae, ut prima secundae.

f g Cauda tertia, eaque secundà angustior; g extremo tendineo inserta imo lunato margini, & proximae parti tuberculi prioris processus transversus vertebrae colli quartae.

In Syntaxi, Tab. III. Π Σ &c. in collo; ubi infra post clavicularum: caudae in fine subjectae Recto interno majori capitis Γ, Longique colli extremo Θ ad processum transversum vertebrae colli secundae pertinenti. Dein Tab. II. ε in pectore; ubi caeterum post clavicularum, Coracohyoideum α in collo, Sternocleidomastoideum η λ. Et quae pars in Tabula illa nuda, ea Tab. I. post Pectoralem ζ in trunco.

### FIGURAE XII.

#### Scalenus posticus.

a a Principium tendinosum, quo oritur ab exteriori parte marginis superioris costae secundae, inter illam partem, qua processui transversus inhaeret; illamque, qua se in priora curvatura est.

b c Cauda prima, extremo tendineo c inserta extremo tuberculo posteriori processus transversus vertebrae colli secundae.

d e Cauda secunda, extremo tendineo e inserta extremo tuberculo posteriori processus transversus vertebrae colli tertiae.

In Syntaxi, Tab. VII. F G H in cervice & trunco; ubi in fine subjacet Cervicali descendenti D, & Transversali cervice C C. Reliquum autem in Tab. VI. tegit Levator scapulae Z in cervice.

### FIGURAE XIII.

#### Levator scapulae, à parte priore.

a a Principium tendinosum, quo oritur ab ora, quam scapula mox supra primum initium spinae suae habet.

b Pars interior, c exterior.

d e Cauda prima, extremo tendineo e inserta extremo cornu posteriori processus transversus vertebrae colli quartae.

f g Cauda secunda, extremo tendineo g inserta extremo cornu posteriori processus transversus quintae.

h i Cauda tertia, extremo tendineo i inserta inferiori & priori parti extremi processus transversus sextae.

k l Cauda quarta, quae reliquis crassior, extremo tendineo l inserta priori eidemque inferiori parti processus transversus septimae, inter processus illius radicem extremumque.

Quo quaeque cauda superior, eo longior.

Adde Fig. 14.

In Syntaxi, Tab. II. π in collo; ubi caeterum post clavicularum, Coracohyoideum α supra clavicularum, Sternocleidomastoideum λ. In Tab. I. post Cucullarem Ψ in collo & trunco.

### FIGURAE XIV.

#### Levator scapulae, à parte posteriore.

a Principium tendinosum, quo oritur ab ora scapulae, quam illa habet mox supra primum spinae suae initium.

b Pars interior caudae quartae, ad postremum tendinea.

Adde Fig. 13.

In Syntaxi, Tab. VI. Z in cervice; ubi extremo delitescit post Splenium capitis P. Dein Tab. V. A in collo; caeterum tectus ibi Cucullari B, & Sternocleidomastoideo u: & ibi delitescens quoque post Splenium capitis z. Dein à latere, Tab. IX. Ψ in collo; ubi similiter Cucullari α caeterum subjacet, & Sternocleidomastoideo g.

### FIGURAE XV.

#### Spinalis cervicis.

a b Caput tendineum primum, b oriens à posteriore eademque superiore parte processus transversus vertebrae dorfi septimae, ad tuberis, in quod definit, radicem.

c d Secundum, e f tertium, g h quartum, i k quintum, l m sextum: quae eodem modo oriuntur à vertebra d octava, f nona, h decima, k undecima, m duodecima.

Quo quodque superius, eo brevius.

n. o. p. q. r. Extrema, quae se inferunt lateri imi marginis extremae spinae, n vertebrae colli secundae, o tertiae, p quartae, q quintae, r sextae. Et quod sextae insertum, id crassum. Aliaque aliis incumbunt: quo fit, ut non nisi supremum cerni integre hic queat.

In Syntaxi, Tab. VIII. 2 &c. in dorso & cervice. Dein Tab. VII. o o in cervice & trunco; ubi praeterea tectus Biventre cervicis l i &c. & Complexo u, & Longissimo dorfi Ψ Σ. Dein Tab. VI. ubi non distinctus à Semispinali dorfi z in dorso: caeterum subjectus Splenio colli T, & capitis P, in cervice; & Serrato postico superiori α b in dorso: & qua in sinistro latere cum Semispinali dorfi nudus z, in dextro subjacet Rhomboideo majori p q in dorso.

### FIGURAE



# TABULAE MUSCULORUM SEX TAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

## FIGURAE XVI.

### *Transversalis cervicis, à parte posteriore.*

a b Tendo primus, quo oritur b à superiore & eadem posteriore parte processus transversus vertebrae dorso septimae, juxta ejus extremum.  
c d e f Pars musculi exterior. d tendo, qui d Fig. 18: e tendo, qui f Fig. 18: f tendo, qui k Fig. 18.  
g h i k l m n o p Pars musculi interior.  
g h i Caput, tendineo principio g oriens h à posteriore parte processus obliqui adscendentis vertebrae colli primae, ad latus externum obliqui descendens secundae. i caro, in quam abit.  
k l m Caput, tendineo principio k oriens l à posteriore parte processus obliqui adscendentis vertebrae colli secundae, ad latus externum obliqui descendens tertiae. m caro, in quam abit.  
n o p Caput, tendineo principio n oriens o à posteriore parte processus obliqui adscendentis vertebrae colli tertiae, ad latus externum obliqui descendens quartae. p caro, in quam abit.  
q Extremum tendineum, quod cum Intertransversario cervicis sexto posteriore r conjunctum, pertinet ad partem inferiorem & eandem priorem processus transversus atlantis.  
Adde Fig. 17. & 18.  
*In Syntaxi.* Tab. VII. CC in cervice; ubi praeterea Longissimo dorso Ψ subjacet, & Cervicali descendenti D, & Trachelomastoideo z. Dein Tab. VI. Y in cervice; ubi etiam Serrato postico superiori æ b subjacet, & Levatori scapulae Z, & Longissimo dorso X: supra quoque delitescit sub Splenio colli T, & capitis P. Et quod in Tabula illa VI. nudum, id in Tab. V. subjacet Cucullari, B in collo & dorso.  
r Intertransversarius cervicis sextus posterior.  
Adde Fig. 18. p q r. & Fig. 9. l m.

## FIGURAE XVII.

### *Transversalis cervicis capita prima quinque.*

a b Caput primum tendineum, a oriens à superiore & eadem posteriore parte processus transversus vertebrae dorso octavae, juxta ejus extremum. b hic truncatum. Est a b Fig. 16.  
c Caput secundum tendineum, eodem modo oriens à vertebra nona.  
d e Tertium, à decima, d principio tendineo, dein in carnem e abeunte.  
f g Quartum, ab undecima, f principio tendineo, in carnem g abeunte.  
h i Quintum, à duodecima, h principio pariter tendineo, inque carnem i abeunte.  
Omnia truncata, ut primum. Subjacent musculo in Fig. 16.  
Adde Fig. 16. & 18.

## FIGURAE XVIII.

### *Transversalis cervicis, à latere.*

a Pars haec inferior ex Figura 16. petenda.  
b c Tendo primus, insertus c parti inferiori & eidem posteriori cornu posterioris extremi processus transversus vertebrae colli secundae.  
d e Tendo secundus, insertus e vertebrae tertiae, ut primus secundae.  
f g Tendo tertius, insertus g vertebrae quartae, ut primus secundae.  
h i Tendo quartus, insertus i vertebrae quintae, ut primus secundae.  
k l Tendo quintus, insertus l inferiori eidemque posteriori parti extremi processus transversus sextae.  
Hi tendines per ventrem ab exteriori parte decurrunt, eisque fere ad finem usque caro inhaeret.  
m Extremum, quod se cum Intertransversario cervicis sexto posteriore conjungit n, cum eoque extremo tendineo o inserit parti inferiori & eidem priori processus transversus atlantis.  
Adde Fig. 16. & 17.  
p Intertransversarii cervicis sexti posterioris principium, à superiore parte extremi processus transversus sextae colli vertebrae oriens.  
q r Intertransversarii cervicis sexti posterioris pars posterior, cum qua conjunctum extremum Transversalis. r extremum tendineum.  
Adde Fig. 16. r. & Fig. 9. l m.

## CAPITIS & COLLI.

## FIGURAE XIX.

### *Rectus internus major capitis.*

a Caput primum, oriens à priore & eadem superiore parte tuberculi prioris processus transversus vertebrae colli secundae.  
b Pars tendinosa, qua caro tecta.  
c c Extremum insertum imo margini ossis occipitis, qui respicit petrosus, fere ab illo hiatus, quo exit capitis nervus octavus, ad os multiforme fere usque.  
d Pars ossis occipitis, quae est ante foramen ejus magnum.  
e Lunula ossis occipitis, quae pertinet ad hiatus, quo exit vena jugularis interna & nervus octavus capitis.  
Adde Fig. 20.  
*In Syntaxi.* Tab. III. Γ in collo. Dein Tab. II. ξ in collo; ubi partim post Sternomastoideum η λ. In Tab. I. ob superinductum collo Latissimum colli Ω, non apparet pars ejus, quae in Tab. II.

## FIGURAE XX.

### *Recti interni capitis majoris capita.*

a b Caput primum, totum carneum, oriens à priore & eadem superiore par-

te tuberculi prioris processus transversus vertebrae colli secundae: b hic truncatum. Est a Fig. 19.

c d Caput secundum, principio tendineo c oriens à vertebra tertia, ut primum à secunda. d pars carnea, una cum tendinea truncata.  
e f Caput tertium, principio tendineo e oriens à vertebra quarta, ut primum à secunda. f pars carnea, una cum tendinea truncata.  
g h Caput quartum, principio tendineo g oriens à vertebra quinta, ut primum à secunda. h pars carnea, truncata.  
Caput secundum, tertium, & quartum, subjacent ventri, in posteriora ejus adscendentia.

Adde Fig. 19.

## FIGURAE XXI.

### *Trachelomastoideus, à latere.*

a b Capitis primi principium tendineum, b oriens à processu transversus vertebrae dorso decimae.  
c d Capitis secundi principium tendineum, d oriens à processu transversus vertebrae dorso undecimae.  
e f Capitis tertii principium tendineum, f oriens à processu transversus vertebrae dorso duodecimae.  
g h Capitis quarti principium tendineum, h oriens à posteriore & eadem superiore parte processus transversus vertebrae primae colli, juxta obliquum adscendentem.  
i k Capitis quinti principium tendineum, k oriens à processu obliquo adscendente vertebrae colli secundae; ab exteriori & eadem posteriore parte radices processus illius, inde usque ab initio transversus.  
l m Capitis sexti principium tendineum, m oriens ab obliquo adscendente tertiae, ut quintum à secundae.  
n o Capitis septimi principium tendineum, o oriens ab obliquo adscendente quartae, ut quintum à secundae.  
Quinti, sexti, & septimi capitis origo à processibus obliquis descendentibus cerni nequit, petenda ex Fig. 22.  
p Plaga tendinea. Vide Fig. 22. n.  
q Extremum tendineum, r r insertum posteriori margini processus mammillaris.  
Adde Fig. 22.

## FIGURAE XXII.

### *Trachelomastoideus, à parte posteriore.*

a b Capitis primi principium tendineum, b oriens à posteriore & eadem superiore parte processus transversus fere extremi vertebrae dorso decimae.  
c d Capitis secundi principium tendineum, d oriens à vertebra undecima dorso, ut primum à decima.  
e f Capitis tertii principium tendineum, simili modo f oriens à vertebra duodecima dorso.  
Juxta g capitis quinti principium tendineum, oriens à posteriore parte marginis lateralis externi processus oblique descendens vertebrae colli tertiae: & infra eum ab obliquo adscendente secundae.  
Juxta h i capitis sexti principium tendineum, oriens h à posteriore parte marginis lateralis externi processus oblique descendens vertebrae colli quartae: & infra eum i ab obliquo adscendente tertiae.  
k l m Capitis septimi principium tendineum, oriens l à posteriore parte marginis lateralis externi processus oblique descendens vertebrae colli quintae: & infra eum m ab obliquo adscendente quartae.  
n Plaga tendinea.  
o Extremum tendineum, p insertum posteriori margini processus mammillaris.  
Adde Fig. 21.

*In Syntaxi.* Tab. VII. z & c. in cervice; ubi & tectus portione Longissimi dorso Ψ, & Transversali cervicis C. Dein Tab. VI. W in cervice; ubi praeterea Serrato postico superiori æ b subjacet, & Levatori scapulae Z, & Longissimi dorso portioni X, & Splenio colli T, & Splenio capitis P: & quod nudum ibi, id in Tab. V. subjacet Cucullari, B in cervice & dorso. A priori parte, Tab. III. E in collo; ubi post Scalenum medium E, & Complexum E. Et qua nudus ibi, subjacet in Tab. II. Sternomastoideo λ in collo, & Biventre maxillae y.

## FIGURAE XXIII.

### *Biventer cervicis cum Complexo, à parte posteriore.*

a b c d e f g h i k l m n o p p Biventer cervicis.  
a b Capitis primi principium tendineum, b oriens à posteriore & eadem superiore parte tuberis, in quod desinit processus transversus vertebrae dorso sextae.  
c d Capitis secundi principium tendineum, simili modo d oriens à vertebra septima.  
e f Capitis tertii principium, simili modo f oriens ab octava.  
g h Capitis quarti principium, simili modo h oriens à nona.  
i k Capitis quinti principium, simili modo oriens k à decima.  
l Portio, five caput, ad Biventrem accedens, oriens à latere spinae vertebrae dorso duodecimae. Accedit ad tendinem medium, ventremque.  
m Tendo medius inter ventres.  
n Plaga tendinea ventres secundi.  
o Extremum tendineum extrinsecus, p p insertum ossis occipitis parti posteriori, ad latus mediae, aliquanto inferius, quam ubi Cucullaris incipit.  
Adde Fig. 24. a b c d e f g g.  
*In Syntaxi.* Tab. VII. f--n in cervice & trunco; ubi infra tectus Longissimo dorso Ψ, & Transversali cervicis. Dein Tab. VI. M N in cervice, & y in dorso; ubi tectus Splenio capitis P, & colli T U V, & Serrato postico superiori æ b: & quae ibi in sinistro latere ab inferiore parte nuda pars y, ea in dextro [E e]



## TABULAE MUSCULORUM SEXTAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

latere Rhomboideo majore p p q testā. Dein Tab. V. y in cervice; ubi caeterum testum Splenio capitis z, & Cucullari C, & Sternocleidomastoideo x.

q r s t u v w x *Complexus.*

q r Capitis primi principium tendineum, r oriens à posteriore & eadem superiore parte processus transversī fere extremi vertebrae dorſi decimae.

s t Capitis secundi principium tendineum, t oriens simili modo à vertebra undecima.

u v Capitis tertii principium tendineum, v oriens simili modo à duodecima.

w Plaga tendinea.

x Hic Biventrem fubit, cum eo se conjungens, inferensque.

Adde Fig. 24. h--x.

*In Syntaxi*, Tab. VII. u v in cervice & trunco; ubi, ut hic, magnam partem subjacet Biventri f--n, & Trachelomastoideo z A, cum Transversali cervicis; & Longissimo dorſi Ψ. Et qua parte nudus illa in Tabula est, ea subjacet Splenio capitis P, & colli T, in cervice Tab. VI. A priori parte, Tab. III. E in collo; ubi testus Obliquo superiore capitis Æ; & qua nudus ibi, sequitur in Tab. II. post Biventrem maxillae y in collo.

### FIGURAE XXIV.

*Biventer cervicis cum Complexo, à latere.*

a b c d e f g g *Biventer cervicis.*

a Pars inferior, ex Fig. 23. petenda.

b c Portio, five caput, ad Biventrem accedens, oriens c à latere spinæ vertebrae dorſi duodecimae, non longe à spinæ illius mucrone.

d Tendo medius inter ventres.

e Plaga tendinea ventris secundi.

f Extremum, quod extrinsecus tendineum, g g infertumque ossis occipitis parti posteriori, ad latus mediae, aliquanto inferius, quam ubi Cucullaris incipit.

Adde Fig. 23. a--p.

*In Syntaxi*, Tab. IX. τ in capite & collo; ubi testus Splenio capitis υ, & colli φ, & Cucullari Γ ω, & Sternocleidomastoideo g σ.

h i k l m n o p q r s t u v w x x *Complexus.*

h i Capitis primi principium tendineum, i oriens à posteriore & eadem superiore parte processus transversī fere extremi vertebrae dorſi decimae.

k l Capitis secundi principium tendineum, l oriens simili modo à vertebra undecima.

m n Capitis tertii principium tendineum, n oriens simili modo à duodecima.

o p Capitis quarti principium tendineum, p oriens à posteriore & eadem superiore parte processus transversī vertebrae colli primae, juxta obliquum adscendentem.

q r Capitis quinti principium tendineum, r oriens ab exteriori & eadem posteriore parte radicis processus obliqui adscendentis vertebrae colli secundae, inde usque à radice transversī.

s t Capitis sexti principium tendineum, t oriens simili modo ab obliquo adscendente tertiae.

u v Capitis septimi principium tendineum, v oriens eodem modo ab obliquo adscendente quartae.

Quinti, sexti, & septimi capitis origo à processuum obliquorum descendantium tertiae, quartae, quintae vertebrae, margine laterali externo, cerni in figura ab hac parte nequit.

w Plaga tendinea ventris.

x x Hic Biventrem fubit, ac post cum eo se conjungit, inferitque, mox infra eum.

Adde Fig. 23. q--x.

### FIGURAE XXV.

*Sternomastoideus cum Cleidomastoideo, à parte priore.*

a *Sternomastoideus.*

b Principium tendineum, quo c c oritur ab ossis pectoris parte priore & eadem superiore, non longe à capite claviculae.

d Extremum tendineum, infertum e e exteriori parti processus mammillaris, ab imo ad summum, fere per amplitudinem ejus mediam.

f *Cleidomastoideus.*

g g Ortus ejus à superiore & eadem priore claviculae parte, juxta caput ejus, quo ossi pectoris innixa.

h Hinc conjungit se cum Sternomastoideo; cui caeterum subiectus.

Adde Fig. 26.

*In Syntaxi*, Tab. II. πδixλν in collo. Dein Tab. I. Φμ in collo; ubi caeterum testis Latissimo colli Ω, & extremum post auriculam delitescit.

### FIGURAE XXVI.

*Sternomastoideus, cum Cleidomastoideo, à parte posteriore.*

a b *Sternomastoidei* pars interior eademque prior. b principium tendineum.

c *Cleidomastoidei* pars interior & eadem prior.

d *Sternomastoidei* & *Cleidomastoidei* inter se conjunctorum pars exterior & eadem posterior.

e Extremum tendineum, incurvo ductu infertum f g exteriori parti processus mammillaris, ab imo ad summum, fere per amplitudinem ejus mediam; continuoque retrorsum vicinae parti mammillari ossis temporis, eique vicinae parti ossis occipitis g h.

Adde Fig. 25.

*In Syntaxi*, Tab. V. &c. u in collo. A latere, Tab. IX. g in collo; ubi ex parte testus Latissimo colli μ.

### FIGURAE XXVII.

*Splenius capitis.*

a Capitis primi principium tendineum, oriens à spina vertebrae dorſi undecimae.

b Capitis secundi principium tendineum, oriens à spina vertebrae dorſi duodecimae.

c Capitis tertii principium tendineum, oriens à primae colli vertebrae spina.

d d Hac parte procedit à ligamento cervicis. Cujus principii haec e pars tendinea.

f Extremum tendinosum, infertum g g posteriori & eidem laterali externae parti processus mammillaris, per ejus longitudinem totam; indeque retrorsum ossi mammillari, ac vicino occipitis h h, fere usque ad locum inter radicem processus mammillaris mediumque occiput medium.

*In Syntaxi*, Tab. VI. P in cervice; ubi infra testus Serrato postico superiore æ b. Dein Tab. V. z in collo, ea parte nudus; caeterum testus Cucullari B, & in fine Sternocleidomastoideo u. Dein à latere, Tab. IX. υ in collo, nudus ea parte; caeterumque testus pariter Cucullari ω, & Sternocleidomastoideo g.









# TABULAE ANATOMICAE SEPTIMAE ET DECIMAE MUSCULORUM HOMINIS E X P L A N A T I O.

## CAPITIS.

### FIGURAE I.

#### *Rectus capitis posticus minor.*

a Origo ab eminentia atlantis, quae spinae loco est: à qua origine extrinsecus tendineus est b.

c c Extremum ossi occipitis insertum; scrobi scilicet, quae inter foramen magnum, finemque Complexi, juxta mediam spinam, à foramine magno in postiora porrectam.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. a & c. in capite & collo; ubi ex parte testus Recto postico majore d: quod vero nudum, id in Tab. VII. subjacet Complexo cum Biventre cervicis, u l in cervice.

### FIGURAE II.

#### *Rectus capitis posticus major.*

a Origo ab illa parte marginis superioris spinae vertebrae colli sextae, quae pars est juxta radicem cornu, & ab ipso etiam cornu.

b b Extremum ossi occipitis insertum, circa medium inter illam partem additamenti futurae lambdiformis, quae fit ab osse occipitis & mammillari; lateralemque partem foraminis magni, quae est pone processum coronoideum; medio loco inter finem Complexi, Obliqui superioris, & Recti postici minoris.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. d & c. in capite & collo; ubi extremo suo fubit Obliquum superiorem g. In Tabula autem VII. delitescit post Complexum cum Biventre cervicis, u l in cervice.

### FIGURAE III.

#### *Obliquus capitis superior.*

a Origo à superiore parte extremi processus transversi atlantis: à qua origine extrinsecus tendineus est b.

c c Extremum ossi occipitis insertum, inter illam partem additamenti futurae lambdiformis, quae fit ab osse occipitis & mammillari; partemque illam, cui insertus Rectus posticus major.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. g & c. in capite & collo. Dein Tab. VII. w x in cervice; ubi caeterum testus Complexo u, & Biventre cervicis l, & Trachelomastoideo z B. Et qua parte nudus ibi, ea Splenio capitis subjacet, P in cervice Tab. VI. A priori parte, Tab. IV. s in capite, & Tab. III. Æ in capite.

### FIGURAE IV.

#### *Obliquus inferior capitis.*

a Origo à superiore parte lateris spinae epistrophaei, per totam spinae longitudinem; magnaque cornu parte; principio tendinoso.

b Extremum, insertum posteriori amplitudini extremi processus transversi atlantis.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. k & c. in collo. Dein Tab. VII. y in cervice; ubi caeterum testus Complexo u, & Trachelomastoideo z B: & qua parte nudus, ea in Tab. VI. delitescit post Splenium capitis P in cervice.

### FIGURAE V.

#### *Rectus lateralis capitis.*

a a Origo à parte priore partis superioris processus transversi atlantis.

b Extremum, extrinsecus tendineum, quo pertinet c ad ossis occipitis superficiem inaequabilem, quae & juxta processum mammillarem est, & juxta posteriorem partem illius marginis ossis occipitis, qui facit posteriorem partem foraminis, quo exit vena jugularis interna.

In *Syntaxi* exhiberi nequivit.

c Ossis occipitis pars, quae est ante foramen magnum.

d Lunatus margo ossis occipitis, qui pertinet ad foramen, quo exit vena jugularis interna.

### FIGURAE VI.

#### *Rectus capitis internus minor.*

a Principium tendinosum, quo b b oritur à priore eademque superiore parte corporis atlantis, juxta radicem processus transversi, & ab ipsa radice.

c Extremum tendinosum, quo se inferit d inferiori eidemque posteriori parti marginis ossis occipitis, qui cum petroso leviter connexus: & quidem tuberculo, quod è margine illo, ante processum coronoideum eminet; juxtaque illud e se etiam immiscet materiei illi quasi cartilagineae, quae implet intervalum imae ossis occipitis & petrosi parti ante fissuram, qua exit nervus capitis octavus, interjectum.

In *Syntaxi* exhiberi nequivit. Partim jacet post Rectum internum majorem Fig. 19. Tab. XVI: partim ab ejus externo latere nudus ab eo.

f Ossis occipitis pars, quae est ante foramen magnum.

g Lunatus margo ossis occipitis, qui pertinet ad foramen, quo exit vena jugularis interna.

## COCYGIS.

### FIGURAE VII.

#### *Coccygeus, à parte posteriore.*

a Principium tendineum, oriens b ab apice processus acuti ischii.

c Principii tendinei pars, quae procedit ab interiore parte processus acuti. Inter a & c principium tendineum se complicat.

Adde Fig. 8.

In *Syntaxi*, Tab. VI. d in inferiore trunci parte, ubi parte quadam post Levatorem ani e. In Tab. V. subjacet Gluteo magno γ in nate.

### FIGURAE VIII.

#### *Coccygeus, à parte priore.*

a Principium tendineum, quo b oritur ab interiore parte apicis processus acuti ischii.

c Extremum tendinosum, quo se inferit interiori parti d marginis ossis sacri juxta coccygem, e coccygis ossis primi, f secundi, g tertii: & continuat se etiam ligamento h, quod intercedit inter os sacrum & coccygis os primum; & i quod inter coccygis os primum & secundum, & k quod inter secundum & tertium.

Adde Fig. 7.

## THORACIS.

### FIGURAE IX.

#### *Intercostalis externus nonus, à posteriore parte.*

Hic solus in exemplum externorum propositus. Adde Tab. VIII. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S in dorso.

a b b Origo ab exteriori & eadem inferiore parte costae nonae, a inde ubi illa ultra processum, cui innixa, procedere incipit.

c c c Insertio, exteriori eidemque superiori parti costae decimae.

Adde Fig. 10.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S in dorso; ubi ex parte testis Levatoribus brevioribus costarum, λ. μ. ν. ξ. ο. π. ρ. σ. τ. υ. & nonus praeterea, decimus, & undecimus, Levatoribus longioribus A. F. G. Dein Tab. VII. N. O. P. Q. R. R. S. S. T. U. V. W in trunco; ubi testis Sacrolumbali ν--Π, cum Cervicali descendente D; praeter primum: & praeterea secundus N, tertius O, & quartus P, testis Levatoribus brevioribus K. L. M: primum autem delitescit post Levatorem brevioribus I, & Scalenum posticum F: ex parte etiam post Longissimum dorsi Φ Σ Ψ delitescunt, quintus, sextus, septimus, octavus. Dein Tab. VI. φ. χ. ψ. ω. Γ. Δ. Δ. Θ. Λ in dorsi parte sinistra; ubi quod eorum in Tab. VII. nudum, majorem partem testum Serrato postico superiore α b, Serrato magno Π--B, & Serrato postico inferiore C--L: respondetque pars dextra, nisi quod quae pars quarti φ, & quinti χ, & sexti ψ, nuda in sinistra, testis sit in hac Rhomboideo majore q; testis & pars septimi ω. Et quae in dextra parte Tab. VI. nuda sunt, ea Latissimus dorsi P in dorso Tab. V. integit.

A priori parte, Tab. IV. ς. ς. τ. υ. φ. χ. ψ. ω. A in trunco: & Tab. III. G. L. M. N. O. P. Q. R. S in trunco. Dein Tab. II. K. K. K. K. K. K in trunco; ubi testis Serrato magno Ψ--G, & antico υ, in pectore; primusque praeterea delitescit post Subclavium σ in pectore. Nudamque primi in Tab. II. partem Pectoralis ξ in trunco Tab. I. integit: caeterorum Obliquus externus abdominis d & c.

Ex interiore parte, Tab. IV. primus ς, secundus ς, tertius τ infra collum, intus in thorace; ubi secundus ς testis Intercostali interno secundo C.

### FIGURAE X.

#### *Intercostalis externus nonus, à latere.*

a a a Origo ab exteriori & eadem inferiore parte costae nonae.

b b b Insertio, exteriori eidemque superiori parti costae decimae. Adde Fig. 9.

### FIGURAE XI.

#### *Intercostalis internus nonus, à latere.*

Hic solus in exemplum internorum propositus.

Adde Fig. 12. & 13.

[F f]



# TABULAE MUSCULORUM SEPTIMAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

## FIGURAE XII.

### *Intercostalis internus nonus, à parte posteriore.*

Solus hic in exemplum internorum propositus. Adde Tab. VIII. T. U. V. W. X. Y. Z. a. æ. b. c in dorso.

Adde Fig. 11. & 13.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. T. U. V. W. X. Y. Z. a. æ. b. c in dorso. In dextro autem latere delitefcunt post externos H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. Sin dorso: praeter partem undecimi c; quae & in Tab. VII. X in trunco, & in Tab. VI. E in dorso, ex parte tecta Obliquo interno abdominis R S; & quae ibi supereft nuda pars, ea tecta Obliquo externo abdominis W in trunco Tab. V. & Latissimo dorfi P.

A priori parte, Tab. IV. B. C. D. E. F. G. H. I. K in finiftra trunci parte Dein in dextra B. C. D; ubi tecti externis 6. 5. 7: plenius autem in Tab. III. T. Y. Z. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k in trunco; tecti externis G. L. M. N. O. P. Q. R. S. Dein Tab. II. L. L. &c. in trunco; ubi pariter tecti externis K. K. &c. itemque fecundus, tertius, & quartus, Serrato antico v in pectore: quintusque etiam, & sexti, & septimi portiones priores separatae, ex parte subjacent Recto abdominis Z &c. Dein quae nuda in Tabula illa funt, in Tab. I. subjacent Pectorali ξ in trunco, & Obliquo externo abdominis d &c.

## FIGURAE XIII.

### *Intercostalis internus nonus, & decimus, à parte interiore.*

a a b b b c c d d d e *Nonus.*

a a Principium tendinosum, quo oritur b b ab inferiore parte partis interioris costae nonae; & à superiore quidem marginē fulci, cui vasa intercostalia infident.

c c Extremum tendinosum, quo se inserit d d d interiori parti marginis superioris costae decimae: & e hac etiam parte, oblique interiori costae amplitudini.

f Noni pars, quae longius descendit, costamque decimam praeterlapfa, ad undecimam pertinet.

g Principium ejus, diu tendineum.

h Extremum tendinosum, i i insertum cum Intercostali decimo, interiori parti marginis superioris costae undecimae.

k l l m n n n *Decimus.*

k Principium tendinosum, quo l l oritur ab inferiore parte partis interioris costae decimae; ut nonus à nona.

m Extremum tendinosum, quo se inserit n n n interiori parti marginis superioris costae undecimae.

Adde Fig. 11. & 12.

In *Syntaxi*, secundus Tab. IV. C C infra collum, intus in thorace. Undecimi, Tab. IV. L L L in trunco; ubi tecti Diaphragmate U Θ Π Π, U Σ Σ Σ Ω. Nonus, Tab. VIII. æ in dorfi parte dextra.

## FIGURAE XIV.

### *Levator brevior costae decimae.*

Hic propositus in reliquorum exemplum. Adde Tab. VIII. x. λ. μ. ν. ξ. ο. π. ρ. σ. τ. υ in dorso.

a a Origo à processu transverso vertebrae dorfi quartae, fere à tota ejus longitudine, ab inferiore parte.

b Principii pars tendinosa.

c c Extremum, insertum superiori margini costae decimae; acutae eminentiae, quae se ex ea erigit, ubi à corporibus vertebrae incipit recedere; ultraque eam, paullo longius, quam ubi costa processui transverso innititur, aut juxta extremum ejus incedit, porrectae scrobi inaequabili: itemque exteriori parti marginis superioris, aliquantum ultra processum eundem.

d Extremi pars tendinosa.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. x. λ. μ. ν. ξ. ο. π. ρ. σ. τ. υ in dorso; ubi, praeter tres primos, tecti Intertransversarii dorfi f. g. h. i. k. l. m. n. o: nonus, decimus, & undecimus, tecti Levatoribus longioribus A. F. G: tres primi tecti Spinali colli 6. 7. 8; itemque quartus, quintus, sextus; septimus autem, octavus, nonus, decimus, Semispinali dorfi t. s. r. q; omnes Multifido. In Tabula autem VII. praeterea superinductus Longissimus dorfi μ Σ Ψ, & Sacrolumbalis ν--Π, cum Cervicali descendente D, in trunco; & superioribus aliquot etiam Transversalis cervicis C C, & Complexus u; primo & secundo Scalenus posticus F: ex parte autem nudus secundus I, tertius K, quartus L, quintus M; iisque partibus in Tab. VI. infidet Serratus posticus superior æ b in dorfi finiftra parte; ubi solius quinti pars nuda φ, quam in dextra parte integit Rhomboideus major q.

A priori parte, primus Tab. IV. σ in collo; ex parte tectus Scaleni medii cauda δ ad processum transversum vertebrae colli primae pertinente. Et Tab. III. E in collo; pariter tectus cauda Scaleni medii c mododicta.

## FIGURAE XV.

### *Levator longior costae decimae.*

In exemplum reliquorum propositus. Adde Tab. VIII. F. G in dorso.

a Origo ab inferiore parte partis posterioris processus transversii vertebrae dorfi quintae.

b Principii pars tendinosa.

c Extremum, insertum posteriori parti marginis superioris costae decimae, juxta brevioris externum latus, ubi se costa jam magis deorsum inclinat.

d Extremi pars tendinosa.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. A. F. G in dorso; ubi ex parte subjacent Intertransversarii dorfi i. h. g. Dein superinductus Longissimus dorfi cum Sacrolumbali μ &c. in trunco Tab. VII.

## FIGURAE XVI.

### *Serratus posticus superior.*

a Pars tendinea, qua incipit, oriturque b b à ligamento cervicis (unde rescifsa) circa tertiam secundamque colli à dorso spinam; c à spina primae colli, d duodecimae dorfi, e undecimae; & in spinarum illarum intervallis f. g cum proximis musculis cohaeret.

h. i. k. l Quatuor extrema, in quae se findit, quaeque inserit costae secundae, tertiae, quartae, quintae, ubi illae primum in priora incipiunt se curvare, ibique secundum superiorem marginem earum, ab exteriori parte.

m Primi extremum tendineum, insertum costae secundae.

n Secundi, insertum tertiae.

o Tertii, insertum quartae.

p Quarti, insertum quintae.

In *Syntaxi*, Tab. VI. æ &c. in cervicis & dorfi latere finifstro; ubi partem tegit Levator scapulae Z, extremisque scapulam subit, Serrato magno subjectus. Dein in latere dextro æ b; ubi pariter partem tegit Levator scapulae Z: caeterum autem tectus Rhomboideo minore m, & majore p p q: quaeque nuda est pars, ea in Tab. V. subjacet Cucullari B in collo & dorso.

## FIGURAE XVII.

### *Serratus posticus inferior.*

a Pars tendinea, quae (cum Latissimo dorfi) oritur à spina dorfi vertebrae tertiae b, secundae c, primae d, lumborum quintae e, quartae f, tertiae g: & in intervallis spinarum illarum h. i. k. l. m cohaeret cum proximis musculis.

n Extremum primum, reliquis latius, insertumque o o costae nonae, exteriori parti marginis ejus inferioris, fere ubi se à dorso per latus in priora curvat.

p Extremum secundum, insertum costae decimae q q. Angustius proximo superiore.

r Extremum tertium, insertum costae undecimae s s. Angustius proximo superiore.

t Extremum quartum, insertum costae duodecimae u u. Rurfus angustius proximo superiore.

Adde Fig. 3. Tab. XIV.

In *Syntaxi*, Tab. VI. C &c. in inferiore trunci parte; ubi principio ejus superinductus latus tendit U, quo Latissimus dorfi incipit. In Tab. V. post Latissimum dorfi P &c. in dorso, totus delitefcit.

## HUMERI, EX SCAPULA ET CLAVICULA CONSTANTIS.

## FIGURAE XVIII.

### *Cucullaris.*

a b b c d e f g Principium tendineum.

a Pars principii amplior, oriens b b c à media crassa ossis occipitis parte, eique finitima laterali.

A c ad e cum pare sui cohaeret, & cum eo.

à c ad d abscedit à ligamento cervicis, unde hic rescifus:

à d ad e oritur à spinis duarum inferiorum colli vertebrae, omniumque dorfi; posteriorem earum partem complectens. In spinarum intervallis cum Cucullari finifstro cohaeret.

f Principii plaga tendinea amplior, juxta imam cervicem, summumque dorsum.

g Plaga tendinea amplior anguli imi.

h Extremi pars tendinea, qua spinae scapulae non longe à basi insertum i. Post continuo.

k k extremo tendinoso insertus i l exteriori parti marginis superioris spinae scapulae, & processus superioris.

m m Caro; cujus fibrae superiores descendunt oblique in priora ad claviculam; inferiores adscendunt ad spinam scapulae; quae à confinio dorfi & cervicis, transversae sunt; quibus quo tum superiores, tum inferiores propiores, eo etiam magis sunt decursu similes.

Adde Fig. 19.

In *Syntaxi*, Tab. V. B &c. in capite, collo, dorso. A latere, Tab. IX. ω &c. in capite, collo, trunco.

## FIGURAE XIX.

### *Cucullaris pars prior.*

a a Inserta parti superiori & eidem posteriori clavicae longitudinis dimidia illius, quae juxta scapulae processum superiorem est.

Adde Fig. 18.

In *Syntaxi*, Tab. I. ψ in collo, ex parte tecta Latissimo colli Ω &c.

## CLAVICULAE.

## FIGURAE XX.

### *Subclavius.*

a Tendo, quo incipit, per inferiorem carnis partem excurrens, b oriensque ab exteriori parte cartilaginei extremi costae primae.

c c Extremum, inferiori parti clavicae insertum, à loco modice à capite ejus primo distante, ad eum usque, ubi incumbit processui coracoideo.

In *Syntaxi*, Tab. II. σ ς ς in pectore; ubi pars pone processum coracoideum delitefcit. In Tab. I. subjacet Pectorali ξ in trunco, & Deltoidi M in humero: interque eos delitefcit post Latissimum colli θ α in trunco. A posteriore parte, Tab. VI. θ circa humerum.

## SCAPULAE



# TABULAE MUSCULORUM SEPTIMAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

## SCAPULAE.

### FIGURAE XXI.

#### *Serratus magnus.*

a Caput primum, quod b oritur ab exteriori & eadem inferiore parte costae primae, & à principio etiam c inhaeret Intercoftali externo primo.

d Caput secundum, quod e oritur à tota altitudine costae secundae, & à principio etiam f inhaeret Intercoftali externo primo.

g Caput primum & secundum conjuncta in unum, ex quo nata pars crassior est, extremo tendinoso inserta h praecipue interiori parti orae scapulae brevissimae, mediae inter basem oramque superiorem.

i Caput tertium, k k k oriens ab exteriori parte marginis inferioris costae secundae. Latefcit ad effigiem trianguli, lll pertingitque ad majorem partem basis scapulae, ad interiorem partem ejus.

m Caput quartum, quod n n oritur ab exteriori parte costae tertiae, & à principio etiam inhaeret o o Intercoftali externo tertio. p extremo suo, eoque tendinoso, pertinet ad basem scapulae, infra caput tertium.

q Caput quintum, quod oritur r r ab exteriori parte costae quartae, tendinosoque extremo s inseritur scapulae angulo inferiori, mox infra caput quartum.

t Caput sextum, u u inhaerens à principio Intercoftali externo quarto, & v oriens ab exteriori parte costae quintae. Insertum w angulo inferiori scapulae, mox infra quintum caput, extremo tendinoso.

x Caput septimum, quod ab initio y y inhaeret Intercoftali externo quinto, z oriturque ab exteriori parte costae sextae. Pertinet A ad imum anguli inferioris scapulae, mox infra caput sextum, extremo tendinoso.

B Caput octavum, ab initio C C inhaerens Intercoftali externo sexto, & D oriens ab exteriori parte costae septimae.

E Caput nonum, ab initio F F inhaerens Intercoftali externo septimo, & G oriens ab exteriori parte costae octavae.

H Caput decimum, ab initio I I inhaerens Intercoftali externo octavo, & K oriens ab exteriori parte costae nonae.

L Communis cauda capitis octavi, noni, & decimi, ad scapulae angulum inferiorem extremo pertinens tendinoso. Cum quo extremo alias etiam conjunctum caput septimum.

MNNO Hinc resecta scapula, ut appareret subjacens ei Serrati pars. Relicta M scapulae ora brevissima, media inter basem & oram superiorem: & N N basis pars: & O angulus inferior.

In *Syntaxi*, Tab. IX. K L M N O P Q in trunco; ubi tectus Serrato antico G, Pectorali H, Latissimo dorfi  $\Omega$ , Obliqui externi abdominis capitibus U. V. W.

A parte priore, Tab. II.  $\Psi$   $\Omega$  A B C D E F G &c. in trunco; ubi & tectus Serrato antico v &c. & delitefcit post Subclavium  $\sigma$  &c. Dein Tab. I.  $\chi$   $\psi$   $\omega$  a b in trunco; ubi tectus Pectorali  $\xi$  in pectore, & Obliqui externi abdominis capitibus e. f. g in trunco, & Latissimo dorfi  $\tau$ .

A parte posteriore, Tab. VI.  $\Pi$   $\Sigma$   $\Phi$   $\Psi$   $\Omega$  A B in latere thoracis, &  $\zeta$  circa humerum; ubi caeterum sub scapula, ejusque interiori parti insidente Subscapula-

ri; proximisque musculis, Terete majore  $\Psi$  in scapula, Rhomboideo majore x in dorso, Levatore scapulae Z in cervice, Coracohyoideo n circa humerum. Et quod nudum illa in Tabula, id in quinta sub Latissimo dorfi P in dorso, & Cucullari B in collo & dorso.

### FIGURAE XXII.

#### *Serratus anticus.*

a b Caput primum, quo oritur c c ab exteriori parte marginis superioris extremae partis osseae costae tertiae, & d à proxima cartilaginis ejus. b pars tendinea tenuis.

e f Caput secundum, quo oritur g g ab exteriori parte costae quartae, ductu obliquo, à superiore ejus parte, juxta cartilagineam ipsius portionem, & à proxima cartilaginea parte ipsa h, deorsum in posteriora inclinato, f pars tendinea tenuis.

i k Caput tertium, quo oritur l ab exteriori parte marginis superioris costae quintae, non longe à cartilaginea ejus portione. k pars tendinea tenuis.

l m Extremum tendineum, quod in margine, qui axillam spectat, citius apparere incipit m. Insertum n superiori & eidem internae parti processus coracoidei scapulae, haud longe à mucrone ejus extremo.

In *Syntaxi*, Tab. II. v &c. in pectore. In Tab. I. subjacet Pectorali  $\xi$  in trunco, & Deltoidi M in humero. A latere, Tab. IX. G in trunco; ubi ob sublatum brachium, ea parte nudatus à Pectorali H.

### FIGURAE XXIII.

#### *Rhomboideus minor.*

a Principium tendineum, quo oritur à ligamento cervicis, juxta spinas trium primarum colli vertebrarum: à quo ligamento rescissum b b.

c c Extremum scapulae insertum, illi parti basis, quae est juxta nascentem spinam, ubi angulum basis cum ora superiore efficit.

In *Syntaxi*, Tab. VI. m in dorso. In Tab. V. subjacet Cucullari B in collo & dorso.

### FIGURAE XXIV.

#### *Rhomboideus major.*

a Principium tendineum, quo oritur à latere extremi mucronis spinae vertebrae colli primae b, dorfi duodecimae c, undecimae d, decimae e, nonae f. Et in intervallis illarum spinarum cum proximis musculis cohaeret, unde hic rescissus g. g. g. g.

h i Hac parte secundum scapulae basem se curvat, non autem inserit. i Inde extremum basi scapulae insertum, usque ad angulum inferiorem k.

In *Syntaxi*, Tab. VI. p &c. in dorso; ubi ex parte sub Rhomboideo minore m. In Tab. V. subjacet Cucullari B in dorso, & Latissimo dorfi P; parva parte nudus L.









# TABULAE ANATOMICAE OCTAVAE ET DECIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

## OSSIS HUMERI.

### FIGURAE I.

#### *Latissimus dorsi, à latere.*

a a Latus tendo, quo incipit.  
b Pars carnea.  
c d Hic latus tendo à Glutei magni principio, cum quo cohaeret, resectus.  
d e Lati tendinis origo ab exteriori margine partis mediae cristae ilium.  
f. g. h Capita, quae ab exteriori costarum parte oriuntur in latere corporis:  
f quod ab undecima. g quod à decima. h quod à nona. Quod à duodecima,  
id subiacet parti illi, quae procedit ab osse ilium: eoque in Figura non apparet.  
i Hic se ad Teretem majorem inflectit.  
k l Pars interior: cujus k pars carnea; l tendo, in quem definit.  
Adde Fig. 2. & 3.  
*In Syntaxi*, Tab. IX. Ω &c. in trunco; ubi à principio Cucullari ω tectus,  
in fine subit brachium.

### FIGURAE II.

#### *Latissimus dorsi, à parte posteriore.*

a a Latus tendo, quo incipit.  
b b Ortus ejus ab extremis spinis vertebrarum dorsi sex inferiorem, spinis  
vertebrarum lumborum, & ossis sacri.  
c d Ortus à processibus obliquis, qui sunt à latere hiatus ossis sacri, in quem  
spinae canalis exit.  
d--e Hac parte cum principio Glutei magni cohaeret, à quo rescissus.  
e--f Ortus ab exteriori margine partis mediae cristae ilium.  
g Pars carnea.  
h Hic se ad Teretem majorem inflectit.  
i k Pars interior: cujus i pars carnea; k tendo, in quem definit.  
Adde Fig. 1. & 3.  
*In Syntaxi*, Tab. V. P &c. in dorso; tectus à principio Cucullari B F, in  
fine subeuns Teretem majorem O.

### FIGURAE III.

#### *Latissimus dorsi, à parte priore.*

a. b Capita, quae à costis oriuntur. a quod à decima. b quod à nona.  
c Pars carnea prior.  
d Pars carnea interior, à dorso veniens: e e hic truncata.  
f Tendo, in quem abit; g g insertus aliquantum infra capitis superioris ossis  
illius tuber inaequabile minus, priori parti eminentiae h h, quae finem ossis  
humeri, per quem descendit tendo Bicipitis brachii, à posteriore parte termi-  
nat; inque ipsum finem excurrans, ubi occurrit Pectoralis tendini, eique se ex  
parte continuat.  
Adde Fig. 1. & 2.  
*In Syntaxi*, Tab. I. τ υ φ in trunco; ubi à superiore parte post Pectoralem ξ  
delitescit. In Tab. II. pars extremi φ in humero, tecta Coracobrachiali & Bi-  
cipite brachii u w y z: quae in Tab. I. tecta Pectorali ξ in trunco, & Deltoide  
M &c. in humero.

### FIGURAE IV.

#### *Pectoralis, à parte priore.*

a a Origo à priori parte fere tota claviculae partis illius, quae ad thoracis spe-  
ciem incurva est.  
b b b Origo à priori margine ossis pectoris, à radice sustentaculi claviculae,  
usque ad eum locum, ubi cartilago costae sextae inserta.  
c ab exteriori parte extremae cartilaginis costae sextae.  
d e ab superiore parte partis exterioris cartilaginis costae septimae fere extre-  
mae; principio aliquandiu tendineo tenui: cujus pars inferior e aut dici potest  
ad Pectoralem, aut ad Obliqui externi abdominis aponeurosem pertinere.  
f f Hac parte cohaeret cum aponeurosi Obliqui externi abdominis; unde  
rescissus.  
g Portio ab aponeurosi Obliqui externi abdominis accedens; quae hic ten-  
dinea. h h hic rescissa ab aponeurosi illa.  
Pars oriens à priore parte totius cartilaginis, & saepe ipsius extremae ossis  
partis, costae quintae, subjacet musculo; quemadmodum & subjacent por-  
tiones, quas accipit à priore parte, & ea ossi pectoris vicina, cartilaginum,  
quibus costae superiores quatuor ad os pectoris pertinent.  
i i Vestigium à Deltoide impressum; cui hac parte subjacet.  
k Tendo, in quem pars superior abit; l l insertus eminentiae ossis humeri  
oblongae m, in parte ejus interiore, aliquantum infra tuber inaequabile ma-  
gnum capitis superioris, per longitudinem jacenti, ac finem, per quem Bicipi-  
tis caput alterum se demittit, à priori parte terminanti. Illi autem parti ejus  
insertus, quae hunc finem spectat.  
Adde Fig. 5.

*In Syntaxi*, Tab. I. ξ in trunco; ubi ex parte velatus Latissimo colli ααα, &  
tectus Deltoide M &c. in humero.  
A latere, Tab. IX. H I in trunco.

### FIGURAE V.

#### *Pectoralis extremum, à parte posteriore.*

a b Partes extremi prioris: quarum a tendinea, b in superficie tendinosa,  
tenuis. Caeterum tectum extremo posteriore.  
c Pars inferior, quae à priori parte veniens, se circum superiorem flectit.  
d d Extremum tendineum posterius, quod à superiore parte decussat extre-  
mum prius, ipsi applicatum, & in fine cum eo connexum.  
e e f Insertio ossi humeri. Vide Fig. 4. l l.  
g g g Os humeri truncatum, excissa, quanta ad extremum Musculi cer-  
nendum necessarium est, parte.  
Adde Fig. 4.

### FIGURAE VI.

#### *Infraspinatus.*

a--b Origo à dorso scapulae, secundum basem. b--c ab inferiore parte spi-  
nae. Caeterum subtus oriri pergit usque ad radicem processum superioris, &  
infra etiam ex illo sinu, qui secundum oram priorem eandemque inferiorem  
porrectus.  
d Tendo, ubi extus primum incipit apparere.  
e f Portiones carnae, quae ad tendinem illum accedunt. e superior, quae  
à spina procedit. f inferior, quae ab angulo inferiore.  
g Extremum tendineum, h insertum superiori & eidem posteriori parti tu-  
beris inaequalis majoris capitis superioris ossis humeri.  
*In Syntaxi*, Tab. VI. μ &c. in scapula; ubi ex parte sub Terete minore τ,  
& extremo suo superiorem scapulae processum aliquantum subit. Dein Tab.  
V. l K in dorso; ubi ex parte & Latissimo dorsi P tectus, & Cucullari B G, &  
Deltoide ζ &c. in humero.  
A latere, Tab. IX. Π in trunco; ubi pariter pars Latissimo dorsi Ω tecta,  
pars Cucullari Ξ, pars Deltoide A &c. in brachio sinistro.

### FIGURAE VII.

#### *Coracobrachialis, à parte priore.*

a a Coracobrachialis.  
b Communis ortus cum capite breviori Bicipitis brachii, à processu cora-  
coideo scapulae.  
c Pars capitis brevioris Bicipitis brachii, extrinsecus tendinosa, & conjun-  
cta cum Coracobrachiali: d d hic resecta.  
e Excursus tendinosus per carnem Coracobrachialis, inde ubi caput breve  
Bicipitis cum eo non amplius cohaeret.  
f Hic divisus est, penetrante nervo.  
g Insertio, posteriori parti amplitudinis interioris ossis humeri, infra mediam  
illius ossis longitudinem.  
Adde Fig. 8.  
*In Syntaxi*, Tab. III. ζ η β &c. in humero; ubi in fine aliquantum tectus Bra-  
chiali interno μ. Dein Tab. II. u in brachio; magnam partem tectus Bicipite  
brachii w x. Dein Tab. I. R S in brachio; ubi pariter tectus Bicipite brachii X,  
& praeterea Pectorali ξ in trunco, & Deltoide M in humero.

### FIGURAE VIII.

#### *Coracobrachialis, à parte posteriore.*

a Tendo, qui hic duobus principiis b. c exoritur.  
d Carnis divisio, per quam nervus penetrat.  
Adde Fig. 7.  
*In Syntaxi*, Tab. VII. ν in brachio; ubi pars subjacet Tereti majori μ, &  
Subscapulari ι, in scapula: pars Brachiali externo ξ ο in brachio: pars ossi hume-  
ri. Et quae pars ibi nuda, ea in Tab. VI. tecta Longo C, & Brevi ω, in hu-  
mero: exigua parte, inter eos & Teretem majorem ψ in scapula, nuda; quam  
in Tab. V. Deltoides integit, ζ &c. in humero.

### FIGURAE IX.

#### *Teres major, à parte priore.*

a Extremum tendineum, b b insertum eminentiae oblongae c c ossis hume-  
ri, quae est aliquantum infra tuber capitis ejus superioris inaequabile minus.  
Adde Fig. 10.  
*In Syntaxi*, Tab. III. z α in scapula; ubi partem Subscapularis v tegit, partem  
Coracobrachialis η ζ in humero. Dein Tab. II. Σ in scapula; ubi pariter tectus  
Subscapulari Δ in scapula, & Coracobrachiali u in brachio; & praeterea extremo  
Latissimi dorsi φ in scapula. Dein Tab. I. σ σ in trunco, ubi tectus Latissimo  
dorsi τ, & delitescit post Pectoralem ξ: in brachio autem dextro, quia pendet,  
[H h]



# TABULAE MUSCULORUM OCTAVAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

ita delitefcit post eos pars illa, quae in finifiro, quia fublatur, nuda; ut nihil cerni ejus queat.

## FIGURAE X.

### *Teres major, à parte posteriore.*

a a Ortus ab exteriori parte anguli inferioris fcapulae, ac finitimae partis orae prioris.

b Extremitas pars tendinofa.

Adde Fig. 9.

In *Syntaxi*, Tab. VII.  $\kappa \lambda \mu$  in fcapula; ubi extremo fuo os humeri fubit. Dein Tab. VI.  $\psi \psi$  circa humerum; ubi pars fubjacet Infrapinato  $\nu \sigma$ , pars Tereti minori  $\tau$ , pars Longo C D in brachio: in brachio finifiro, etiam Brevi A. Dein Tab. V. O in dorfo; ubi pariter pars Infrapinato I fubjacet, & Tereti minori N, & Longo  $\phi$  in humero; & praeterea Latiffimo dorfi P, & Deltoïdi  $\zeta$  in humero.

A latere, Tab. IX.  $\Psi$  in trunco; ubi pars fubjecta Infrapinato II, pars Latiffimo dorfi  $\Omega$ , pars Deltoïdi A &c. in brachio finifiro.

## FIGURAE XI.

### *Deltoïdes, à parte priore.*

a Primi ordinis portionum, è quibus confat, prima, b b principio tendinofa oriens c c à parte priore claviculae, qua pars illa concava eft: & alias quod à mucrone proceffus fuperioris fcapulae.

d Secundi ordinis prior, e principio tendineo, ab initio cum principio tendineo portionum, quibus interfertum, conjuncto, oriens f à mucrone proceffus fuperioris fcapulae, inter ortum portionis a & g.

g Primi ordinis tertia, h principio tendineo, quod ab initio cum principio tendineo portionum, quibus interfertum, conjunctum, oriens i ab extremo proceffus fuperioris fcapulae.

k Secundi ordinis media, quae principio tendineo l, cum proximae portionis g principio tendineo conjuncto in unum, oritur à proceffu fuperiore fcapulae, inter ortum portionis g, & g Fig. 12. Pertinet m ad locum medium inter duo tubera oblonga, quae os humeri ftatim fupra medium longitudinis fuae habet: & cohaeret in fine cum Brachiali interno.

n Extremum tendineum, effectum à portionibus a. d, infertumque o offis humeri tubum modo dictorum prior.

Adde Fig. 12.

In *Syntaxi*, Tab. I. M &c. in humero; ubi à principio velatus Latiffimo colli  $\alpha \alpha$ , in fine teftus Bicipite brachii W in brachio.

## FIGURAE XII.

### *Deltoïdes, à parte posteriore.*

a Primi ordinis portionum, è quibus confat, fecunda eademque posterior, principio tendineo b b, aliquandiu per exteriora excurrente, oriens c c à margine inferiore fpinae, magnaeque partis proceffus fuperioris fcapulae.

d Secundi ordinis portio posterior, e principio tendineo, ab initio cum principio tendineo portionum, quibus interfertum, conjuncto in unum, oriens f à margine inferiore proceffus fuperioris, inter portiones a & g.

g Primi ordinis portio quarta, h principio tendineo, cum principio tendineo portionum, quibus interfertum, conjuncto, oriens i i à cubito flectentis fe proceffus fuperioris.

k Secundi ordinis portio media, quae principio tendineo l, cum proximae portionis g principio tendineo conjuncto in unum, oritur à margine proceffus fuperioris.

m m Extremum tendineum, quod portiones a. d efficiunt, n n infertum posteriori tubum offis humeri oblongorum, quae ftatim fupra medium longitudinis fuae habet: cui fe etiam portio g inferit.

o o Hinc refcifla caro, qua cum Brachiali interno cohaeret.

Adde Fig. 11.

In *Syntaxi*, Tab. V.  $\zeta$  &c. in humero; ubi à principio fubjacet Cucullari G in dorfo, in fine Brevi  $\xi$  in humero.

A latere, Tab. IX. A &c. in brachio finifiro; ubi in fine post Brachialem internum S.

## FIGURAE XIII.

### *Teres minor, à parte posteriore.*

a a Origo, à margine fcapulae eodem & priore & inferiore; & quidem ab ejus exteriori parte tota, ab angulo inferiore fcapulae ad ufque cervicem,

b Tendo, c offi humeri infertus.

d, e Portiones carnae cum tendine infertae: d altera à parte fuperiore, e altera ab inferiore.

Infertus inferiori & eidem posteriori parti tuberis inaequabilis majoris capitis fuperioris offis humeri, finitimaeque inferiori parti cervicis.

Adde Fig. 14.

In *Syntaxi*, Tab. VI.  $\tau$  in fcapula, ubi ab initio ex parte teftus Infrapinato  $\sigma$ , & Terete majore  $\psi$ . Dein Tab. V. N in dorfo; ubi pariter teftus Infrapinato I, & Terete majore O, & praeterea Deltoïde  $\zeta$  in humero.

A latere, Tab. IX.  $\Phi$  in trunco; ubi quoque ex parte ab initio teftus Infrapinato II, & Terete majore  $\Psi$ , dein Deltoïde A &c. in brachio finifiro.

## FIGURAE XIV.

### *Teres minor, à parte priore.*

a a Principii pars tendinofa.

b b Origo à margine fcapulae eodem & priore & inferiore.

Adde Fig. 13.

## FIGURAE XV.

### *Subfcapularis.*

a. b. c. d. e Fasciculorum, è quibus confat, primi ordinis quinque, qui oriuntur ab eminentiis, quae in cava fcapulae parte juxta bafem ejus funt: primus a mox infra angulum fuperiorem: quintus e ad radicem anguli inferioris: tres reliqui b. c. d. medio inter hos loco. f. f. f. f. f principia tendinea.

g. h. i. k. l Fasciculorum, è quibus confat, fecundi ordinis quinque; quorum quatuor inferiores h. i. k. l interjecti primi ordinis quinque; fuperior g fupra eorumdem fuperiorem. m m m m m origo eorum ab interiore parte fcapulae.

Ordo tertius in intervallis fasciculorum fecundi ordinis; fubjectus primo. Et tres hi ordines ortu fuo occupant interiorem amplitudinem fcapulae, à posteriore ejus parte fere ufque cervicem; & prope totam interiorem marginis rotunduli orae prioris ejusdemque inferioris.

n n Extremum commune.

o Tendineum extremum, quod efficit; p p infertum tuberi inaequabili minori capitis fuperioris offis humeri, à fummo ad imum.

q Carnea extremi pars, infra tendineam modo dictam inferta offi humeri infra tuber modo dictum.

r Tuber inaequabile minus capitis fuperioris offis humeri.

In *Syntaxi*, Tab. IV.  $\Phi$  &c. in fcapula. Dein Tab. III. v v &c. in fcapula; ubi ex parte teftus Coracobrachiali cum capite brevior Bicipitis brachii  $\beta$  &c. in humero. Dein Tab. II.  $\Lambda \Pi \Xi$  in fcapula; ubi pariter teftus Coracobrachiali cum capite brevior Bicipitis brachii w in brachio, & praeterea delitefcit post Serratum anticum  $\nu \phi$ , & Subclavium  $\sigma$ , in pectore. Et quod nudum in Tab. II ejus pars in I. tefta Deltoïde M &c. in humero, reliquo delitefcit post Pectoralem  $\xi$  in trunco.

## FIGURAE XVI.

### *Suprapinatus, à parte posteriore.*

a Pars carnea infidens cavo, quod fupra fpinam fcapulae eft.

b b b Prima origo à posteriore parte cavi, quod fupra fpinam eft: inde ufque ad lunulam, quae ad radicem proceffus coracoïdei, oriri pergens.

c Extremum tendineum, d infertum vertici tuberis inaequabilis majoris capitis fuperioris offis humeri.

Adde Fig. 17.

In *Syntaxi*, Tab. VI.  $\tau$  in fcapula. In Tab. V. teftus Cucullari B H H in collo & dorfo.

## FIGURAE XVII.

### *Suprapinatus, à parte priore.*

a Tendo, in quem abit, b infertus vertici tuberis inaequabilis majoris capitis fuperioris offis humeri.

c c Truncatus proceffus coracoïdeus.

Adde Fig. 16.

In *Syntaxi*, Tab. II.  $\tau$  s in brachio; ubi ex parte fub conjunctione fcapulae & claviculae in fummo humero: caeterum ibi post Coracohyoïdeum, qua is de fcapula furgit; & delitefcens post Subclavium  $\sigma$  in pectore. Et quod nudum illa in Tabula, fubjacet id Deltoïdi M &c. in humero Tab. I.









# TABULAE ANATOMICAE NONAE ET DECIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

## CUBITI.

### FIGURAE I.

#### *Brachialis internus.*

a b Bicornis principium, quo ab ossis humeri oritur, ambiens inferiorem partem tuborum, quibus Deltoides insertus. Unde porro oritur ab amplitudine ossis illius, quae infra tubera illa, inde fere usque ad condylos; ad priorem usque.

- c c c Cornu posterioris origo ab ossis humeri.
- d Pars depressior, cui Supinator longus adjacet.
- e Superficies tendinosa extremi.
- f Insertus interiori parti capitis superioris ulnae.

Adde Fig. 2.

In *Syntaxi*, Tab. III. x &c. in humero; ubi in fine subjacet portioni ad Flexorem longum pollicis accedenti  $\Phi$  in cubito. Dein Tab. II.  $\theta$  in brachio; ubi caeterum Bicipiti brachii  $\alpha\beta\gamma$  subjacet, & Sublimi D in cubito. Dein Tab. I.  $\Delta\Delta\Delta$  in brachio; pariter caeterum subiectus Bicipiti brachii  $\gamma\delta\epsilon$ , & praeterea Pronatori tereti  $\Phi$ , & Supinatori longo  $\Pi$ .

### FIGURAE II.

#### *Brachialis internus, à parte exteriori.*

- a Principii cornu prius. b b ortus ejus ab ossis humeri.
- c c Pars depressior, sinuataque; cui Supinator longus insidet.

Adde Fig. 1.

In *Syntaxi*, Tab. VII.  $\omega$  A in brachio; ubi ex parte subjacet Radiali externo longiori C C. Dein Tab. VI. P in brachio; ubi pariter tectus Radiali externo longiore R, & praeterea Tricipite brachii  $\omega$  F. Dein Tab. V.  $\psi$  in humero, pariter tectus Tricipite brachii  $\xi\eta$ , & Radiali externo longiore B in cubito, & praeterea Supinatore longo  $\omega$ .

A latere, Tab. IX. S in brachio sinistro,  $\zeta$  in dextro.

### FIGURAE III.

#### *Biceps brachii.*

a b c Caput brevius. a principium extrinsecus tendinosum, b oriens à superiore parte extremi processus coracoidei scapulae. c venter.

d e f g Caput longius. d e f tendo, quo incipit: d oriens à parte eadem & superiore & exteriori marginis finis illius scapulae, cum quo caput humeri commissum; ubi & continuus tendo ille ligamento, quo augetur ora finis. Inde decurrit d--e supra caput ossis humeri: & deinde e--f per finem, qui est inter capitis illius duo tubera inaequalia. g venter.

h Venter communis.

i Tendo, quo se radio inserit.

k Aponeurosis, quam dat vaginae tendineae cubiti, l l hic truncata.

Adde Fig. 4.

In *Syntaxi*, Tab. II. w-- $\gamma$  in brachio. Dein Tab. I. W-- $\Gamma$  in brachio; ubi à principio subjacet Pectorali  $\xi$  in pectore, & Deltoidi M &c. in humero; in fine Pronatori tereti  $\Phi$  in brachio dextro.

A posteriore parte, Tab. VI. O in brachio. A latere, Tab. IX. PQR in brachio sinistro,  $\eta\theta$  in dextro.

### FIGURAE IV.

#### *Bicipitis extremus tendo, à parte exteriori.*

Extremus hic tendo, quia manus prona, inflexus ad priorem partem, quae laevis est, tuberculi, quod è radio infra cervicem ejus eminet.

a a Insertus tuberculi mododicti parti posteriori, per longitudinem ejus totam.

Adde Fig. 3.

In *Syntaxi* non conspicuum: sequitur autem post Supinatorem brevem  $\Delta$  in brachio Tab. VI.

### FIGURAE V.

#### *Triceps brachii, à parte interiori.*

a b Caput, quod Longus vocatur. b principium tendinosum.

c d Caput, quod vocatur *Brachialis externus*. d principium tendinosum marginis ejus posterioris, qui e e oritur à margine posteriore ossis humeri, & deinde porro à tendine f f.

f f g g h Tendo quidam eminens, qui ab ossis humeri g g per longitudinem oritur, & ad postremum condylo insertus h.

i Tendo, qui è superficie Brachialis externi ortus, ad humeri condylum posteriorem pertinet k; conjunctus cum tendine f f.

l m Caput, quod Brevis vocatur. m principii pars tendinosa.

n Intervallum inter eum & os humeri, per quod insignis nervus cum arteria & vena procedit.

Adde Fig. 6. & 7.

In *Syntaxi*, Tab. II.  $\delta\epsilon\zeta\eta$  in brachio; ubi ex parte post Coracobrachialem u, Bicipitemque brachii x z  $\alpha$  delitescit: & Longus  $\epsilon$  à superiore parte subit Teretem majorem  $\Sigma$  in scapula, Brevis  $\delta$  tectus Brachiali interno  $\theta$  in brachio. Dein Tab. I. TV $\Delta\Theta$  in brachio; ubi eodem modo post Coracobrachialem R S, & Bicipitem brachii W X Y delitescit: & Longus T subit Teretem majorem  $\sigma$  in trunco, Brevis V tectus Brachiali interno  $\Lambda$ . Separatim autem Brachialis externus Tab. III.  $\theta$  in humero, ex parte tectus Coracobrachiali  $\zeta$ : dein Tab. II.  $\zeta\eta$  in brachio, & Tab. I.  $\Delta\Theta$  in brachio; ut dictum est.

### FIGURAE VI.

#### *Triceps brachii, à parte exteriori.*

a b c c d Caput, quod Brevis vocatur. b pars tendinosa, c c c oriens ab exteriori parte ossis humeri, à radice cervicis caput superius sustentis, per longitudinem humeri; primum leniter incurvo ductu usque ad posteriorem partem finis Deltoidis, dein secundum eum, secundumque posteriorem partem cornu prioris Brachialis interni, ipsiusque deinde Brachialis, usque ad humeri marginem priorem; relictoque in medio longitudinis humeri intervallo, n Fig. 5. rursus deinde aliquandiu secundum marginem eundem. d finis à Deltoidi impressus.

e f g h Caput, quod vocatur Longus. f principium tendinosum, quo g oritur ab imo cervicis scapulae, finitimaeque partis orae, quae infra cervicem est. h finis à Deltoidi impressus.

i Caput, quod vocatur *Brachialis externus*.

k Tendo communis trium horum capitum. In quem hic extrinsecus Brevis jam cito abit, & juxta Longum, quam alibi, citius: eique se Longi fibrae carnae continua per longitudinem serie adjungunt; & inferiore quoque parte extrinsecus l tendinea pars, quam Longus efficit.

m Pars tendinea, quam Brachialis externus efficit, & tendini communi adjungit.

Quomodo autem ab interiori parte Longus tendinem latum à parte Brevis efficiat, & ad eum Brevis fibrae, ut extrinsecus Longi ad Brevem accedant; apparere in Figura nequit.

n Pars tendinea, quae è superficie Brachialis externi oriens, ad condylum humeri majorem pertinet o.

p q Tendo communis insertus praecipue exteriori parti verticis olecrani.

r Tendinis communis mucro tenuior, q s insertus priori parti olecrani, & spinae, quae continuo ab ea ex ulna eminet.

Adde Fig. 5. & 7.

In *Syntaxi*, Tab. VI.  $\omega$  N in brachio; ubi principium Longi D tectum Terete minore  $\tau$  in scapulae. Dein Tab. V.  $\xi$  X E in humero; ubi Longi o & Brevis  $\xi$  principium tectum Deltoidi  $\zeta$  &c.

A latere, Tab. IX. T--X in brachio sinistro,  $\alpha$  in dextro.

### FIGURAE VII.

#### *Tricipitis brachii caput, quod vocatur Brachialis externus, à parte exteriori.*

Quo appareat, rescissus Longus & Brevis cum parte tendinis communis trium capitum; quibus subjacet ab exteriori parte. Et Longi quidem caro rescissa hinc a--b: Brevis cum tendine communi hinc b--c; Brevisque truncata pars extus tendinea est, intus carnea.

d e Brachialis externus; cui vestigium impressum, d hic à Longo, e hic à Brevis.

f f f Ortus ejus ab exteriori parte ossis humeri: summo quidem initio suo juxta inferiorem partem illius, cui Teres major insertus; inde, hoc margine suo priore, obliquo ductu usque ad marginem priorem humeri: post à margine illo usque ad radicem condyli; porroque g ab exteriori parte radice illius, per altitudinem ejus totam.

Et initio suo occupat amplitudinem ossis, quae hoc priore ortus margine, & posteriore e e f f Fig. 5. continetur.

h Pars tendinosa.

i Pars tendinea è superficie Brachialis externi oriens, & ad condylum humeri majorem pertinet k.

l Tendo communis Tricipitis.

m Pars tendinea, quam Longus efficit, & tendini communi adjungit.

Apparet, quomodo Brachialis sua se carne partim jungat carni Brevis & Longi, partim tendinibus eorum, partique interiori communis.

n Pars tendinea, quam Brachialis externus efficit, adjungitque tendini communi.

o o Tendo communis insertus exteriori parti verticis olecrani.

p Hic Brachialis externus ad olecranon cum tendine communi pertingit, portione carnea.

Adde Fig. 5. & 6.

In *Syntaxi*, Tab. VII.  $\xi$   $\psi$  in brachio.



# TABULAE MUSCULORUM NONAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

## FIGURAE VIII.

### *Anconeus.*

a Tendo, quo incipit, b oriturque ab exteriori & eadem inferiore parte condyli minoris humeri.

c c Extremum, insertum priori parti olecrani, statim infra Brachialem externum; porroque margini exteriori ulnae infra modo dictam olecrani partem.

In *Syntaxi*, Tab. VI. Y &c. in brachio. Dein Tab. V. F in cubito; ubi ex parte tectus tendine Tricipitis brachii X, & Ulnari externo W.

## MANUS.

Adde *Bicipitem brachii* Fig. 3. & 4.

## FIGURAE IX.

### *Radialis internus.*

a Principium tendineum, quo b oritur ab extremo condyli posterioris ossis humeri.

Advertendum autem, Radialem internum, Palmarem longum, Ulnarem internum, & Sublimem, communi capite tendineo incipere, & à condylo illo oriri; cum quo capite & Pronatoris teretis principium cohaereat: caputque illud propagines, sepimentorum instar, demittere inter eos, quibus illi propaginibus à principio cohaereant, five potius, quarum partes ad singulos eorum pertineant; quemadmodum in Radiali externo breviori indicatum, Fig. 11. l. Eodem autem, ut illum ibi modo, musculos hos à se invicem secundum fibrarum suarum ductum disjunctos exhibui. Et ex parte quoque à vagina tendinea cubiti oriuntur musculi mododicti, five potius cohaerent cum ea.

c Tendo, in quem abit: qui hac parte d, eaque crassiore, procedit per sinum oblongum, qui est in interna parte ossis multanguli majoris, ad postremum insertus e mediae internae eidemque superiori parti capitis primi metacarpi indicis.

Quomodo tendo intret canalem membranaceum, qui est ad priorem partem ligamenti, quo tendines à cubito ad manum decurrentes ab interiori carpi parte obducti; id vide Tab. I. Ω W in manu dextra. Canalem ipsum, Tab. II. p in manu dextra, & Tab. III. S in manu dextra.

In *Syntaxi*, Tab. I. Ψ Ω in brachio; ubi à principio subjacet Pronatori tereti Φ, & Palmari longo α; dein Supinatori longo Π: in fine tendo penetrat in intimam volae.

A latere, Tab. IX. μ in brachio dextro, c d in sinistro.

## FIGURAE X.

### *Ulnaris internus, à parte interiore.*

a Principium tendineum, b oriens à condylo majore humeri, & cohaerens cum capite tendineo communi muscutorum, qui à condylo illo oriuntur: à quo capite separatim, eo modo, quo in Radiali interno dictum, Fig. 9. Per anteriorem partem musculi excurrit longe c.

d Principium oriens ab olecrano.

e e Pars tenuis & lata, principii mododicti d continuatio quaedam; quae hic ff abscedit à vagina tendinea cubiti g. Nisi potius dicenda est haec pars ab ulna cum vagina illa principio oriri tendineo, stricte cum eadem conjuncto in unum.

h Tendo, in quem abit; i insertus gibbae parti ossis subrotundi carpi, qua parte illud maxime in interiora eminet. Vidi & tendinem hunc, postquam se ossi subrotundo inferuerat, longius procedentem usque ad processum incurvum ossis cuneiformis carpi, eique se inferentem.

Adde Fig. 11. a--h.

In *Syntaxi*, Tab. II. A A B in brachio; ubi ex parte tectus Sublimi C D H, sub eoque etiam Profundo. Dein Tab. I. ν ξ o in brachio; ubi pariter tectus Sublimi ζ &c.

k Ligamentum, quod l ab ossi subrotundo carpi, ad anteriorem & eandem superiorem partem capitis superioris ossis metacarpi manus quarti deductum m.

## FIGURAE XI.

### *Ulnaris internus, & Radialis externus brevior, à parte exteriori.*

a--k *Ulnaris internus.*

a Principium, b oriens à parte eadem & inferiore & posteriore extremi condyli humeri, & cohaerens cum capite tendineo communi muscutorum, qui à condylo illo oriuntur.

c Principium oriens à posteriore margine olecrani, non multum infra finem tendinis Tricipitis brachii.

d d Pars tenuis & lata, principii mododicti c continuatio quaedam, quae hac parte e e à vagina tendinea cubiti abscedit; five potius principio tendineo tenui i, cum vagina illa conjuncto in unum, oritur k k cum ea, ab ulnae spina, quae continuo ab olecrani posteriore parte eminet. Hac parte f g infra ab eadem illa spina oritur.

h Tendo, ossi subrotundo insertus.

Adde Fig. 10.

In *Syntaxi*, Tab. VI. l--q in brachio. Dein Tab. V. R--V in cubito.

A latere, Tab. IX. π ε σ in brachio dextro, Y in sinistro.

l--r *Radialis externus brevior.*

l Ortus à condylo priore ossis humeri, communi cum Extensore digitorum communi, auricularis proprio, Ulnarique externo, capite tendineo. Ita autem musculi illi à principio cohaerent, ut aut dici possint communi tendine ab ossi humeri oriri, qui deinde propagines, sepimentorum instar, iis interferat, à quibus fibrae eorum porro procedant, quorumque cohaereant interventu: aut propagines illae alterutri duorum, quibus interfertae sunt, muscutorum accenseferi, & pro tendinoso principii excursu haberi; à quo alterius fibrae procedant. Quamvis ad singulos potius pars & principii tendinei communis, & sepimenti

pertineat; sed quae partes ita stricte connexae & conjunctae sint inter se, ut commune omnibus tendineum principium, communesque ejus propagines, quibus duo quique inter se proximi conjuncti sint, & referant, & sint. Hic autem Radialem hunc ab Extensore communi digitorum secundum ductum fibrarum disjunctum exhibui, quia, five velimus dicere principium & sepimentum commune habere, five velimus sepimentum accensere alteri, à quo alter procedat; five malimus partem sepimenti pertinere ad utrumque; ultimo tamen à condylo procedit uterque.

m Principium tendineum, à communi capite mododicto separatum. Tendinea pars excurrit diu n n; ubi sinus ab Extensore digitorum communi impleffus.

o Pars interior, eaque tendinosa.

p Tendo, in quem abit; q insertus praecipue priori eidemque exteriori parti radice capitis superioris ossis metacarpi digiti medii; itemque proximo capiti superiori metacarpi indicis.

r Hic procedit tendo per posteriorem partem sinus secundi capitis inferioris radii, qui prior exteriorem: retineturque ligamento armillari exteriori 16 in manu dextra Tab. V. quod & in Tab. IX. ζ in manu sinistra.

Adde Fig. 12.

In *Syntaxi*, Tab. VII. G H I in cubito; ubi ex parte subjacet Radiali externo longiori B E, & Supinatori brevi K. Dein Tab. VI. V W X in brachio; ubi pariter subjacet Radiali externo longiori Q T, & Supinatori brevi Δ; & praeterea Abductori longo pollicis Λ, Extensori minori Ψ, majori α c, & Indicatori f h. Dein Tab. V. H I I I in cubito; pariter subjacet Radiali externo longiori A D, Abductori longo pollicis 21, Extensori minori 24, majori 13; & praeterea Extensori communi digitorum d r.

A latere, Tab. IX. l m m in brachio sinistro.

## FIGURAE XII.

### *Radialis externus brevior, à parte priore.*

a Principium tendineum.

b Tendo, in quem abit; c insertus praecipue priori eidemque exteriori parti radice capitis superioris ossis metacarpi digiti medii; itemque proximo capiti superiori metacarpi indicis.

d Hic procedit per posteriorem partem sinus secundi capitis inferioris radii, qui prior exteriorem: ibique retinetur ligamento armillari exteriori e in brachio sinistro Tab. I.

Adde Fig. 11. l &c.

In *Syntaxi*, Tab. III. φ φ χ χ ψ in cubito sinistro (φ χ in dextro); ubi ex parte subjacet Radiali externo longiori σ--τ (π ε in cubito dextro). Dein Tab. II. σ σ σ σ in cubito sinistro (σ ε in dextro); ubi pari modo subjacet Radiali externo longiori ν ξ o (λ μ in cubito dextro); & praeterea Abductori longo pollicis Z, Extensori minori e, majori g, & Indicatori Ψ in manu sinistra. Dein Tab. I. k k l l l in brachio sinistro, subjacet pariter Radiali externo longiori f g i, Abductori longo pollicis φ, Extensori minori c, majori y in manu; & praeterea Extensoris communis digitorum tendini ad indicem pertinenti o, & Supinatori longo Π Σ in brachio.

## FIGURAE XIII.

### *Radialis externus longior, à parte exteriori.*

a a Ortus à margine priore ossis humeri, continuoque b à condylo priore. c Hac parte se conjungit, communemque ortum habet, cum Extensore communi digitorum manus & Ulnari externo. Vide Tab. V. C in cubito.

d Pars tendinosa principii.

e Tendo, in quem abit; f insertus parti eidem & exteriori & priori radice capitis superioris ossis metacarpi indicis.

æ Tendo hic procedit per priorem partem sinus secundi capitis inferioris radii, qui prior exteriorem: & retinetur ligamento armillari exteriori 16 in manu dextra Tab. V. quod & in Tab. IX. ζ in manu sinistra.

g Pars interior.

Adde Fig. 14.

In *Syntaxi*, Tab. VII. B--F in cubito; ubi pars prior tecta Radiali externo breviori G H. Dein Tab. VI. Q--U in brachio; ubi à principio subjacet Tricipiti brachii L: tendine autem Abductori longo pollicis Λ, Extensori minori Ψ, majori α c: praetereaque etiam pars prior tecta Radiali externo breviori V. Dein Tab. V. A--D in cubito; ubi eodem modo subjacet Tricipiti brachii g in humero, Abductori longo pollicis 21 in cubito, Extensori minori 24, majori 13, Radiali externo breviori H, & praeterea Supinatori longo ω.

A latere Tab. IX. g h i i k in brachio sinistro.

## FIGURAE XIV.

### *Radialis externus longior, à parte priore.*

a Principium tendinosum.

b. c Hic se in duos dividit, quorum b praecipuus.

d Tendo, in quem abit pars praecipua; qui praecipuus & ipse.

e Tendo, in quem abit pars minor; qui se cum altero d conjungit: ex quo fit.

f Tendo communis, g insertus parti eidem & exteriori & priori radice capitis superioris ossis metacarpi indicis.

h Hic procedit tendo per priorem partem sinus secundi capitis inferioris radii, qui prior exteriorem: retineturque ligamento armillari exteriori e in brachio sinistro Tab. I.

Adde Fig. 13.

In *Syntaxi*, Tab. III. σ--υ in cubito sinistro (π ε in dextro); ubi à principio post Brachialem internum ζ. Dein Tab. II. ν--ε in cubito sinistro (λ μ in dextro); ubi eodem modo post Brachialem internum ι, & praeterea tectus Abductore longo pollicis Z (a b d in cubito dextro), & Extensore minore e, & majore g. Dein Tab. I. f g h i in brachio sinistro (g h in dextro); subjacet pariter Abductori longo



# TABULAE MUSCULORUM NONAE ET DECIMAE EXPLANATIO.

longo pollicis  $\Phi$  ( $\chi$  b in brachio dextro), Extensori minori c, majori y, in manu sinistra, & praeterea Supinatori longo  $\Pi$  in brachio.

## FIGURAE XV.

### *Ulnaris externus.*

a Principium tendineum, b oriens ab exteriori parte condyli prioris ossis humeri. Separatum à principio Extensoris communis digitorum manus, & Extensoris proprii auricularis, ut à communi Radialis externus brevior Fig. 11. Coniunctum vide Tab. V. X in cubito.

Pars praeterea tenuis, satisque lata, se circa mediam ulnae longitudinem, infra finem Anconeï, à margine ulnae eodem & priore & exteriori ad hunc musculum demittit.

c Pars vaginae tendineae, quae post integumenta communia complectitur musculos, qui in exteriori cubiti parte siti sunt; cum principio tendineo a orta à condylo b. Ab ea subtus Ulnaris hic oritur, aut fibrarum principia cum ea coniungit.

d d Hic rescissa, mox infra ortum Ulnaris ab ea.

e Tendo, in quem abit. Is hac parte f procedit per finem eundem & priorem & exteriori extremae ulnae: ibique retinetur ligamento 14. 15. 17 in manu dextra Tab. V. quod & in manu sinistra  $\gamma$   $\alpha$ ; & in Tab. IX.  $\zeta$  in manu sinistra.

g Insertus superiori parti eminentiae, quae ad posticam partem capitis superioris ossis metacarpi manus quarti.

In *Syntaxi*, Tab. V. W--Z in cubito; ubi in fine aliquantum subit Abductor digiti auricularis  $\beta$  in manu dextra.

A latere, Tab. IX. n o in brachio sinistro,  $\tau$  in dextro.

## FIGURAE XVI.

### *Supinator longus.*

a b Principium tendinosum, hic interruptum: quo oritur c d d ab inferiore parte marginis prioris ossis humeri, mox supra ortum Radialis externi longioris.

a b e Sinus à Brachiali interno impressus.

f Tendo, in quem abit; g insertus priori parti capitis inferioris radii, ad principium illius finis, per quem se à cubito ad manum demittunt tendines pollicis Abductoris longi, & Extensoris minoris.

In *Syntaxi*, Tab. I.  $\Pi$   $\Sigma$  in brachio; ubi à principio subjacet Brachiali interno  $\Lambda$ , juxta finem Abductoris longo pollicis  $\chi$  b, & Extensori minori c.

A posteriore parte, Tab. V.  $\omega$  in cubito; ubi à principio tectus Tricipite brachii  $\xi$  g in humero, dein Radiali externo longiore A in cubito. A latere, Tab. IX. Z a in brachio sinistro,  $\pi$  in dextro.

## FIGURAE XVII.

### *Supinator brevis, à parte exteriori.*

a Tendo, b oriens à parte inferiore extremi condyli prioris humeri.

c c Pars extrinsecus tendinosa, d--e hac parte, ab initio tota tendinea, oriens ab exteriori parte capsulae articulum radii cum humero & ulna continentis, unde rescissa; e--f hac ab eminentia, quae in priore parte ulnae infra finem ejus, cum quoradii caput commissum, incipiens, deorsum aliquantum exprorecta.

g Extremum radio insertum.

Adde Fig. 18.

In *Syntaxi*, Tab. VIII.  $\Theta$  &c. in brachio. Dein Tab. VII. K &c. in cubito; ex parte tectus Radiali externo brevior G. Dein Tab. VI.  $\Delta$  in brachio; ex parte tectus eodem Radiali V, ex parte Anconeï Y: & quod nudum, id in Tab. V. subjacet Ulnari externo W, Extensori communi digitorum d, & auricularis proprio a b, in cubito.

## FIGURAE XVIII.

### *Supinator brevis, à parte interiori.*

a Tendo, quo incipit.

b Hac parte se inserit juxta superiora eminentiae radii, cui insertus Biceps brachii. Porro autem inserit c c secundum ambitum tuberculi, quod est pro-

xime ante dictam eminentiam; à superiore parte ejus per priorem ad inferiorem. Post d d fere usque ad mediam radii longitudinem, per internam radii partem oblique in priorem, perque hanc in exteriorem: adde g Fig. 17.

e Pars posterior, inter ulnam & radium conspicua.

Adde Fig. 17.

In *Syntaxi*, Tab. IV. b--f in cubito. Dein Tab. III.  $\omega$ -- $\Theta$  in cubito; ex parte tectus Brachiali interno  $\xi$  o, Radiali externo longiore  $\pi$  ( $\sigma$  in brachio sinistro), brevior  $\Phi$ , Pronatore terete  $\Lambda$ , Flexore longo pollicis  $\Pi$   $\Sigma$ , Profundo C. Dein Tab. II.  $\tau$ -- $\Phi$  in cubito; caeterum tectus, ut in Tab. III. Brachiali interno  $\iota$   $\kappa$ , Radiali externo longiore  $\lambda$  ( $\nu$  in brachio sinistro), brevior  $\sigma$ , Pronatore terete  $\Psi$ , Profundo  $\chi$ ; & praeterea tendine Bicipitis brachii  $\gamma$ , & Sublimi G. Dein Tab. I.  $\Xi$  in brachio; caeterum tectus tendine Bicipitis brachii  $\Gamma$ , Brachiali interno  $\Lambda$ , Supinatore longo  $\Pi$ , Pronatore terete  $\Phi$ .

## FIGURAE XIX.

### *Pronator teres, à parte interiori.*

a a Principium, oriens ab interiori & eadem superiore parte condyli posterioris ossis humeri.

b Pars tendinosa extrinsecus.

c Tendo, in quem abit.

Adde Fig. 20.

In *Syntaxi*, Tab. I.  $\Phi$  in brachio; ubi extremum subit Supinatorem longum  $\Pi$ . Post in Tab. II. extremum illud  $\Psi$  in cubito, subit Radialem externum brevior  $\sigma$  s. Sic & in Tab. III. extremum  $\Lambda$  in cubito, subit Radialem eundem  $\Phi$   $\chi$ .

A latere, Tab. IX.  $\lambda$  in brachio dextro, b in sinistro.

## FIGURAE XX.

### *Pronatoris teretis extremum, à parte exteriori.*

a Tendo extremus, b b insertus superficiei inaequabili, quae ejus causa in media gibba parte radii est.

Adde Fig. 19.

In *Syntaxi*, in Tab. VI. subjacet Radiali externo breviori V, & Abductoris longo pollicis  $\Lambda$ , in brachio.

## FIGURAE XXI.

### *Pronator quadratus, à parte interiori.*

a a Superficies tendinosa.

b b Ortus ab oblonga eminentia, quae in interiori & eadem posteriore ulnae parte, non multum supra caput ejus inferius est.

c c Insertio inferiori parti radii, tum amplitudini ejus interiori, tum (quod cerni nequit in figura) margini, qui ex adverso ulnae est.

Adde Fig. 22.

In *Syntaxi*, Tab. IV. g--k in cubito. Dein Tab. III.  $\Xi$   $\Xi$  in cubito; majorem partem tectus Flexore longo pollicis  $\Pi$   $\Sigma$ , & Profundo E F G. Dein Tab. II. Y in cubito; eodem modo tectus Flexore longo pollicis S T, praeterea Abductore longo pollicis a b d, & Ulnari interno A B. Dein eodem modo Tab. I.  $\tau$  in brachio; tectus Flexore longo pollicis  $\pi$ , Abductore pollicis longo  $\chi$   $\omega$  b, & Ulnari interno  $\nu$ .

A parte posteriore, Tab. VIII.  $\Phi$  in brachio dextro. Dein Tab. VII. P in cubito dextro. In Tabula autem VI. subjacet Indicatori f h, Extensori majori pollicis a c, minori  $\Psi$ , Abductoris longo  $\Lambda$ , in brachio.

Adde Tab. VIII.  $\Phi$  in brachio sinistro. Dein Tab. VII. P in cubito sinistro; ubi partem tegit Profundus S T &c. Dein Tab. VI. r in brachio sinistro; ubi tectus Ulnari interno l q. Sic & Tab. V.  $\epsilon$  in extrema parte cubiti finistri; eodem modo tectus Ulnari interno R V.

## FIGURAE XXII.

### *Pronator quadratus, à latere.*


a a Superficies tendinosa.

b b Ortus ab oblonga eminentia, quae in interiori & eadem posteriore ulnae parte, non multum supra caput ejus inferius est.

Adde Fig. 21.









# TABULAE ANATOMICAE VIGESIMAE MUSCULORUM HOMINIS E X P L A N A T I O.

## MANUS DIGITORUM QUATUOR.

### FIGURAE I.

*Extensor communis digitorum manus, cum Extensore proprio auricularis.*

a--z. *Extensor communis digitorum manus.*

b Principium tendineum, c oriens ab extremo condylo priore ossis humeri. Pertinet autem ad caput tendineum commune, de quo in Radiali externo brevior, l Fig. 11. Tab. XIX. Et ut ibi Radialis ille ab hoc Extensore secundum ductum fibrarum suarum separatus, sic hic Extensor una cum Extensore auricularis proprio hic ab altera parte separatus à Radiali illo, ab altera ab Ulnari externo.

d Pars vaginae tendineae, quae post integumenta communia complectitur musculos, qui in exteriori cubiti parte siti sunt; cum principio tendineo b orta à condylo c. Illa autem pars, à qua subius Extensor hic oritur, aut cum qua fibrarum suarum principia conjungit.

e e Hic reliquum ejus rescissum, qua fibrae ab ea non amplius procedunt.

f Portio ad indicem pertinens. g tendo, in quem abit: cui se deinde adjungit Indicatoris tendo V, ex quo fit tendo communis h.

i Tendo ad digitum medium pertinens; in quo tendine incisura k, qua per manum incedit. Portio carnea, quae hunc tendinem producit, subiecta portionibus duabus reliquis f. l.

l Portio ad annularem pertinens. m tendo, in quem abit; in progressu suo per dorsum manus incisuram n habens. o ejus ramus, adjungens se tendini digiti medii; non semper inventus. p ejusdem tendinis ramus, qui se deinde finit in duos: quorum alter q adjungit se tendini s auricularis, non tamen semper inventus: alter r rursus in duos se dividit; alteroque s pariter accedit ad tendinem s auricularis, immo potius ad tendinem q, cum tendine auricularis conjunctum; altero t ad truncum tendinis m n annularis. u portio à tendine n abscedens, accedensque ad tendinem s auricularis; five potius ad tendinem q, cum tendine auricularis conjunctum.

v Portio tendinea, qua truncus tendinis m n ad annularem pertinentis, cum tendine auricularis s conjunctus ad initia digitorum; quae portio fit ex portionibus s & u, & infra hanc aponeurosi w à tendine m n abscedente, confluentibus in unum.

x Portio tendinea, qua truncus tendinis m n ad annularem decurrentis, cum tendine i medii juxta digitorum radices conjunctus. Fitque haec portio ex tendine o confluenta cum aponeurosi y, quae à trunco m n tendinis annularis juxta radicem digiti illius abscedit.

z Aponeurosis, quae à tendine i medii orta, ad tendinem g indicis accedit, eosque juxta digitorum initia connectit inter se.

Apparet, quomodo tendines per sinum tertium capitis inferioris radii, qui est exteriorum posterior, procedant: ubi quomodo ligamento armillari exteriori retineantur, id vide in Tab. V. 16 in manu dextra, & Tab. I. e in brachio sinistro, & Tab. IX. ζ in manu sinistra.

In *Syntaxi*, Tab. V. d &c. in cubito.

Praeterea Tab. I. m n o p q in brachio sinistro. Et Tab. IX. p q r s t in brachio sinistro, manueque: & in manu dextra.

a--ζ *Extensor proprius digiti auricularis.*

β Ejus principium, cum principio Extensoris communis digitorum conjunctum.

γ Pars vaginae cubiti tendineae ejusdem, de qua supra dictum, ad d. A qua subius fibrae hujus musculi procedunt.

δ δ Hinc reliquum ejus rescissum, ubi fibrae ab ea non amplius procedunt.

ε Tendo, in quem abit; ζ qua per dorsum manus decurrit, leviter fissus.

Quomodo retineatur tendo ligamento armillari exteriori, id vide Tab. V. 16 in manu dextra, & Tab. I. e in brachio sinistro, & Tab. IX. ζ in manu sinistra.

In *Syntaxi*, Tab. V. a &c. in cubito.

Praeterea Tab. I. r s in brachio sinistro. Et Tab. VII. 5 in manu sinistra. Et Tab. IX. v w in brachio sinistro, manueque: & in manu dextra.

η.θ.ι.κ Tendines Extensorum, qua per digitos incedunt, conjuncti cum tendinibus & aponeurosibus Interosseorum, Lumbricalium, &c. Quorum η, qui digiti auricularis est, fit ex tendine s Extensoris auricularis proprii, conjuncto cum portionibus q & s. u. w ab Extensore communi accedentibus. θ qui annularis, qui medii; sunt Extensoris communis. κ qui indicis, fit ex tendine Indicatoris V conjuncto cum tendine g ab Extensore communi.

λ.λ.λ.λ Extremaillorum tendinum. μ unumquodque insertum tuberculo oblongo transverso, quod in superiore capite ossis ordinis secundi, à parte externa.

ν. ξ Tendinis indicis conjunctio ν cum tendine Lumbricalis primi: ξ cum tendine Interossei posterioris indicis.

ο. π Tendinis digiti medii conjunctio ο cum tendine, qui Interosseo priori digiti medii communis cum Lumbricali secundo: π cum tendine Interossei posterioris digiti medii.

ε. σ Tendinis digiti annularis conjunctio ε cum tendine, qui Interosseo priori annularis & Lumbricali tertio communis: σ cum tendine Interossei posterioris digiti annularis.

τ. υ Tendinis digiti auricularis conjunctio τ cum tendine, qui Interosseo prio-

ri auricularis & Lumbricali quarto communis: υ cum communi tendine Abductoris Flexorisque parvi digiti auricularis.

φ Tendo Lumbricalis primi, hic truncatus: qui tendo se conjungit ν cum tendine indicis, acceptaque ab eo portione auctus, χ decurrit ad os tertium. Adde q r r s t Fig. 3.

ψ Tendo Interossei posterioris indicis, hic truncatus: qui tendo se conjungit ξ cum tendine indicis, acceptaque ab eo portione auctus, ω decurrit ad os tertium. Vide t &c. Fig. 6.

A Commune extremum, in quod se conjungunt tendines χ. ω, insertum B eminenti mediae exteriori parti capitis superioris ossis tertii.

C Tendo Interosseo priori digiti medii cum Lumbricali secundo communis, hic truncatus: qui tendo se conjungit ο cum tendine digiti medii, acceptaque ab eo portione auctus, D decurrit ad os tertium. Adde v &c. Fig. 9.

E Tendo Interossei posterioris digiti medii, hic truncatus: qui tendo se conjungit π cum tendine digiti medii, acceptaque ab eo portione auctus, F decurrit ad os tertium. Adde m &c. Fig. 9.

G Commune extremum, in quod se conjungunt tendines D & F, insertum H eminenti mediae exteriori parti capitis superioris ossis tertii.

I Tendo Interosseo priori annularis cum Lumbricali tertio communis, hic truncatus: qui tendo se conjungit ε cum tendine annularis, acceptaque ab eo portione auctus, K decurrit ad os tertium. Adde k &c. Fig. 6.

L Tendo Interossei posterioris digiti annularis, hic truncatus: qui tendo se conjungit σ cum tendine annularis, acceptaque ab eo portione auctus, M decurrit ad os tertium. Adde a &c. Fig. 9.

N Commune extremum, in quod se conjungunt tendines K. M, insertum O eminenti mediae exteriori parti capitis superioris ossis tertii.

P Tendo Interosseo priori auricularis cum Lumbricali quarto communis, hic truncatus: qui tendo se conjungit τ cum tendine auricularis, acceptaque ab eo portione auctus, Q decurrit ad os tertium. Adde a &c. Fig. 6.

R Tendo communis Abductoris Flexorisque parvi digiti auricularis, hic truncatus: qui tendo se conjungit υ cum tendine auricularis, acceptaque ab eo portione auctus, S decurrit ad os tertium. Vide Fig. 10. & 11.

T Commune extremum, in quod se conjungunt tendines Q. S, insertum U eminenti mediae exteriori parti capitis superioris ossis tertii.

In *Syntaxi*, Tab. V. γζδεηθικ. xzvξορστυ. wzψωΓΕΠΣΦ. v z 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 in manu dextra. Et Tab. VI. αηθιιλμνξ. βεσςςυφχψ. γεεφγλ m n o. δ ε ρ σ τ v w x y in manu dextra. Et Tab. VII. b f g h i k n o p q. c f u v w z α β γ. d f η θ ι υ ξ ο π. ε f s s τ φ χ ψ ω in manu dextra.

Praeterea Tab. I. KLIMNO.PR.P.Q in manu sinistra. Et Tab. II. 8, 9, 11, 12, 13, 14. 6, 15. 6. 3 in manu sinistra. Et Tab. III. m n r s t u. v y z. w. x in manu sinistra. Dein Tab. V. ψωΓ.Δ.Δ in manu sinistra. Et Tab. VI. λ μ ν. ξ. ξ in manu sinistra. Et Tab. VII. 5, 6, 7, 8. 9. 10 in manu sinistra. Et Tab. VIII. q r. p in manu sinistra. Dein Tab. IX. s s τ υ φ χ. ψ. ω in manu sinistra: & in manu dextra.

De aponeurosibus, quae ad tendines Extensorum accedunt ab Interosseis, Lumbricalibus, &c. vide in Musculis illis.

V Tendo Indicatoris, truncatus. Vide Fig. 12. d.

### FIGURAE II.

*Profundus, à parte exteriori.*

a a Ortus ab ulnae posteriore parte, infra radicem olecrani incipiens.

Adde Fig. 3.

In *Syntaxi*, Tab. VII. R S S in cubito dextro. Dein Tab. VI. i k k in brachio dextro; ubi ex parte tectus Ulnari interno l. Dein Tab. V. K in cubito dextro; ubi pariter ex parte tectus Ulnari interno R, & praeterea post externum W delitescit.

### FIGURAE III.

*Profundus à parte interiore, cum Lumbricalibus.*

a--p *Profundus.*

b b b Ortus ab ulna, infra superficiem inaequabilem, cui affixus Brachialis internus. Infra quam porro ortu suo occupat partem plusquam dimidiam superiorem ulnae amplitudinis internae; oriens etiam à vicina parte ligamenti, quod intercedit ulnam inter radiumque. Et principium ejus hic separatim exhibitum à cohaesione cum Sublimi & Ulnari interno.

c Principii tendinosa pars.

d. e. f Tres tendines ex carne orientes. Quorum primus d abit in tendinem indicis g h. Secundus e in tendinem medii i k. Tertius f in duos l m. n o: quorum alter l m digiti annularis est; alter n o auricularis. Qua tendines illi per volam digitosque decurrunt, per longitudinem quodammodo fissi, & quasi è duobus inter se connexis constructi sunt h. k. m. o: ad postremum p. p. p. p inferti asperae superficiei, quae in interiore parte ossium tertii ordinis, ad radicem capitis eorum superioris.

g. i. l. n Hic tendines se per carpi sinum interiore traiciunt, sub ligamento carpi interiore; quod vide Tab. III. N in manu dextra.

Vaginas, quibus, qua secundum articulos digitorum cum metacarpo in-



# TABULAE MUSCULORUM VIGESIMAE EXPLANATIO.

cedunt, una cum Sublimis tendinibus obducti, vide Tab. I. 4. 4. &c. in manu dextra. Itemque illas, quibus, qua secundum ossa digitorum primi ordinis, una cum iisdem tendinibus obducti, Tab. eadem, 3. &c. in manu dextra. Itemque illas, quibus obducti, qua incedunt secundum ossa ordinis secundi, 5. &c. in manu dextra.

Adde Fig. 2.

In *Syntaxi*, Tab. III. C C &c. in cubito; ubi pars subjacet Flexori longo pollicis Π Φ, tendines K. L ex parte subjecti Abductoris ossis metacarpi manus quarti U, omnes H. I. K. L Lumbricalibus c. g. k. n. Dein Tab. II. χ χ R u x &c. in cubito & manu dextra (χ in cubito sinistro, & tendines in manu); ubi subjacet Sublimi C &c. in cubito, & tendinibus ejus L. I. N. P; tendo ad digitum minimum pertinens, etiam Adductori ossis metacarpi quarti χ in manu, & Flexori parvo digiti minimi τ. Dein Tab. I. σ in brachio, & y z &c. in manu dextra (V &c. in manu sinistra); ubi caeterum subjacet Sublimi ζ ζ &c. in brachio, & Pronatori tereti Φ; tendinibus suis aponeurosi Palmaris longi γ, & Sublimis tendinibus x. &c. in manu.

Praeterea Tab. VII. R--W in cubito sinistro, manue. Et Tab. VI. i in brachio sinistro, & o. o in manu. Et Tab. V. K in cubito sinistro, & ε Π Σ &c. in manu. Et Tab. IX. in digitis manus sinistrae.

q--t *Lumbricalis primus*; r r oriens à crassiore parte duarum illarum, in quas tendo Profundi ad indicem pertinens, per longitudinem fissus quodammodo est. Et ab illa tendinis parte oritur, quae obversa aponeurosi Palmaris longi.

s Tendo, qui se conjungit cum communi tendine Extensorum indicis, & deinde ad indicis os tertium pertinet.

t Aponeurosis, quam conjungit cum aponeurosi Abductoris indicis, unaque cum ea adjungit communi tendini Extensorum indicis.

Adde Fig. 1. φ &c. & Fig. 6. β.

u--y *Lumbricalis secundus*: insigniore parte v v oriens à crassiore parte earum, in quas tendo Profundi ad digitum medium pertinens, per longitudinem fissus quodammodo est; & ab illa quidem partis illius parte, quae obversa aponeurosi Palmaris longi: dein minus insigni w à tendine ad indicem pertinente, tenuiore autem parte ejus; & ab illa quidem praecipue partis hujus parte oritur, quae spectat profunda volae.

x Tendo ejus, qui deinde conjunctus cum tendine Interossei prioris digiti medii, communem cum eo tendinem y efficit, conjungentem se cum tendine Extensoris communis, & ad os tertium digiti medii pertinentem.

Adde Fig. 8. e, & Fig. 1. C.

z--δ *Lumbricalis tertius*: ad similitudinem secundi insigniore parte α α oriens à crassiore parte earum, in quas tendo Profundi ad digitum annularem pertinens, per longitudinem fissus quodammodo est: & minus insigni β à tendine ad digitum medium pertinente, tenuiore autem parte ejus.

γ Tendo ejus, qui deinde conjunctus cum tendine Interossei prioris digiti annularis, communem cum eo tendinem δ efficit, conjungentem se cum tendine Extensoris communis, & ad os tertium digiti annularis pertinentem.

Adde Fig. 7. l, & Fig. 1. I.

ε--ι *Lumbricalis quartus*: ad similitudinem secundi insigniore parte ζ ζ oriens à crassiore parte earum, in quas tendo Profundi ad digitum auricularem pertinens, per longitudinem fissus quodammodo est: & minus insigni η à tenuiore parte tendinis ad annularem pertinentis.

θ Tendo ejus, qui deinde conjunctus cum tendine Interossei prioris digiti auricularis, communem cum eo tendinem ι efficit, conjungentem se cum tendine Extensoris auricularis, & ad os tertium digiti illius pertinentem.

Adde Fig. 7. q, & Fig. 1. P.

In *Syntaxi*, Tab. III. c f e. g w. k s. n p in manu dextra; ubi quartus ex parte subjacet Adductori ossis metacarpi manus quarti U: à principio autem delitescunt post ligamentum carpi annulare interius N. Dein Tab. II. γ ε. ζ η. π. θ ε in manu dextra; ubi ex parte tecti tendinibus Sublimis P. N. I. L; primus Abductore pollicis brevi altero u, quartus Flexore brevi digiti minimi τ: pariterque delitescunt post ligamentum carpi annulare interius l. Dein Tab. I. Ω w. l u. k s. i q in manu dextra; ubi maximam partem tecti aponeurosi Palmaris longi γ; primus etiam Abductore brevi altero pollicis Δ. Adde Tab. IV. α β. η θ. ζ ο in manu dextra.

Praeterea Tab. III. o p q in manu sinistra. Et Tab. II. i i. r o in manu sinistra. Et Tab. I. I H in manu sinistra. Et Tab. VII. φ i in manu dextra. Et Tab. VI. v i in manu dextra. Et Tab. V. 7. 6 in manu dextra. Et Tab. VII. 1. 2. 3. 4 in manu sinistra. Et Tab. VI. β. γ. δ. ε in manu sinistra. Et Tab. V. o in manu sinistra. Et Tab. IX. ε τ σ in manu sinistra.

## FIGURAE IV.

### Sublimis.

a Principium tendinosum, b oriens ab interiore parte condyli majoris humeri. Separatum autem à capite tendineo communi, quo cum aliis musculis ab hoc condylo oritur; eo modo, quo in Radiali interno dictum, ad a Fig. 9. Tab. XIX.

c Portio exili tendine c oriens d à priori parte ulnae eminentiae, cui Brachialis internus insertus, juxta finem Brachialis illius.

e Caput amplum & tenue, à radio procedens.

f Tendinosa pars principii à radio orientis.

g g Ortus hujus capitis à radio, ab interna parte longitudinis fere mediae, juxta finem Supinatoris brevis & Pronatoris teretis incipiens: & hinc quoque g h oriri pergens.

i Portio ad indicem pertinens. k tendo, in quem abit.

l Portio ad digitum medium pertinens. m tendo, in quem abit.

n Portio ad digitum annularem pertinens. o tendo, in quem abit.

p Portio ad digitum auricularem pertinens. q tendo, in quem abit.

k m o q Hic tendines procedunt per interiorē concavam carpi partem, sub ligamento carpi interiore; quod vide Tab. II. l in manu dextra.

r Tendo per longitudinem quodammodo fissus: ut hic, sic reliqui.

s. t Cornua duo, in quae se tendo findit; u. v inserta interiori parti mediae

longitudinis marginum ossis secundi ordinis; alterum priori, alterum posteriori. Ut in hoc, sic in reliquis.

w Pars tenuior, qua cornua illa sub tendine Profundi cohaerent inter se. Ut in hoc digito, sic in reliquis.

Vaginas, quibus una cum Profundi tendinibus, qua simul secundum ossa digitorum primi ordinis incedunt, obducti, vide Tab. I. 3. &c. in manu dextra. Itemque illas, quibus obducti, qua incedunt secundum articulos digitorum cum metacarpo, ibidem 4. 4. 4. &c. Et illas etiam, quas extremis cornubus suis subeunt, 5. &c.

Adde Fig. 5.

In *Syntaxi*, Tab. II. C--Q in cubito; ubi partem tegit Pronator teres ψ; tendines I & L in manu, ex parte subjacent Flexori parvo digiti minimi τ; tendo P Abductoris brevi alteri pollicis u: omnes in fine tendinibus Profundi i. i. i. i. i. i. Dein Tab. I. ζ--μ in brachio; ubi partim subjectus Palmari longo α β, partim Radiali interno ψ Ω, partim Supinatori longo Π Σ, & Pronatori tereti Φ: porroque in manu dextra tendines ejus x 2. 2. &c; ubi magnam partem tecti aponeurosi Palmaris longi γ, & in fine ex parte subjecti tendinibus Profundi y. &c.

Praeterea Tab. VI. s--α in brachio; ubi in cubito Ulnari interno l ex parte subjacet, & Profundo i. Et Tab. V. M--Q in cubito, subjectus & iisdem: ac porro tendines ε Π, &c. in manu sinistra. Et Tab. IX. e e in brachio sinistro; & tendines in manu: & in brachio dextro o. Et Tab. II. tendines in digitis manus sinistrae. Et Tab. I. S. &c. in manu sinistra.

## FIGURAE V.

### Sublimis.

a Ligamentum, quod ab inferiore parte condyli posterioris humeri ad posticam capitis superioris ulnae, juxta imam sinus ejus lunati pertinet.

b c c Rescissi Sublimis portio, b qua oritur à condylo, c c qua à ligamento a, & à superiore eademque posteriore parte eminentiae inaequalis ulnae, cui Brachialis internus insertus.

Adde Fig. 4.

## FIGURAE VI.

### Interossei manus interni, ab exteriorē parte.

a *Interosseus digiti auricularis*, b b oriens ab amplitudine illa ossis metacarpi digiti illius, quae spectat os metacarpi annularis; & quibus ab ejus longitudinis superiore plus quam dimidia parte, mox à radice capitis superioris; praeter amplitudinis illius partem, quae est propter dorsum manus, ut à qua caput tenuius oritur Interossei posterioris annularis, a Fig. 9.

c Tendo ejus, qui accepto ab interiore parte tendine Lumbricalis quarti, d conjungit se cum tendine Extensoris proprii auricularis, acceptaque ab eo portione auctus, e decurrit ad os tertium auricularis.

f g Aponeurosis, quae accedit ad tendinem Extensoris; inferiore parte f producta à tendine c; superiore g veniens è capsa articuli hujus digiti cum suo metacarpo.

Adde Fig. 1. P &c. & Fig. 7. n &c.

In *Syntaxi*, Tab. VII. m n o p r in manu dextra; ubi partem integit Interosseus posterior digiti annularis s. Dein Tab. VI. λ in manu dextra; ubi fere totus subjacet posteriori annularis π ε Similiter Tab. V. η ζ in manu dextra.

h Tendo Extensoris auricularis proprii. i tendo communis Abductoris Flexorisque parvi digiti auricularis. Vide Fig. 1. n. R. &c.

k *Interosseus prior annularis*, l l oriens ab amplitudine illa ossis metacarpi digiti illius, quae spectat os metacarpi medii; & quidem ab ejus longitudinis superiore plus quam dimidia parte, mox à radice capitis superioris; praeter amplitudinis illius partem, quae est propter dorsum manus, ut à qua caput tenuius oritur Interossei posterioris medii, m Fig. 9.

m Tendo ejus, qui accepto ab interiore parte tendine Lumbricalis tertii, conjungit se n cum tendine Extensoris communis ad hunc digitum pertinente, acceptaque ab eo portione auctus, o decurrit ad os tertium digiti hujus.

p q Aponeurosis, quae accedit ad tendinem Extensoris; inferiore parte p producta à tendine m; superiore q veniens è capsa articuli hujus digiti cum suo metacarpo.

Adde Fig. 1. I &c. & Fig. 7. h &c.

In *Syntaxi*, Tab. VII. y z α β δ in manu dextra; ubi partem integit Interosseus posterior digiti medii ε. Dein Tab. VI. v in manu dextra; ubi fere totus subjectus posteriori medii a b. Similiter Tab. V. ε π in manu dextra.

r Tendo Extensoris communis ad hunc digitum pertinens. s tendo Interossei posterioris digiti annularis. Vide Fig. 1. θ. L. &c.

t *Interosseus posterior indicis*, u u oriens ab amplitudine illa ossis metacarpi indicis, quae spectat os metacarpi medii; & quidem ab ejus longitudinis plus quam dimidia parte, mox à radice capitis superioris; praeter amplitudinis illius marginem, qui est propter dorsum manus; ut à quo caput tenuius oritur Interossei prioris medii, x Fig. 9.

v Tendo ejus, qui se conjungit cum tendine extensore indicis, acceptaque ab eo portione auctus, x decurrit ad os tertium indicis.

y z Aponeurosis, quae accedit ad tendinem extensorem indicis; inferiore parte y producta à tendine v; superiore z veniens è capsa articuli hujus digiti cum suo metacarpo.

Adde Fig. 1. ψ &c. & Fig. 7. e &c.

In *Syntaxi*, Tab. VII. σ ε τ υ in manu dextra; ubi partem integit Interosseus prior digiti medii λ. Dein Tab. VI. q r in manu dextra; ubi caeterum subjectus priori medii i k. Similiter Tab. V. 1. 2 ψ in manu dextra.

α Tendo extensor indicis. β tendo Lumbricalis primi. Vide Fig. 1. h. φ. &c.

γ *Interosseus prior indicis*, δ δ oriens ab amplitudine priore ossis metacarpi indicis; & quidem ab ejus longitudinis superiore plus quam dimidia parte, mox à radice capitis superioris.

ε Ejus tendineum extremum, ζ insertum priori parti capitis superioris ossis primi indicis.

Adde Fig. 7. a &c.

In *Syntaxi*, Tab. VII. 2. 3 in manu dextra. Dein Tab. VI. 2 in manu dextra;



# TABULAE MUSCULORUM VIGESIMAE EXPLANATIO.

tra; ex parte testus Abductore indicis 3 z. Similiter Tab.V. 11 in manu dextra. Praeterea Tab.III. e f in manu sinistra. Et Tab.II. Φ in manu sinistra. Et Tab. I. w in manu sinistra: & Tab.IX. o in manu sinistra.

## FIGURAE VII.

### Interossei manus interni, ab interiore parte.

a Interosseus prior indicis, b b oriens ab amplitudine priore ossis metacarpi indicis; & quidem ab ejus longitudinis superiore plus quam dimidia parte, mox à radice capitis superioris.

c Extremum tendineum, d insertum priori parti capitis superioris primi ossis indicis.

Adde Fig. 6. γ &c.

In Syntaxi, Tab. IV. v in manu dextra; majorem partem testus Adductore pollicis s, & Flexore brevi l. Dein Tab.III. z in manu dextra; testus pariter Adductore pollicis b, & Flexore brevi Z, & praeterea Lumbricali primo c. Dein Tab.II. z in manu dextra; similiter subjectus Adductori pollicis y, & Lumbricali primo γ, & praeterea Abductori indicis αβ. Similiter plane Tab. I. a in manu dextra.

e Interosseus posterior indicis, ff oriens ab amplitudine illa ossis metacarpi indicis, quae spectat os metacarpi medii; & quidem ab ejus longitudinis plus quam dimidia parte, mox à radice capitis superioris.

g Tendo ejus, qui accepta à tendine extensorum indicis portione auctus, decurrit ad os tertium indicis.

Et tendo ille se etiam subtilibus fibris innectit capsae, quae continet articulum hujus digiti cum metacarpo, qua secundum eam à parte volae incedit. At ejus similitudinem prior quoque annularis, & prior auricularis.

Adde Fig. 6. t &c.

In Syntaxi, Tab. IV. x y in manu dextra; majorem partem testus Adductore pollicis s, & Flexore brevi l. Dein Tab.III. x y in manu dextra; testus Adductore pollicis b, & Profundi tendine ad indicem pertinente H. Dein Tab. II. λ in manu dextra; testus etiam Sublimis tendine ad indicem pertinente P. Dein Tab. I. v in manu dextra; testus etiam aponeurosi Palmaris longi γ ε.

Praeterea Tab. VIII. i in manu sinistra.

h Interosseus prior annularis, i i oriens ab amplitudine illa ossis metacarpi digiti illius, quae spectat os metacarpi medii; & quidem ab ejus longitudinis plus quam dimidia parte, mox à radice capitis superioris.

k Tendo ejus, cui se adjungit tendo Lumbricalis tertii (z γ δ Fig. 3.), l hic truncatus: communisque ex iis factus tendo m, accepta à tendine Extensoris communis hujus digiti portione auctus, decurrit ad os tertium digiti hujus.

Adde Fig. 6. k &c.

In Syntaxi, Tab. IV. ε ζ in manu dextra; ex parte testus Lumbricali tertio n. Dein Tab.III. r in manu dextra; testus caeterum Lumbricali tertio k, & Profundi tendine ad digitum medium pertinente I. Dein Tab. II. o in manu dextra; ubi & Lumbricali tertio n testus, & Sublimis tendine N ad indicem pertinente. Dein Tab. I. n in manu dextra; testus Lumbricali tertio k, & aponeurosi Palmaris longi γ ε.

Praeterea Tab. VIII. m in manu sinistra.

n Interosseus digiti auricularis, o o oriens ab amplitudine illa ossis metacarpi digiti hujus, quae spectat os metacarpi annularis; & quidem ab ejus longitudinis plus quam dimidia parte, mox à radice capitis superioris.

p Tendo ejus, cui se adjungit tendo Lumbricalis quarti (ε θ i Fig. 3.), q hic truncatus: communisque ex iis factus tendo r, accepta à tendine Extensoris auricularis proprii portione auctus, decurrit ad os tertium hujus digiti.

Adde Fig. 6. a &c.

In Syntaxi, Tab. IV. μ ν in manu dextra; ex parte testus Lumbricali quarto ξ. Dein Tab. III. supra p in manu dextra; ubi caeterum testus Lumbricali quarto n, & tendine Profundi ad digitum minimum pertinente L, & Adductore ossis metacarpi quarti U. Dein eodem modo Tab. II. σ in manu dextra: & Tab. I. o in manu dextra.

Praeterea Tab. VIII. o in manu sinistra.

## FIGURAE VIII.

### Interossei manus bicipites, seu externi, à parte interiore.

a--f Interosseus prior digiti medii.

a Caput tenuius, quod ab ossis metacarpi indicis oritur.

b Caput crassius, c c oriens à longitudine paullo plus quam dimidia superiore illius amplitudinis ossis metacarpi digiti medii, quae spectat os metacarpi indicis.

d Tendo ejus, cui se adjungit tendo Lumbricalis secundi (u x y Fig. 3.), e hic truncatus: communisque ex iis factus tendo f, accepta à tendine Extensoris communis ad hunc digitum pertinente portione auctus, decurrit ad os tertium digiti hujus.

Solet quoque extremum, praecedenti subjacens, affigere eminentiae, quae est mox infra caput primum ossis primi. Sic & posterior medii, posteriorque annularis.

Adde Fig. 9. v x &c.

In Syntaxi, Tab. IV. z in manu dextra; majorem partem subjacens Interosseo posteriori indicis x, Adductori pollicis s, & Flexori brevi l, & Lumbricali secundo α. Dein Tab. III. v in manu dextra; pariter subjectus Interosseo posteriori indicis x, Adductori pollicis b, & Lumbricali secundo g. Dein Tab. II. μ in manu dextra; subjectus Interosseo posteriori indicis λ, Lumbricali secundo ζ, & tendini Sublimis ad indicem pertinenti P. Dein Tab. I. m in manu dextra; subjectus Interosseo posteriori indicis v, Lumbricali secundo l, & aponeurosi Palmaris longi γ ε.

Praeterea Tab. VIII. juxta k in manu sinistra.

g--k Interosseus posterior digiti medii.

g Caput tenuius, quod ab ossis metacarpi annularis oritur.

h Caput crassius, i i oriens à longitudine paullo plus quam dimidia superiore illius amplitudinis ossis metacarpi digiti medii, quae spectat os metacarpi annularis.

k Tendo ejus, qui accepta deinde à tendine Extensoris communis ad digitum medium pertinente portione auctus, decurrit ad os tertium medii.

Adde Fig. 9. m o &c.

In Syntaxi, Tab. IV. γ δ in manu dextra; magnam partem testus Interosseo priore annularis ε. Dein Tab. III. t u in manu dextra; testus priore annularis r, & Profundi tendine ad digitum medium pertinente I. Dein Tab. II. ξ in manu dextra; testus priore annularis o, & Sublimis tendine ad digitum medium pertinente N. Dein Tab. I. t in manu dextra; testus priore annularis n, & aponeurosi Palmaris longi ε.

Praeterea Tab. VIII. l l in manu sinistra.

l--o Interosseus posterior digiti annularis.

l Caput tenuius, quod ab ossis metacarpi auricularis oritur.

m Caput crassius, n n oriens à longitudine paullo plus quam dimidia superiore illius amplitudinis ossis metacarpi digiti annularis, qua spectat os metacarpi auricularis.

o Tendo ejus, qui accepta deinde à tendine Extensoris communis ad annularem pertinente portione auctus, decurrit ad os tertium digiti hujus.

Adde Fig. 9. a c &c.

In Syntaxi, Tab. IV. ι x in manu dextra, magnam partem testus Interosseo auricularis μ. Dein Tab. III. q in manu dextra; testus Lumbricali quarto n, & Profundi tendine K. Dein Tab. II. ε in manu dextra; similiter testus Lumbricali quarto θ: & Profundi tendine ad digitum annularem pertinente. Dein Tab. I. r in manu dextra; testus pariter Lumbricali quarto i.

Praeterea Tab. VIII. n n in manu sinistra.

## FIGURAE IX.

### Interossei manus bicipites, seu externi, ab exteriora parte.

a--h Interosseus posterior digiti annularis.

a Caput tenuius, b b oriens ab exteriora margine illius amplitudinis ossis metacarpi digiti auricularis, qua spectat os metacarpi annularis, à radice capitis ejus superioris, fere usque ad inferius.

c Caput crassius, d d oriens à longitudine paullo plus quam dimidia superiore illius amplitudinis ossis metacarpi annularis, qua spectat os metacarpi auricularis.

e Tendo ejus, qui se conjungit f cum tendine Extensoris communis ad annularem pertinente, acceptaque ab eo portione auctus, g decurrit ad os tertium hujus digiti.

h i Aponeurosis, quae accedit ad tendinem Extensoris communis ad annularem pertinentem; inferiore parte h producta à tendine e; superiore i veniens è capsula articuli hujus digiti cum suo metacarpo.

Adde Fig. 1. L &c. & Fig. 8. l m &c.

In Syntaxi, Tab. VI. π ρ σ ς τ in manu dextra. Dein Tab. V. μ ν ξ ο λ in manu dextra; ubi caeterum subjacet Extensoris communis digitorum tendinibus f f &c. & Extensoris proprii auricularis tendini c.

Praeterea Tab. VII. s t &c. in manu dextra. Et Tab. III. i in manu sinistra. Et Tab. II. z in manu sinistra.

k Tendo ab Extensore communi ad digitum annularem pertinens. l Tendo Interosseo priori annularis cum Lumbricali tertio communis. Vide Fig. 1. θ I. &c.

m--t Interosseus posterior medii digiti.

m Caput tenuius, n n oriens ab exteriora margine illius amplitudinis ossis metacarpi annularis, qua spectat os metacarpi medii; à radice capitis ejus superioris, fere usque ad inferius.

o Caput crassius, p p oriens à longitudine paulo plus quam dimidia superiore illius amplitudinis ossis metacarpi digiti medii, qua respicit os metacarpi annularis.

q Tendo ejus, qui se conjungit r cum tendine Extensoris communis ad digitum medium pertinente, acceptaque ab eo portione auctus, s decurrit ad os tertium medii.

t u Aponeurosis, quae accedit ad tendinem Extensoris communis ad digitum medium pertinentem; inferiore parte t producta à tendine q; superiore u veniens è capsula articuli hujus digiti cum suo metacarpo.

Adde Fig. 1. E &c. & Fig. 8. g h &c.

In Syntaxi, Tab. VI. a b c f g h in manu dextra. Dein Tab. V. χ ψ ω Γ φ in manu dextra; ubi caeterum subjacet Extensoris digitorum manus tendinibus f n o p.

Praeterea Tab. VII. ε ζ &c. in manu dextra. Et Tab. III. h in manu sinistra. Et Tab. II. i in manu sinistra.

v--ε Interosseus prior digiti medii.

v Caput crassius, w w oriens à longitudine paullo plus quam dimidia superiore illius amplitudinis ossis metacarpi digiti medii, quae spectat os metacarpi indicis.

x Caput tenuius, y y oriens ab exteriora margine illius amplitudinis ossis metacarpi indicis, qua spectat os metacarpi medii; à radice capitis ejus superioris, fere usque ad inferius.

z Tendo ejus, qui accepto ab interiore parte tendine Lumbricalis secundi, conjungit se α cum tendine Extensoris communis ad digitum medium pertinente, acceptaque ab eo portione auctus, β decurrit ad os tertium digiti medii.

γ Commune extremum, in quod se conjungunt tendines s. β, insertum δ ossi tertio.

ε ζ Aponeurosis, quae accedit ad tendinem Extensoris communis ad digitum medium pertinentem; inferiore parte ε producta à tendine z; superiore ζ veniens è capsula articuli hujus digiti cum suo metacarpo.

Adde Fig. 1. C &c. & Fig. 8. a b &c.

In Syntaxi, Tab. VI. i i k k l m n p in manu dextra; ubi ex parte subjacet Indicatoris tendini h. Dein Tab. V. θ θ Δ Ε Π Σ Δ in manu dextra; ubi ex parte pariter Indicatoris tendini t subjacet, & praeterea Extensoris communis digitorum tendini r, & aponeurosi s.

Praeterea Tab. VII. λ μ &c. in manu dextra. Et Tab. III. g in manu sinistra. [M m]



## TABULAE MUSCULORUM VIGESIMAE EXPLANATIO.

Et Tab. II.  $\Omega$  in manu sinistra.

$\eta$  Tendo, ab Extensore communi pertinet ad digitum medium. Vide Fig. 1.  $\epsilon$   $\lambda$ .

### DIGITI MINIMI MANUS.

Adde *Extensorem proprium auricularis*, Fig. 1.  $\alpha$  &c.

#### FIGURAE X.

##### *Flexor parvus digiti minimi manus.*

a Ortus ab exteriori parte ligamenti carpi, b à media parte extremi processus incurvi ossis cuneiformis carpi.

c Tendo, in quem abit. Quo cum tendine Abductoris conjuncto, fit tendo communis d: is conjungit se cum tendine Extensoris auricularis proprio, acceptaque ab eo portione auctus, decurrit ad os tertium hujus digiti. Vide Fig. 1. R U S T U.

Adde Fig. 1. R &c. & Fig. 6. i.

In *Syntaxi*, Tab. II.  $\tau \upsilon \phi$  in manu dextra. Dein Tab. I. f h p in manu dextra; partim tectus Palmari brevi g g, partim aponeurosi Palmaris longi  $\gamma$ .

Praeterea Tab. VI.  $\zeta$  in manu sinistra. Et Tab. V.  $\chi$  in manu sinistra. Et Tab. IX. i in manu dextra.

#### FIGURAE XI.

##### *Abductor digiti minimi manus.*

a Ortus ejus ab interiore & à posteriore parte eminentis rotundae partis ossis subrotundi: b à proxima ligamenti carpi interioris.

c Tendo alter, in quem abit; d insertus posteriori parti capitis superioris ossis primi digiti minimi, mox infra summum ejus marginem.

e Tendo alter, qui se conjungit cum tendine Flexoris parvi, hic f truncato. Communisque ex eo factus tendo, subtus se statim infra extremum tendineum supradictum d, eidem capiti, ubi id inaequaliter eminet, inserit: dein g (est d Fig. 10.) adjungit se tendini Extensoris proprii auricularis.

Aponeurosem, quam hic tendo dat tendini extensori digiti auricularis, vide Tab. V.  $\alpha$  in manu dextra, & Tab. VI.  $\pi$  in manu dextra, & Tab. VII. l in manu dextra.

Adde Fig. 1. R &c. & Fig. 6. i.

In *Syntaxi*, Tab. II.  $\psi \omega$  in manu dextra; ex parte tectus Flexore parvo  $\tau \upsilon \phi$ . Dein Tab. I. c in manu dextra; ex parte tectus Flexore parvo h p, ex parte Palmari brevi g g.

Praeterea Tab. VI.  $\theta$  in manu sinistra: &  $\zeta$  in dextra. Et Tab. V.  $\tau$  in manu sinistra: &  $\beta$  in dextra. Et Tab. IX. k in manu dextra.

### INDICIS MANUS.

#### FIGURAE XII.

##### *Indicator.*

a Principium tendineum, b b oriens juxta posteriorem partem Extensoris majoris pollicis ab exteriori parte spinae ulnae, circa mediam ulnae longitudinem incipiens: post & infra Extensoris mododicti ab ulna ortum, à ligamento cubiti ossibus interjecto, juxta ulnam.

c Tendo, in quem abit; qui cum Extensore digitorum communi sub ligamento manus armillari exteriori, 16 in manu dextra Tab. V. per communem cum Extensore illo finem decurrit.

d Hinc tendo se conjungit cum tendine Extensoris communis digitorum ad indicem pertinente e, hic truncato; cum eoque efficit communem tendinem f.

Adde V h  $\pi$   $\lambda$   $\mu$   $\nu$   $\xi$  &c. Fig. 1.

In *Syntaxi*, Tab. VI. f g h in brachio. Dein Tab. V. t in manu dextra; ubi pars tecta Extensoris communis digitorum tendine r: & in cubito subjacet Extensori illi communi d &c. & Extensori auricularis proprio a, & Ulnari externo W.

Praeterea Tab. II.  $\psi \psi$  in manu sinistra. Et Tab. I. u u in manu sinistra. Et Tab. IX. u in manu sinistra.

g Tendo Interossei posterioris indicis. Vide  $\psi$  Fig. 1.

h Tendo Lumbricalis primi. Vide  $\phi$  Fig. 1.

#### FIGURAE XIII.

##### *Abductor indicis manus, à parte exteriori.*

a Principium tendineum, b oriens à dorso ossis multanguli majoris.

c Origo à superiore parte marginis ossis metacarpi pollicis, quo id indicem respicit.

d Portio oriens ab interiore & eadem superiore parte ossis metacarpi indicis.

e Aponeurosis, quam conjungit cum tendine Lumbricalis primi, & adjungit communi tendini Extensorum indicis, h Fig. 1: à quo hic f rescissa.

Adde Fig. XIV.

In *Syntaxi*, Tab. VI. 3 z in manu dextra; ex parte subjectus tendini c Extensoris majoris pollicis. Et Tab. V. 12. 5 in manu dextra; eodem modo tectus tendine 13 Extensoris majoris pollicis.

Praeterea Tab. II.  $\Sigma$  in manu sinistra. Et Tab. I. x in manu sinistra. Et Tab. IX.  $\pi$  in manu sinistra.

#### FIGURAE XIV.

##### *Abductor indicis manus, à parte interiore.*

a Tendinosa principii pars,

b Extremum tendineum, quo insertus c capiti superiori ossis primi indicis.

Adde Fig. 13.

In *Syntaxi*, Tab. II.  $\alpha \beta$  in manu dextra; ubi majorem partem tectus Adductore pollicis  $\gamma$ , & Flexore brevi x, & Lumbricali primo  $\gamma$ . Et Tab. I. b in manu dextra; eodem modo tectus Adductore pollicis  $\psi$ , & Flexore brevi  $\phi$ , & Lumbricali primo  $\Omega$  w.

### POLLICIS MANUS.

#### FIGURAE XV.

##### *Opponens pollicis manus.*

a Ortus ab ossis multanguli majoris eminentia priore earum, quae faciunt finem, per quem decurrit tendo Radialis interni: & b b à ligamento carpi; principio tendinoso.

c Tendinea extremi portio.

d d Insertio internae amplitudini ossis metacarpi pollicis, ad caput ejus inferius. Praeterea autem amplitudinis illius margini priori toti insertus.

e Vestigium impressum ab Abductore brevi pollicis, & Abductore brevi altero.

In *Syntaxi*, Tab. II. q &c. in manu dextra; tectus ex parte Abductore brevi altero pollicis u, & tendine Extensoris pollicis minoris f. Dein Tab. I. X in manu dextra; magnam partem tectus Abductore pollicis brevi Y; parva autem, tendine Extensoris minoris pollicis d.

Praeterea Tab. VI.  $\epsilon$  in manu sinistra. Et Tab. II.  $\Gamma$  in manu sinistra. Et Tab. I. z in manu sinistra. Et Tab. IX.  $\lambda$  in manu sinistra.

#### FIGURAE XVI.

##### *Abductor brevis pollicis manus.*

a a Origo à ligamento carpi interiore.

b Extremum tendineum, cujus pars c inserta internae eidemque priori parti capitis superioris ossis primi pollicis.

d Tenuitas tendinea, quae conscendit dorsum pollicis, & coit cum priore parte tendinum Extensorum pollicis, & se porro per exteriora eorundem tendinum continuat simili aponeurosi Flexoris brevis pollicis.

e Portio, quam tendo partis superioris Abductoris longi pollicis manus dat huic Abductori brevi. Vide Fig. 19. e: à quo hic rescissa.

In *Syntaxi*, Tab. I. Y Z  $\Gamma$  in manu dextra. Et Tab. II. k in manu dextra. Praeterea Tab. V.  $\theta$   $\pi$  in manu sinistra. Et Tab. IX.  $\iota$   $\pi$  in manu sinistra: & a b in dextra.

f Tendo Extensoris minoris pollicis manus, hic truncatus.

g Tendo communis Extensorum pollicis.

#### FIGURAE XVII.

##### *Abductor brevis alter pollicis manus.*

a Ortus ejus ab inferiore eademque exteriori parte ligamenti carpi interioris.

b Extremum tendinosum, c insertum internae eidemque priori parti capitis superioris ossis primi pollicis.

In *Syntaxi*, Tab. II. u &c. in manu dextra; in fine tectus aponeurosi Abductoris brevis pollicis k. Dein Tab. I.  $\Lambda$  in manu dextra; ubi & tectus Abductore brevi Y  $\Gamma$ , & aponeurosi Palmaris longi  $\gamma$ .

Praeterea Tab. VI.  $\tau$  in manu sinistra. Et Tab. V.  $\lambda$  in manu sinistra. Et Tab. IX. c in manu dextra.

#### FIGURAE XVIII.

##### *Abductor longus pollicis manus, à parte exteriori.*

a a Principium tendineum, b b oriens ab ulnae spina, statim supra ulnae medium, ab exteriori parte, juxta inferiorem partem Supinatoris brevis.

d Pars, quae e e oritur à radii amplitudine exteriori, juxta inferiorem partem Supinatoris brevis, è regione ortus ab ulna.

Et subtus quoque oritur à ligamenti, quod inter ulnam radiumque interjectum intermedium, parte exteriori, inter duas illas ab ulna & radio origines media.

f Tendinosa partis illius pars.

g Tendo partis superioris.

h Tendo partis inferioris, i hic truncatus.

Delabuntur tendines per finem priorem capitis inferioris radii, sub ligamento, 20 in manu dextra Tab. V. & Tab. IX.  $\eta$  in manu sinistra.

Adde Fig. 19.

In *Syntaxi*, Tab. VI.  $\Lambda$  --  $\Phi$  in brachio; tectus Radiali externo brevior V, Supinatore brevi  $\Delta$ , Extensore majore pollicis a, minore  $\psi \Omega$ . Dein Tab. V. 21--23 in cubito; tectus Radiali externo brevior H, Extensore communi digitorum d, auricularis proprio a, Extensore minore pollicis 24. 25.

Praeterea Tab. II. Z a b in cubito sinistro. Et Tab. I.  $\phi \chi \psi \omega$  b b in brachio sinistro. Et Tab. IX. x y z z in brachio sinistro, manumque.

#### FIGURAE XIX.

##### *Abductor longus pollicis manus, à parte interiore.*

a Pars ejus interior, quae Supinatori longo & Radialibus externis adjacet.

b Pars superior. c tendo, in quem abit: cujus pars d inserta internae parti ossis multanguli majoris, juxta pollicem; portio e accedit ad Abductorem brevem pollicis manus, hic truncata, e Fig. 16.

f Pars inferior. g tendo, in quem abit; h insertus tuberculo, quod est in priore



## TABULAE MUSCULORUM VIGESIMAE EXPLANATIO.

priore & eadem interna parte capitis superioris ossis metacarpi pollicis, supra marginem ejus internum.

Tendines delabuntur per finum priorem capitis inferioris radii, sub ligamento, quod vide Tab. I.  $\nu$  in brachio.

Adde Fig. 18.

*In Syntaxi*, Tab. II. a b c d in cubito dextro; ubi in fine testus Opponente q in manu. Dein Tab. I.  $\chi$  o o a b b in brachio dextro; pariter in fine subjectus Opponenti X in manu.

Praeterea Tab. V.  $\eta$  in manu sinistra.

### FIGURAE XX.

#### *Flexor brevis pollicis manus.*

a Origo ab interiore parte inferioris partis ossis multanguli minoris, b capiti, c cuneiformis. Oritur & ab eminentia interna multanguli majoris. Infraque ortum ab ossibus illis, etiam oritur à capitibus vicinis ossium metacarpi indicis & medii digiti, saepe & annularis, & pollicis.

d Cauda altera, e extremo tendineo inserta f superiori parti illius ossium sesamoideorum, quae apposita ad articulum pollicis cum metacarpo ejus, quod ab indice remotius.

g Altera, h extremo tendineo inserta i ossi sesamoideo, quod indici propius; & superiori quidem ejus parti, illique, quae indici propior: dein & mox infra illud, k proximae parti laterali capitis superioris ossis primi pollicis.

Aponeurosem, quam cauda, quae indici propior, producit, quaeque se cum aponeurosi ambiente capsam articuli pollicis cum metacarpo suo conjungit, unaque cum ea adjungit extremo communi tendinum Extensorum pollicis, vide Tab. IV. r in manu sinistra.

*In Syntaxi*, Tab. IV. l--q in manu dextra; exigua parte testus Adductore pollicis s. Dein Tab. III. Z Z in manu dextra; ubi testus Adductore pollicis b, tendine A Flexoris longi pollicis, & Lumbricali primo c; & à principio delitescit post ligamentum carpi armillare interius N. Dein Tab. II. x in manu dextra; testus Adductore pollicis y, tendine V Flexoris longi pollicis, Lumbricali primo  $\gamma$ , Abductore pollicis brevi altero u, Opponente q. Sic & Tab. I.  $\Phi$  in manu dextra, testus iisdem.

Praeterea Tab. VIII.  $\Psi$ --e in manu sinistra. Et Tab. VII.  $\Phi$   $\Psi$  in manu sinistra. Et Tab. VI.  $\chi$  in manu sinistra. Et Tab. V.  $\xi$  in manu sinistra. Et Tab. IX. d in manu dextra.

Ab exteriori parte, Tab. VIII.  $\Psi$  f in manu dextra. Et Tab. VII. 4. 5 in manu dextra. Et Tab. VI. 6. 5 in manu dextra. Et Tab. V. inter 27 & 29 in manu dextra. Dein Tab. IV. l r in manu sinistra. Et Tab. III. a b in manu sinistra. Et Tab. II.  $\Theta$   $\Lambda$  in manu sinistra. Et Tab. I. D in manu sinistra. Et Tab. IX.  $\mu$  in manu sinistra.

### FIGURAE XXI.

#### *Flexor longus pollicis manus.*

a a Prima origo à radio; cujus amplitudinem internam, prope à tuberculo cui insertus Biceps brachii, fere ad Pronatorem quadratum ulque, suo occupat initio. Oritur & à ligamento interjecto ulnae radioque.

b Principii pars tendinosa.

c Portio, quae ad eum accedit, d exili tendine oriens e à condylo majore humeri, rarius occurrens. f tendo, in quem portio illa abit; qui ad carnem Flexoris se adjungit, efficitque primum initium tendinis ejus g.

Tendo transiit per finum carpi interiorem, sub ligamento carpi interiorem; quod vide Tab. III. N in manu dextra.

h Tendo inter ossa sesamoidea pollicis incedens.

i Qua secundum metacarpum pollicis, pollicemque incedit, per longitudinem quodammodo fissus est.

k Insertus ossis ultimi pollicis parti posticae fere mediae, quae eminet asperula.

Ligamentum, quo coercetur, ubi secundum os primum pollicis incedit, vide Tab. I.  $\Sigma$  in manu dextra.

*In Syntaxi*, Tab. III.  $\Pi$ --B in cubito manumque; ubi parva parte delitescit post Pronatorem teretem A, & Radialem externum breviorum  $\chi$ ; portio autem accessoria à principio subjecta Brachiali interno  $\nu$  o. Dein Tab. II. S T V W in cubito &c; ubi subjacet Sublimi C O, Supinatori longo X, pollicis Abductori brevi alteri u in manu dextra. Dein Tab. I.  $\pi$   $\epsilon$  in brachio, &  $\Xi$   $\Pi$  in manu dextra; ubi subjectus Sublimi  $\zeta$   $\lambda$ , Supinatori longo  $\Sigma$ , Radiali interno  $\Omega$ , in brachio: Abductori pollicis brevi alteri A in manu dextra.

Praeterea Tab. VII. X X Y in cubito sinistro manumque. Et Tab. VI.  $\Gamma$   $\Delta$  in manu sinistra. Et Tab. V.  $\nu$   $\nu$  in manu sinistra. Et Tab. IX. f f in brachio sinistro: & f f in manu dextra.

### FIGURAE XXII.

#### *Extensor major pollicis manus.*

a a Ortus ab exteriori parte ulnae, fere in medio longitudinis ejus. Et b infra quoque oritur à ligamento, quod ab ulna ad radium deductum.

c Principii pars tendinea.

d Tendo, in quem abit; qui decurrit per eum parvum radii finum, qui est mox pone illum, per quem Radialium externorum tendines: & decurrit sub carpi ligamento armillari exteriori; quod vide Tab. V. 16 in manu dextra.

e Tendo Extensoris minoris pollicis manus, hic truncatus, c Fig. 23.

f Commune extremum, in quod confluunt tendines pollicis Extensoris majoris & minoris; g insertum tuberculo oblongo & transverso, è priore eademque superiore parte pollicis ultimi ossis eminenti.

*In Syntaxi*, Tab. VI. a b c d e in brachio; ubi subjectus Anconeus Y, & Indicatori f g h. Dein Tab. V. 13. 26 in manu dextra, ubi in cubito subjectus Extensori communi digitorum d, auricularis proprio a, Ulnari externo W.

Praeterea Tab. II. g g h in cubito sinistro. Et Tab. I. y A in manu sinistro. Et Tab. IX.  $\gamma$   $\gamma$   $\delta$  in brachio sinistro, manumque.

h Aponeurosis, quae se adjungit tendini communi Extensorum pollicis; hic truncata. Pars ejus ambit capsam articuli pollicis cum metacarpo suo, innexa capsae illi: pars procedit à cauda posteriore Flexore brevis pollicis manus. Vide 4. 5 in manu dextra Tab. VI.

Aponeurosem, quam tendo communis ab altero latere accipit ab Abductore brevi pollicis manus, vide Fig. 16. d.

### FIGURAE XXIII.

#### *Extensor minor pollicis manus.*

a Pars tendinea principii, b oriens ab exteriori parte spinae ulnae, cui annexum ligamentum, quod inter cubiti ossa intercedit. Infraque illam originem, à mododicto ligamento oritur.

c Tendo, in quem abit; qui hic procedit per finum priorem capitis inferioris radii, sub ligamento, quod vide Tab. V. 20 in manu dextra, & Tab. I.  $\nu$  in brachio, & Tab. IX.  $\eta$  in manu sinistra.

d Tendo Extensoris majoris pollicis manus, hic truncatus; d Fig. 22.

e Commune extremum, in quod confluunt tendines Extensoris minoris & majoris; f insertum tuberculo oblongo & transverso, è priore eademque superiore parte pollicis ossis ultimi eminenti.

*In Syntaxi*, Tab. VI.  $\Psi$   $\Omega$  d in brachio; à principio subjectus Extensori majori pollicis a c. Dein Tab. V. 24. 25. 26; ex parte testus Extensore communi digitorum d, & Extensore auricularis proprio a.

Praeterea Tab. II. e f in cubitis. Et Tab. I. c d in brachiis. Et Tab. IX.  $\alpha$   $\beta$  in brachio sinistro, manumque.

g Aponeurosis eadem, quae Fig. 22. h.

### FIGURAE XXIV.

#### *Adductor pollicis manus.*

a Origo ab interiore parte capitis superioris ossis metacarpi digiti annularis, juxta os metacarpi digiti medii; indeque b b ab interna amplitudine ossis metacarpi digiti medii.

c Extremum tendineum, d insertum ei capitis superioris ossis primi pollicis parti, quae spectat indicem.

*In Syntaxi*, Tab. IV. s & c. in manu dextra; aliquantum testus Flexore brevi pollicis l, & Interosseo posteriore medii  $\gamma$ . Dein Tab. III. b b in manu dextra; testus Flexore brevi pollicis Z, Lumbricali primo c, & secundo g, Profundi tendine H, & I. Dein Tab. II. y in manu dextra; testus caeterum Flexore pollicis brevi x, Lumbricali primo  $\gamma$ , secundo  $\zeta$ , Profundi tendinibus ad indicem & medium digitum pertinentibus, Sublimis tendine P ad indicem. Et Tab. I.  $\Psi$  in manu dextra, testus iisdem.

Praeterea Tab. VIII. g h in manu sinistra. Et Tab. VII.  $\Omega$  in manu sinistra. Et Tab. VI.  $\sigma$  in manu sinistra. Et Tab. V.  $\pi$  in manu sinistra. Et Tab. IX. e in manu dextra.

Ab exteriori parte, Tab. VIII. g g h in manu dextra. Et Tab. VII. 6. 7 in manu dextra. Et Tab. VI. 7. 8 in manu dextra. Et Tab. V. 29. 30 in manu dextra. Dein Tab. IV. s u in manu sinistra. Et Tab. III. c d in manu sinistra. Et Tab. II.  $\Xi$   $\Pi$  in manu sinistra. Et Tab. I. F G in manu sinistra. Et Tab. IX.  $\nu$   $\xi$  in manu sinistra.

## METACARPI MANUS.

### FIGURAE XXV.

#### *Adductor metacarpi digiti minimi manus.*

a Origo à posteriore eademque paullo infra mediam parte extremi fere processus incurvi ossis cuneiformis carpi: & b à proxima exteriori ligamenti carpi interioris, infra processum illum.

c c His partibus insertus est ossi metacarpi minimi, juxta capita ejus: & inter ea etiam per totam longitudinem; posteriori scilicet & eidem interiori parti ossis illius.

*In Syntaxi*, Tab. III. U & c. in manu dextra. Dein Tab. II.  $\chi$   $\chi$  in manu dextra, testus Abductore digiti minimi manus  $\Psi$ , & Flexore parvo  $\tau$ . Dein Tab. I. f in manu dextra, testus Abductore digiti minimi c, Flexore parvo h, Palmare brevi g g, aponeurosi Palmaris longi  $\gamma$ .

Praeterea Tab. VII.  $\Xi$   $\Pi$   $\Sigma$  in manu sinistra: & a in dextra. Et Tab. IX. l in manu dextra.

## VOLAE.

### FIGURAE XXVI.

#### *Palmaris longus, & brevis.*

a--o *Palmaris longus.*

b Principium tendineum oriens ab extrema interiore parte condyli posterioris ossis humeri: quod principium deinde per eum excurrit c. Pertinet autem ad caput tendineum commune, quo cum aliis ab hoc condylo oritur. Separatumque ab eo, illo modo, quo in Radiali interno dictum, ad a Fig. 9. Tab. XIX.

d Tendo, in quem abit.

e Aponeurosis, in quam tendo ille dilatescit; partem accipiens à ligamento carpi interiore. Eaque aponeurosis in quatuor portiones f. g. h. i, ad digitos procedentes, primum leviter distincta, deinde magis, ut non nisi filis tendineis transversis k, k, k cohaereant.



## TABULAE MUSCULORUM VIGESIMAE EXPLANATIO.

l. l. l. l. l. l. Extrema bicornia, in quae portio quaeque ad digitum pertinet, abit. Eaque se adnectunt ligamento transverso, quod est ad radices digitorum, cujusque tum illam partem, quae inter duo cujusque portionis cornua m. m. m. m.; tum illam, quae inter cornua duarum inter se proximarum portionum n. n. n. vestit.

Et ad superiorem quoque ejus ligamenti partem exigua se portione affigunt mediae latitudini partis internae ossium metacarpi.

o Portio, quam dat Abductor brevi pollicis manus; rescissa ab eo.

*In Syntaxi*, Tab. I. α--ε in brachio; ubi à principio subjectus Pronatori terti Φ.

Praeterea Tab. V. L in cubito, & ε in manu sinistra. Et Tab. IX. ζ in brachio dextro.

p p *Palmaris brevis*, in fasciculos inaequaliter distinctus.

q q Hic abscedit à principio aponeurosis Palmaris longi. Abscedit etiam ab exteriori parte ligamenti carpi interioris, juxta pollicem.


r r Extrema, quae abeunt in tendineum manus post tegumenta sequens, & ad os metacarpi manus quartum pertinens involucrum.

*In Syntaxi*, Tab. I. g g in manu dextra; ubi pars principii (ut hîc) subjacet aponeurosi Palmaris longi γ.

Praeterea Tab. V. σ σ in manu sinistra. Et Tab. IX. h in manu dextra.









# TABULAE ANATOMICAE PRIMAE ET VIGESIMAE MUSCULORUM HOMINIS E X P L A N A T I O.

## F E M O R I S.

Adde Tab. XXII. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adde & *Tenforem vaginae femoris*, Fig. 8. Tab. XXIII.

### FIGURAE I.

#### *Gluteus magnus.*

Caro in fasciculos inter se laxius cohaerentes extrinsecus congeſta.

a a Ortus ab offe ilium, ad exteriorem marginem partis posterioris cristae, qua hoc os ultra sacrum retrorsum porrectum. Oritur principio tendinoso.

Quin & tam pertinaciter adhaeret ligamento, quod ab offe sacro ad cristam ilium, illique, quod ab eodem offe ad ischion deductum; itemque vaginae tendinosae, qua extrinsecus obductus, ut ab iis etiam oriri videatur. Et à principio continuatus est tendineo principio Latissimus dorsi, communisque capitis Longissimi dorsi & Sacrolumbalis. Vide Tab. V. δ δ in nate.

b Hac parte oritur à margine externo ossis sacri.

c Hac à tuberculo primo eorum, quae sunt à latere hiatus, in quem spinae dorsi canalis, medullam spinalem continens, exit.

d Hac ab articulo processuum obliquorum ossis sacri coccygisque.

e Hac à latere coccygis.

f Tendo, in quem abit. Is se inferit eminentiae femoris, quae per posteriorem ejus partem à radice trochanteris majoris deorsum porrecta; & superiori quidem parti ejus se inferit, quoad illa maxime eminere & inaequalis esse solet. Et conjungit se quoque cum vagina tendinea, quae femori adjacentes musculos complectitur.

g Hac parte conjungit se cum Vasto externo.

In *Syntaxi*, Tab. V. γ in nate. Praeterea Tab. IX. w x y in coxa. Et Tab. I. A in femore.

### FIGURAE II.

#### *Gluteus medius, à parte posteriore.*

a a a Origo à dorſo ossis ilium latitudine tota, juxta cristam ejus.

b Extremum tendineum, c c trochanteri majori, à radice ejus ad summum verticem, oblique affixum.

d d Vestigium à Gluteo magno impressum.

Adde Fig. 3.

In *Syntaxi*, Tab. VI. i & c. in inferiore trunci parte. Dein Tab. V. Y in nate; ubi caeterum tectus Gluteo magno γ. Praeterea Tab. IX. t in coxa, pari modo tectus Gluteo magno w.

### FIGURAE III.

#### *Gluteus medius, à parte priore.*

a Pars exterior. b interior.

c c Origo à crista ilium.

d Pars tendinea, qua extremum tendineum ab interiore parte incipit.

Adde Fig. 2.

In *Syntaxi*, Tab. II. s in trunco; ubi caeterum post Gluteum minorem u. Dein Tab. I. K in femore; ubi ex parte post Tenforem vaginae femoris M.

### FIGURAE IV.

#### *Gluteus minor, à parte posteriore.*

a a a Prima origo à dorſo ossis ilium; à cujus amplitudine illa tota oritur, quae est inter ortum Glutei medii, ischiique principium, & ab ipsius ischii orae posterioris superiore parte.

b Pars tendinea, qua extremum tendineum ab exteriore parte incipit.

Adde Fig. 5.

In *Syntaxi*, Tab. VII. z & c. in coxa. In Tab. VI. subjacet Gluteo medio i in inferiore trunci parte, & Pyriformi n.

### FIGURAE V.

#### *Gluteus minor, à parte priore.*

a a Ortus ab offe ilium.

b Pars exterior. c interior.

d Extremum tendineum, quod definit ad eam prioris partis trochanteris majoris partem, quae est juxta latus ejus externum, à radice ejus usque ad partem superiorem. Vide Tab. III. g in trunco.

Adde Fig. 4.

In *Syntaxi*, Tab. III. ξ--σ in trunco; ubi subjacet Iliaco interno s. Dein Tab. II. u in trunco; subjacens Iliaco interno y in femore, & Recto cruris x. In Tab. I. subjacet Tenſori vaginae femoris M in femore.

### FIGURAE VI.

#### *Pyriformis, à parte posteriore.*

a Ortus ab exteriore parte orae posterioris ejusdemque inferioris ossis ilium, juxta sacrum.

b Tendo, in quem abit: quique pertinet ad internam partem medii cacuminis trochanteris majoris.

Adde Fig. 7.

In *Syntaxi*, Tab. VI. n in inferiore trunci parte; ubi partem Gluteus medius i tegit, partem Geminorum superior q; pars pone os sacrum. In Tabula V. subjacet Gluteo magno γ in nate.

### FIGURAE VII.

#### *Pyriformis, à parte priore.*

a b. c d. e f Portiones tres, quibus à priore parte ossis sacri oritur; ab initio tendineae, b. d. f.

g Earumque superior oritur à priori parte corporis secundi ossis sacri, mox supra foramen secundum.

h Media à priore parte illius processus, qui inter foramen secundum & tertium est.

i Inferior à priori parte processus, qui inter foramen tertium & quartum.

k Hic truncatus.

Adde Fig. 6.

### FIGURAE VIII.

#### *Quadratus femoris, à parte posteriore.*

a Principii pars tendinea.

b b Extremum insertum ossis femoris oblongae eminentiae, quae partim è posteriore parte radice trochanteris majoris, partim infra eam, eminet.

Adde Fig. 9.

In *Syntaxi*, Tab. VI. z in inferiore trunci parte; ex parte subjectus Geminorum inferiori s, & deliteſcens post Bicipitem cruris t x in femore, cum Semimembranoso. Et quod ibi nudum, id in Tab. V. subjacet Gluteo magno γ in nate.

### FIGURAE IX.

#### *Quadratus femoris, à parte priore.*

a a Origo ab exteriore margine tuberis ischii.

Adde Fig. 8.

### FIGURAE X.

#### *Obturator internus.*

a a a Origo à priore parte, eaque plus quam dimidia, ambitus foraminis magni ossis coxae, principio tendinoso: unde primum per latus pelvis procedit retrorsum; deinde se circum ischii marginem flectit b, per sinum, qui inter ejus acutum processum inumque tuber est: posteaque decurrit per dorsum ischii.

c Tendo, in quem abit; pertinens ad internam eandemque priorem partem cacuminis trochanteris majoris.

In *Syntaxi*, Tab. VII. Θ--Π in coxa; ubi, ut hîc, ipso extremo deliteſcit post trochanterem majorem. Dein Tab. VI. w x x y in inferiore trunci parte; ubi à principio deliteſcit post Levatorem ani e, & Coccygeum d; extremo subjectus Geminis q. s. Et quod nudum, id in Tab. V. tectum Gluteo magno γ in nate.

### FIGURAE XI.

#### *Gemini.*

a Geminorum superior, b oriens ab exteriore parte extremi processus acuti ischii, juxta sinum, per quem Obturator internus flectit.

c Extremum tendineum.

d Geminorum inferior, e e oriens ab exteriore parte tuberis ischii, juxta inferiorem partem sinus, per quem se Obturator internus flectit.

f Principii pars interior, g g oriens extrinsecus ab ischio, à lunato termino illius sinus, per quem Obturator internus se flectit.

h Extremum tendineum.

Extrema cum tendine Obturatoris interni conjuncta, cum eo se inferunt internae eidemque priori parti cacuminis trochanteris majoris.

In *Syntaxi*, Tab. VI. q. s in inferiore trunci parte; ubi pars tecta Obturatore interno w y; ipsa extrema, ut hîc, deliteſcunt post trochanterem majorem. Caeterum in Tab. V. subjecti Gluteo magno γ in nate.

### FIGURAE XII.

#### *Psoas magnus.*

a Capitis primi principium tendineum, b oriens ab imo margine corporis vertebrae primae dorsi, & c à ligamento, quod inter corpus illud corpusque quintae lumborum intercedit. Aliis & à proxima superiore parte corporis illius quintae.



## TABULAE MUSCULORUM PRIMAE ET VIGESIMAE EXPLANATIO.

d e Capitis secundi principium tendineum, d oriens ab imo margine corporis vertebrae quintae lumborum, & e à ligamento, quod inter corpus illud & corpus quartae intercedit: & aliis ab ipsa etiam proxima superiore parte corporis quartae.

f g Capitis tertii principium tendineum, f oriens ab imo margine corporis vertebrae quartae lumborum, & g à ligamento, quod inter corpus illud & corpus tertiae intercedit: & aliis etiam à corporis tertiae parte proxima superiore.

h i Capitis quarti principium tendineum, h oriens ab imo margine corporis vertebrae tertiae lumborum, & i à ligamento, quod inter corpus illud & corpus secundae intercedit: & aliis etiam à corporis secundae parte proxima superiore.

k l Capitis quinti principium tendineum, k oriens ab imo margine corporis vertebrae secundae lumborum, & l à ligamento, quod inter corpus illud & corpus primae intercedit: & aliis etiam à corporis primae parte proxima superiore.

m Tendo, in quem abit.

n n Hinc caro Iliaci interni, quae se ad tendinem illum adjungit, rescissa.

Adde Fig. 13. & 15.

In *Syntaxi*, Tab. IV. t & c. in trunco; ubi ex parte tectus Pfoa parvo r s, & Diaphragmate Q R. Dein Tab. III.  $\tau v$  in femore; ubi non nisi pars, quae in femore est, apparet. Dein Tab. II. z in femore; ex parte tectus Obliquo interno abdominis O in trunco, itemque Pectineo I in femore. Dein Tab. I. F in femore, tectus Obliquo externo abdominis u v in trunco, & Pectineo E in femore, & Sartorio H.

A latere, Tab. IX. o in sinistra coxa.

### FIGURAE XIII.

#### *Pfoae magni capita.*

Omnia à Pfoa rescissa, cui illa, quae à corporibus vertebrarum oriuntur, ex parte subiecta: illa autem, quae à processibus transversis, in totum.

a. d. g. k. n Capita quinque, quae à corporibus vertebrarum ligamentisque intermediis oriuntur.

a Primi principium tendineum, b oriens ab imo margine corporis vertebrae primae dorsi, & c à ligamento, quod inter corpus illud & corpus quintae lumborum intercedit.

d Secundum, quod tendineo principio e f oritur e ab imo margine corporis vertebrae quintae lumborum, & f à ligamento, quod inter corpus illud & corpus quartae intercedit.

g Tertium, quod tendineo principio h i oritur h ab imo margine corporis vertebrae quartae lumborum, & i à ligamento, quod inter corpus illud & corpus tertiae intercedit.

k Quartum, quod tendineo principio l m oritur l ab imo margine corporis vertebrae tertiae lumborum, & m à ligamento, quod inter corpus illud & corpus secundae intercedit.

n Quintum, quod tendineo principio o p oritur o ab imo margine corporis vertebrae secundae lumborum, & p à ligamento, quod inter corpus illud & corpus primae intercedit.

q. s. u. w. y Capita quinque, quae oriuntur à priore & eadem inferiore parte processuum transversorum vertebrarum lumborum.

q Primum, tendineo principio r oriens à processu transverso quintae.

Secundum, tendineo principio t oriens à processu transverso quartae.

u Tertium, principio tendineo v oriens à processu transverso tertiae.

w Quartum, principio tendineo x oriens à processu transverso secundae.

y Quintum, principio tendineo z oriens à processu transverso primae.

Adde Fig. 12. & 15.

### FIGURAE XIV.

#### *Iliacus internus.*

a Hac portione oritur à posteriore parte processus transversus vertebrae primae lumborum.

b Origo à ligamento k.

c c d Prima origo ab interna amplitudine ossis ilium, mox infra cristam: à cuius porro amplitudinis parte superiore tota oriri pergit.

Infra d, ubi cristam à priori parte definit, praeterea oritur ab ora priore ossis ilium, ac deinde ab ambitu interno, ac porro ab inferiore parte radices tuberculi, quod ex eadem illa ora eminet; atque etiam à vicina parte capsae articuli coxae continentis.

e Pars concava, quae cavum abdominis spectat.

f f Hic caro ad tendinem Pfoae magni accedit: accedit & subtus.

g Infra quem tendinem se caro ipsi quoque femori inserit.

h Hinc refectus Pfoas magnus.

i Tendo communis Pfoae magno cum Iliaco interno.

Adde Fig. 15.

In *Syntaxi*, Tab. IV. y in trunco; ex parte subiectus Pfoae magno t. Dein Tab. III. s in femore; ubi non apparet nisi pars quae in femore est; tecta etiam partim Transverso abdominis p p in trunco, partim Pfoa magno  $\tau v$  in femore. Dein Tab. II. y in femore; tectus Obliquo interno abdominis O O in trunco, Pfoa magno z in femore, & Pectineo I, & Recto cruris x. Dein Tab. I. G in femore; tectus Obliquo externo abdominis u in trunco, Pfoa magno F in femore, & Sartorio H.

k Ligamentum, à processu transverso primae lumborum ad proximam partem cristae ilium pertinens.

### FIGURAE XV.

#### *Pfoae magni & Iliaci interni extremum, à parte posteriore.*

a Iliaci interni.

Adde Fig. 14.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. o (& reliquum quoque huius Iliaci  $\xi$ ) in coxa & femore; ubi partem extremi tegit Obturator externus g. Dein Tab. VII.  $\Psi$  in coxa & femore; pariter tecta parte Obturatore externo  $\Sigma$ . Et quod nudum, id in Tab. VI. post Quadratum femoris z in inferiore trunci parte.

b Tendo communis Pfoae magno cum Iliaco interno, c c insertus trochanteri minori, eumque quasi comprehendens.

Adde Fig. 12. & 13.

In *Syntaxi*, Tab. VIII.  $\pi$  in coxa & femore; ubi pars extremi tecti Obturatore externo g, & Adductore magno femoris  $\omega$ . Dein Tab. VII.  $\Omega$  in coxa & femore; ubi extremi pars eodem modo tecta Obturatore externo  $\Sigma$ , & Adductore magno femoris O. Et quod nudum, id in Tab. VI. post Quadratum femoris z in inferiore trunci parte.

Reliquum autem Pfoae magni, Tab. VIII.  $\nu$  in coxa. Dein Tab. VII. y in coxa. Dein Tab. VI. m in inferiore trunci parti; caeterum delitescens post Pyriformen n, & Gluteum medium i.

### FIGURAE XVI.

#### *Adductor magnus femoris, à parte priore.*

a a Origo ab exteriori parte marginis extremi ossis pubis, juxta synchondrosen: unde usque ad tuber ischii oriri pergit.

b. c. d Partes, inter se leviter, & maxime fibrarum decursu, distinctae; quae simul efficiunt extremum superius, femoris lineae posteriori per longitudinem insertum.

e f Pars magis distincta, abeuns deinde in extremum inferius, quod ad condylum anteriorem pertinet. f tendo è carne nascens.

Adde Fig. 17.

In *Syntaxi*, Tab. IV.  $\kappa \lambda \mu \nu \xi \theta$  in femore; ubi pars tecta extremo communi Pfoae magni & Iliaci interni x. Dein Tab. III.  $\Delta \Delta \Theta \Lambda \Xi$  in femore; ubi caeterum tectus eodem communi extremo Pfoae magni & Iliaci interni  $\nu \varsigma$ , & Adductore brevi femoris  $\Psi$ , & Gracili  $\Phi$ . Dein Tab. II.  $\Pi$  in femore; caeterum tectus communi extremo Pfoae magni & Iliaci interni z y, Pectineo I, Adductore longo femoris  $\Delta$ , Gracili  $\Lambda$ , Vasto interno  $\Sigma$ . Dein Tab. I. C in femore; caeterum tectus Sartorio H, Adductore longo femoris D, Gracili B, caeterisque, quibus in Tab. II.

### FIGURAE XVII.

#### *Adductor magnus femoris, à parte posteriore.*

a b Origo ab exteriori parte tuberis ischii, ad imum ejus usque: a parte tendinosa, b tendinea, quae c per carnem excurrit.

d Pars è priori parte veniens, ubi per altitudinem ossis pubis oritur.

e e Extremum latum, quod sine aliquantulum tendinoso, ossi femoris f f f insertum; asperae lineae, quae est in ejus postica parte, totam lineae illius tenens longitudinem.

g Extremum inferius, quod in tendinem h abit, i insertum mediae superiori parti lateris interni condyli interni femoris.

k Vestigium à Gluteo magno impressum.


l l Tota haec pars concava, ob vestigium impressum à Semimembranoso & Semitendinoso.

Adde Fig. 16.

In *Syntaxi*, Tab. VIII.  $\varsigma$  in femore. Dein Tab. VII. K N in femore; subjectus praeterea Semimembranoso A C, & Bicipitis cruris capiti breviori P. Dein Tab. VI.  $\epsilon \epsilon$  in femore; praeterea subjectus Bicipiti cruris  $\theta \lambda$ , Semitendinoso  $\theta \pi$ , Semimembranoso  $\phi$ ; & à principio delitescens post Transversum perinaei h, & Transversum alterum g, in inferiore trunci parte. Dein Tab. V.  $\theta$  in femore; subjectus Semimembranoso  $\nu$ , & Semitendinoso  $\pi$ , ut Tab. VI; praetereaque Gluteo magno  $\gamma$  in nate.









# TABULAE ANATOMICAE SECUNDAE ET VIGESIMAE MUSCULORUM HOMINIS E X P L A N A T I O.

## FEMORIS RELIQUI.

Adde Tab. XXI.

### FIGURAE I.

#### *Adductor longus femoris, à parte priore.*

a Principium tendineum, b è ligamento, quo synchondrosis ossium pubis ab exteriori parte constricta, oriens, statim juxta internam partem tuberculi, quod in pubis ossis priore eademque superiore parte: & c ab ipso illo tuberculo.

d Pars tendinosa extremi.

Adde Fig. 2.

In Syntaxi, Tab. II.  $\Delta \Theta$  in femore; testus Vasto interno  $\Phi \Sigma$ , & Gracili  $\Lambda \Xi$ ; & delitescens etiam post testem cum Cremastere p. Dein in Tab. I. D in femore, testus Sartorio H, Gracili B; & pariter delitescens post testem cum Cremastere z.

A latere, Tab. IX. m in sinistra coxa, pedeque.

### FIGURAE II.

#### *Adductor longi femoris extremum, à parte posteriore.*

a a Pars carnea truncata.

b Extremitas tendinea, c c inserta mediae fere longitudini femoris, ibique asperae eminentiae, quae longitudinem illam à posteriore parte discernit.

Adde Fig. 1.

### FIGURAE III.

#### *Adductor brevis femoris extremum, à parte posteriore.*

a a Pars carnea truncata.

b, c, d Ad extremum tripertita est: quarum portionum haec pars e tendinea.

f, g, h h Infertae asperae eminentiae, quae longitudinem femoris à posteriore parte discernit: & superiori quidem ejus parti, quae mox infra trochanterem minorem est.

Adde Fig. 4.

### FIGURAE IV.

#### *Adductor brevis femoris, à parte priore.*

a Caput extrinsecus tendinosum, b oriens à priori parte ossis pubis juxta synchondrosim, infra ortum Adductoris longi: & c nascens etiam è ligamento synchondrosim illam continente.

d Extremum tendinosum.

Vestigia à Pectineo & Adductore longo femoris impressa.

Adde Fig. 3.

In Syntaxi, Tab. III.  $\Psi \omega \Gamma$  in femore; testus Gracili  $\Omega$ , Iliaco interno cum Psoa magno  $\varsigma \upsilon$ , & extremo suo post os femoris delitescens. Et quod ibi nudum, id in Tab. II. sub Adductore longo  $\Delta \Theta$  in femore, & Pectineo  $\Gamma$ , & Vasto interno  $\Phi \Sigma$ .

### FIGURAE V.

#### *Pectineus, à parte priore.*

a a b Origo, a a ab oblonga eminentia, quam superior pars ossis pubis per longitudinem suam usque ad tuberculum, quod in priore parte juxta synchondrosim habet, exigit: b & ab ipso illo tuberculo.

c Extremum tendineum.

Adde Fig. 6.

In Syntaxi, Tab. II.  $\Gamma$  in femore; testus Adductore longo femoris  $\Delta$ , Vasto interno  $\Phi \Sigma$ , Psoa magno z cum Iliaco interno y, Obliquo interno abdominis O in trunco; & delitescens etiam post Cremasterem p q in trunco. Dein Tab. I. E in femore; pariter testus Adductore longo femoris D, & praeterea Sartorio H, & Obliquo externo abdominis v in trunco; & delitescens quoque post Cremasterem z in trunco.

A latere, Tab. IX. n in sinistra coxa, pedeque.

### FIGURAE VI.

#### *Pectinei extremum, à parte posteriore.*

a a Pars carnea hic truncata.

b Extremum tendineum, c c insertum asperae ossis femoris lineae, à trochantere minore aliquantum deorsum ductae.

Adde Fig. 5.

### FIGURAE VII.

#### *Obturator externus, à parte posteriore.*

a Pars quae foramen magnum ossis coxae obturat.

b b Originis pars ab interiore margine foraminis magni ossis coxae,

c Extremitas tendinea. Tendo extremus infertus posteriori parti lateris interni radices trochanteris majoris.

Adde Fig. 8.

In Syntaxi, Tab. VIII.  $\epsilon \rho \sigma \tau$  in coxa; ex parte delitescens post Adductorem magnum femoris  $\omega$ . Dein Tab. VII.  $\Sigma \Sigma \Phi$  in coxa; testus Obturatore interno  $\Theta \Pi$ , & ex parte delitescens post Adductorem magnum femoris O, & Semimembranosum B, in femore. Dein Tab. VI. v v in inferiore trunci parte; testus Obturatore interno w y, Geminorum inferiori s, Quadrato femoris z; delitescensque ex parte post Coccygeum d: & qua nudus, post Gluteum magnum in Tab. V.  $\gamma$  in nate.

### FIGURAE VIII.

#### *Obturator externus, à parte priore.*

a a Principium tendinosum, b b b procedens à priori parte ossis pubis & ischii, ab iisque, qua dimidiam, eamque priorem, partem ambitus foraminis magni ossis coxae faciunt, à superiore foraminis parte ad ima usque oriens.

Adde Fig. 7.

In Syntaxi, Tab. IV.  $\alpha \beta$  in trunco; testus Adductore magno femoris  $\kappa \lambda$  in femore, & Psoa magno cum Iliaco interno x. Dein Tab. III.  $\phi \chi$  in trunco & femore; eodem modo testus Adductore magno femoris  $\Delta$ , & Psoa magno cum Iliaco interno  $\upsilon$ , & praeterea Adductore brevi femoris  $\psi \omega$ . Et quod nudum in Tab. III. id in II. subjacet Pectineo  $\Gamma$  in femore.

## CRURIS.

Adde Tab. XXIII. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

### FIGURAE IX.

#### *Semimembranosus, à parte priore.*

a Tendo, quo incipit.

b Caudae tendinae ortus ex carne: c quae post in totum tendo, d praecipue infertus capiti superiori tibiae, mox sub summo rotundulo margine ejus, ab interno latere, juxta partem posteriorem.

e Aponeurosis prior, inserta margini tibiae, ab ea parte, cui ipsa se caudae pars praecipua affigit.

Adde Fig. 10. a--g.

In Syntaxi, Tab. III.  $\Pi \Sigma \Phi$  in femore; testus Gracili  $\Psi$  A B, Adductore magno femoris  $\Delta \Theta \Lambda$ , & supra Quadrato. Caeterum, quod in hac III. Tab. nudum, in II. testum Vasto interno  $\Sigma$  in femore. In prima etiam post caput interius Gemelli.

### FIGURAE X.

#### *Semimembranosus, & Bicipitis cruris caput breve, à parte posteriore.*

a--g Semimembranosus.

a Tendo, quo incipit, b oriturque à superiore parte dorfi tuberis ischii, juxta externum latus.

c Venter carneus.

d Caudae tendinae ortus ex carne.

e Pars caudae illius praecipua, pertinens ad caput superius tibiae.

f Ejusdem aponeurosis posterior, quam inserit eminentiae obliquae & inaequabili, quae infra posteriorem partem radices capitis superioris tibiae, qua id sustinet condylum internum femoris.

g Aponeurosis prior, quam inserit margini interno tibiae.

Capiti ejus, superiorique parti ventris, à Semitendinoso sinus impressus.

Adde Fig. 9.

In Syntaxi, Tab. VII. A--G in femore; testus Gracili H I. Dein Tab. VI.  $\phi \Gamma$  in femore; testus eodem modo Gracili  $\varsigma \tau$ , & praeterea Semitendinoso  $\sigma \varsigma$ , & Bicipite cruris  $\theta \lambda$ . Dein Tab. V.  $\nu \xi \omicron$  in femore; testus iisdem, quibus in Tab. VI. & praeterea Gemello  $\Pi \Sigma$  in crure.

A latere, Tab. IX. P Q R S in pede dextro.

h &c. Bicipitis cruris caput breve.

i Oritur fere in media longitudine femoris, ab inferiore parte asperae eminentiae, quae per longitudinem posticae partis femoris porrecta. Oritur & à sepimento tendineo, quod ipsi Vastoque externo interjectum.

k k Rescissa pars tendinis, quae à capite longiore oritur.

l Pars tendinis, quae augetur accessione carnis capitis brevioris.

m Extremus tendo, n infertus exteriori parti capitis superioris fibulae.

Adde Fig. 11. g--p. & Fig. 12. a--g.

In Syntaxi, Tab. VII. P &c. in femore. Dein Tab. VI.  $\lambda \lambda$  &c. in femore; testum capite longiore  $\theta \mu$ . Sic & Tab. V.  $\tau \tau$  &c. in femore; testum longiore  $\sigma \upsilon$ .



# TABULAE MUSCULORUM SECUNDAE ET VIGESIMAE EXPLANATIO.

## FIGURAE XI.

### *Semitendinosus & Biceps cruris, à parte posteriore.*

- a--f *Semitendinosus*.  
 a Principii pars tendinea, b oriens à dorso tuberis ischii, cum capite longiore Bicipitis cruris; & deinde c c conjuncta cum principio tendineo capitis illius; à quo principio abscedit.  
 d Carneae principii partis, quae aliis tendinea, ortus à dorso tuberis ischii.  
 e Tendo, in quem abit.  
 f Vestigium à Gluteo magno impressum.  
 Adde Fig. 12. h--m.  
*In Syntaxi*, Tab. VI.  $\sigma$ -- $\varsigma$  in femore; testus Bicipitis cruris capite longiore  $\theta$ , & in fine post Semimembranosum  $\Gamma$ . Dein Tab. V.  $\pi$   $\epsilon$  in femore; testus pariter Bicipitis cruris capite longiore  $\sigma$ , & Semimembranoso  $\theta$ , praetereaque Gluteo magno  $\gamma$  in nate.  
 A latere, Tab. IX. T U in pede dextro, & z in femore sinistro.  
 g & c. *Biceps cruris*.  
 g Caput longius.  
 h Tendo, quo incipit, i oriturque fere à medio partis superioris dorsi tuberis ischii, à principio conjunctus cum principio Semitendinosi.  
 k k Caput brevius.  
 l Tendo communis, in quem desinunt duo capita; l oriens primum è superficie carnis capitis longioris, m auctus deinde accessione capitis brevioris, posteaque n brevi extremo pertinens o ad exteriorem partem capitis superioris fibulae.  
 p Vestigium à Gluteo magno impressum.  
 Adde Fig. 10. h--n. & Fig. 12. a--g.  
*In Syntaxi*, Tab. VI.  $\theta$ -- $\xi$  in femore. Dein Tab. V.  $\sigma$ -- $\chi$  in femore; testus

Gluteo magno  $\gamma$  in nate.  
 A latere, Tab. IX.  $\alpha$ -- $\zeta$  in pede sinistro.

## FIGURAE XII.

### *Biceps, & Semitendinosus, à parte priore.*

- a--g *Biceps cruris*.  
 a Caput longius. b tendo, quo incipit, quique per ejus principium, ab ea parte, qua contingit Semitendinosum, diu excurrit.  
 c Caput brevius.  
 d Tendo extremus: cujus e pars praecipua, f exteriori parti capitis superioris fibulae inserta: g pars ad tibiam pertinens, ad exteriorem partem ejus, ante caput fibulae.  
 Adde Fig. 11. g--p. & Fig. 10. h--n.  
*In Syntaxi*, Tab. III. C D E F in femore; caeterum post os femoris, & Adductorem magnum femoris  $\Delta$   $\Delta$   $\Theta$ . Dein Tab. II.  $\varsigma$   $\varsigma$   $\tau$  in femore & crure; ubi post Vastum externum  $\delta$ . Dein Tab. I.  $\Xi$   $\Pi$   $\Sigma$  in femore & crure; eodem modo post Vastum externum P, postque caput externum Gemelli, principiumque Plantaris.  
 h--m *Semitendinosus*.  
 i Tendinea pars principii; quae k k conjuncta cum principio tendineo capitis longioris Bicipitis cruris; à quo principio abscedit.  
 l l Tendo, in quem abit; m insertus lateri interno tibiae, mox infra Gracilem.  
 Adde Fig. 11. a--f.  
*In Syntaxi*, Tab. II.  $\epsilon$  in crure; caeterum post Gracilem  $\pi$   $\sigma$ , & Adductorem magnum femoris. Dein Tab. I.  $\alpha$  in crure; subiectus Sartorio  $\Psi$ .









# TABULAE ANATOMICAE TERTIAE ET VIGESIMAE MUSCULORUM HOMINIS E X P L A N A T I O.

## CRURIS RELIQUI.

Adde Tab. XXII. Fig. 9. 10. 11. 12.

### FIGURAE I.

#### Popliteus.

a Tendo, quo incipit, b oriturque è finu, qui est in medio partis inferioris lateris externi condyli exterioris femoris, mox supra marginem, quo is in tibia innititur.

Pars, quae oriri solet aut à genu cartilagine semilunari exteriori, aut à ligamento lato genu articuli, ea, quia subjacet musculo, exprimi nequivit.

c Pars tendinosa.

d d Extremum, quo se inferit illi parti amplitudinis posterioris tibiae, quae est inter radicem capitis ejus superioris, eminentiamque obliquam, unde Solei origo: totaque ultimi extremi latitudine pertinet ad internum marginem tibiae, qui nempe spectat alterum crus.

In *Syntaxi*, Tab. VII. W X Y in crure; testus Bicipite cruris R S in femore, Gemelli capite exteriori T in crure, Semimembranoso G. Dein Tab. VI. A E Π in crure; testus pariter Bicipite cruris ξ in femore, Gemelli capite exteriori Θ in crure, Semimembranoso Γ, & praeterea Plantari Σ, & Soleo A Ψ. Dein Tab. V. Δ in crure; testus Bicipite cruris φ χ in femore, & Gemello Λ Π in crure.

### FIGURAE II.

#### Rectus cruris, à latere.

a Tendo praecipuus, quo b b oritur à superiore parte tuberculi, quod in ora priore ossis ilium.

c Principium tendineum alterum, d d oriens à superiore & eadem posteriore parte marginis acetabuli, & à vicina parte capsulae articulum coxae continentis.

e Ab his principiis venter extrinsecus aliquandiu tendinosus.

f Tendo, in quem definit, g ex interiore parte musculi cito nasci incipiens. h hic truncatus.

Adde Fig. 3.

In *Syntaxi*, Tab. IX. λ--θ in pede sinistro; testus Sartorio p, & Tenfore vaginae femoris q: & A B C in dextro.

### FIGURAE III.

#### Rectus cruris, à parte priore.

a Tendo praecipuus, b b oriens ab interiore parte tuberculi, quod in ora priore ossis ilium.

Juxta c principium tendineum alterum.

d Venter aliquandiu tendinosus, excurrentibus principiis tendineis.

e e Hinc fibrae ventris, quae in superficie sunt, à latitudine media in utrumque latus oblique deorsum vergunt.

f Tendo, in quem definit; g. g quique se hic patellae inferit: & subtus e-tiam inter g g.

h Aponeurosis, quae à tendine Recti excurrit per priora patellae, postea-que se priori parti ligamenti adjungit, quod à patella ad tibiam pertinet.

Adde Fig. 2.

In *Syntaxi*, Tab. I. T--X in femore; testus Sartorio H, & Tenfore vaginae femoris M. Dein Tab. II. x, & ι κ λ in femore; testus Iliaco interno y, & Gluteo minore u in trunco.

i Ligamentum à patella ad tibiam pertinens.

k k Locus ubi subtus à patella oritur.

l l Hic tibiae insertum, totaque subtus hac parte m.

In *Syntaxi*, Tab. I. Δ Θ Λ in crure. Et Tab. II. μ ν ξ in crure.

A latere, Tab. IX. D E F G in pede dextro: & σ τ υ in sinistro.

### FIGURAE IV.

#### Sartorius.

a Principium extrinsecus tendinosum, b oriens ab extremo priore cristae ilium, proximaque parte orae prioris.

c Tendo, in quem abit; d d tibiae interno lateri juxta inferiorem partem tuberis, cui adnexum ligamentum à patella procedens, insertus.

In *Syntaxi*, Tab. I. H I Φ Ψ Ω in femore & crure; ex parte delitescens post Vastum internum Y.

A latere, Tab. IX. K L M in pede dextro: & p in sinistro.

A parte posteriore, Tab. V. λ in femore.

### FIGURAE V.

#### Gracilis.

a Principium tendineum, juxta synchondrossem pubis oriens b à ligamento

synchondrossem illam constringente. Oritur & infra eam, à margine ossis pubis.

c Vestigium ab Adductore longo impressum.

d Tendo, in quem abit; e tibiae insertus, mox sub insertione tendinis Sartorii.

In *Syntaxi*, Tab. III. Ψ--B in femore. Dein Tab. II. Λ E ο π in femore & crure; in fine aliquantum testus Semitendinoso g; ex parte delitescens post Vastum internum Σ, & testem cum Cremastere p in trunco. Dein Tab. I. B in femore; caeterum testus Sartorio H Φ Ψ, & delitescens post Vastum internum Y, & testem cum Cremastere z in trunco.

A parte posteriore, Tab. VII. H I in femore; supra post os pubis, infra post Semimembranosum E. Dein Tab. VI. σ τ in femore; infra post Semitendinosum ζ, supra delitescens post Transversos perinaei h. g in inferiore trunci parte. Dein Tab. V. ι κ in femore; infra post Semitendinosum g, & Sartorium λ; supra post Gluteum magnum γ in nate.

A latere, Tab. IX. N O in pede dextro.

e Ligamentum, quo synchondrosis pubis à priori parte constricta.

### FIGURAE VI.

#### Vastus internus, & externus, à parte posteriore.

a a b Vastus internus.

a a Origo ab obliqua eminentia, quae infra trochanterem minorem porrecta, ab ima radice colli femoris ad longam illam posteriorem femoris spinam pertinet; & deinde secundum hujus longitudinem totam, à parte ejus interiore.

b Pars à tota principii latitudine diu tendinosa.

Adde Fig. 7. k--p.

In *Syntaxi*, Tab. VI. υ in femore; testus Gracili σ τ, Semimembranoso φ φ χ, Adductore magno femoris ε. Dein Tab. V. μ in femore; testus iisdem, & praeterea Sartorio λ.

c c d e Vastus externus.

c c Origo ab externa parte radice trochanteris majoris, & secundum exteriorem spinam totius, quae à trochantere majore fere usque ad condylum externum eminet.

Partim quoque abscedit à sepimento tendineo, quo distinguitur à Bicipitis parte brevior; hic remoto.

d e Pars tendinosa. e vestigium à Gluteo magno impressum.

Adde Fig. 7. a--i.

In *Syntaxi*, Tab. VI. β--δ in femore; testus Bicipite cruris θ λ μ ν. Dein Tab. V. ψ ω in femore; testus pariter Bicipite cruris σ τ υ φ, & praeterea post Gluteum magnum γ in nate.

### FIGURAE VII.

#### Vastus externus, & internus, cum Crurali, à parte priore.

a b c d e f f f g h i i Vastus externus.

b c Ortus ejus ab eminentia obliqua, quae in priori parte femoris ad radicem colli inter trochanteres est: c d ab externa parte radice trochanteris majoris.

e Pars principii tendinosa.

f f f g Insigne vestigium à Recto cruris impressum.

g h Tendo, i i insertus margini patellae, à parte externa, eique finitima superiore.

Adde Fig. 6. c c d e.

In *Syntaxi*, Tab. II. δ--θ in femore; testus Recto cruris ι κ. Dein Tab. I. P--S in femore; testus Recto cruris T V, & Tenfore vaginae femoris M O.

A latere, Tab. IX. η θ ι κ in pede sinistro.

k l m n n o p p Vastus internus.

l l Hic vestigium à Recto cruris impressum.

m Ortus ab obliqua eminentia, quae infra trochanterem minorem ab ima radice colli femoris porrecta.

n n Hac parte carnem adjungit ad tendinem Cruralis.

o Tendo, p p insertus margini patellae, à parte interna. Supra autem pone tendinem Vasti externi, connexus cum eo, procedit ad patellae marginem.

Adde Fig. 6. a a b.

In *Syntaxi*, Tab. II. Σ--α in femore; testus Recto cruris ι κ. Dein Tab. I. Y Z Γ in femore; testus Recto cruris T V, & Sartorio H.

A latere, Tab. IX. H I in pede dextro: & π ς in sinistro.

q r s Cruralis.

r Tendo è priori parte carnis nascens. Is se non multum supra genu, Vastorum tendinibus adjungit, ac dein post eos inferit superiori parti patellae.

s Summus ortus, ab eminentia obliqua, quae in priori parte femoris ad radicem colli inter trochanteres. Porro autem à superiore plusquam dimidia parte longitudinis femoris oriri pergit, à priore exteriori ejus parte.

In *Syntaxi*, Tab. II. β γ in femore; testus, ut hic, Vasto externo δ--θ, & interno Σ--α; praeterea Recto cruris ι κ. Et quod ibi nudum, id in Tab. I. post Rectum cruris T in femore.



# TABULAE MUSCULORUM TERTIAE ET VIGESIMAE EXPLANATIO.

## VAGINAE TENDINEAE FEMORIS.

### FIGURAE VIII.

#### Tensor vaginae femoris.

a Principium tendineum, b oriens ab exteriori parte extremi prioris crurae

ilium.


c Extremum, unde rescissa pars tendinea, quam adjungit vaginae tendineae femoris.

In Syntaxi, Tab. I. M N O in femore; testis Sartorio H I.

A latere, Tab. IX. q r s in sinistra coxa, pedeque.









# TABULAE ANATOMICAE QUARTAE ET VIGESIMAE MUSCULORUM HOMINIS E X P L A N A T I O.

## P E D I S E X T R E M I.

Adde *Peroneum tertium* Tab. XXV. Fig. 1. a  $\theta$  & x.

### FIGURAE I.

*Peroneus brevis, à parte posteriore.*

a Pars originis à fibula. Infra partem illam subtus pergit oriri à spina, quae à posteriore parte latitudinem lateris externi fibulae terminat; haud ita procul à malleolo oriri à spina illa desinens.

b c d Tendo. c hac parte, qua se ad malleolum inflectit, latior & crassior; ubi continetur ligamento, quod vide Tab. V. n in crure: d hac quoque parte crassior & latior; ubi juxta superiorem partem eminentiae calcanei per ligamentum alterum incedit; quod vide Tab. V. o in pede extremo, & Tab. IX. F in pede sinistro.

e Infertus superiori eidemque posteriori parti radices illius tuberis, quod est in osse metatarsi quinto, ab exteriori parte capitis ejus primi.

Adde Fig. 2.

In *Syntaxi*, Tab. VIII. M--R in crure & pede extremo. Dein Tab. VII. u--x in crure & pede extremo; testus Peroneo longo m p q & c. Dein Tab. VI. I--M in crure & pede extremo; testus eodem modo Peroneo longo N P Q & c. Dein eodem modo Tab. V. g--k in crure & pede extremo; testus Peroneo longo l m.

### FIGURAE II.

*Peroneus brevis, à parte priore.*

a a Origo à latere externo fibulae; infraque à spina, quae à posteriore parte latitudinem lateris externi terminat.

Ex parte etiam oritur à vagina tendinea cruris, ejusque propagine, interferta Peroneo huic longoque ab una parte, ab altera Extensori longo digitorum & Peroneo tertio.

Adde Fig. 1.

In *Syntaxi*, Tab. IV.  $\omega$   $\Gamma$   $\Delta$  in crure. Dein Tab. III. MO in crure; testus Peroneo longo GL. Dein in Tab. II.  $\omega$  in crure; testus Peroneo longo  $\phi$   $\psi$ , & Extensori longo digitorum pedis cum Peroneo tertio A--E. Dein Tab. I.  $\sigma$  in crure; eodem modo testus Peroneo longo  $\sigma$   $\xi$ , & Extensori longo digitorum pedis cum Peroneo tertio  $\tau$   $\phi$   $\chi$   $\psi$ .

A latere, Tab. IX. BBCCDDE in pede sinistro; subjectus Peroneo longo  $\Sigma$   $\Psi$   $\Omega$ .

Praeterea Tab. X. Fig. 20. y, & 21. A, & 22. a.

### FIGURAE III.

*Peroneus longus, à parte posteriore.*

a Principium alterum, b oriens à laterali externa parte partis prioris radices capitis superioris fibulae.

c d e Alterum, c d e oriens à plusquam dimidia, eaque superiore, parte illius spinae fibulae, quae in externo ejus latere, non multum infra caput superius eminere incipit: sed à d ad e subtus oritur.

f Tendo: cujus g nodus primus, qua se ad posteriora malleoli externi flectit: h secundus, qua ad eminentiam, quae est in latere externo calcanei: i tertius, qua ad os cubiforme.

Ligamenta, quibus tendo ad malleolum, & ad calcanei tuberculum retinetur, vide Tab. V. n, & p in crure & pede extremo. Adde A in pede sinistro Tab. IX.

Adde Fig. 4. & 5.

In *Syntaxi*, Tab. VII. m--t in crure pedeque extremo. Dein Tab. VI. NO--T in crure pedeque extremo; testus Soleo  $\Omega$   $\Psi$ . Dein Tab. V.  $\Theta$  l m m in crure pedeque extremo; testus pariter Soleo a b.

### FIGURAE IV.

*Peroneus longus, à parte priore.*

a Principii superioris ortus à laterali externa parte partis prioris radices capitis superioris fibulae: b à vicina à priori parte tibiae.

c d d Principii inferioris ortus à plusquam dimidia, eaque superiore, parte illius spinae fibulae, quae in externo ejus latere, non multum infra caput superius eminere incipit.

Ex parte etiam abscedit à vagina tendinea cruris, ejusque propagine, quae inter hunc Peroneum & Extensorem longum digitorum interjecta.

e e Vestigium ab Extensore longo digitorum impressum.

f Pars interior, sinuata; cui Peroneus brevis infidet.

g Tendo, è carnis parte exteriori nascens.

Adde Fig. 3. & 5.

In *Syntaxi*, Tab. III. G--L in crure; ubi partim testus Peroneo brevi M. Dein Tab. II.  $\phi$   $\chi$   $\psi$  in crure; testus Peroneo brevi  $\omega$ , & Extensore longo digitorum pedis A. Dein Tab. I.  $\sigma$   $\pi$   $\xi$  in crure; eodem modo testus Peroneo

brevi  $\sigma$ , & Extensore longo digitorum pedis  $\tau$   $\nu$ .

A latere, Tab. IX.  $\Sigma$ -- $\Omega$  in pede sinistro; subjectus Soleo  $\omega$ .

### FIGURAE V.

*Peroneus longus, in planta pedis.*

a Tendo; cujus b nodus, qua applicatus ad calcanei eminentiam, quae est in latere ejus externo: c nodus insignior, qua se flectit ad eminentiam, quam os cubiforme ab inferiore parte habet; perque sinum illum ejus incedit, qui ante eminentiam illam.

d Extremo suo insertus imae deorsum maxime eminenti parti ossis metatarsi pollicis.

e Portio à tendine abscedens, quae se circum tuber ossis cubiformis flectit, inque duas partes abit f. g, insertas h. i ossi cuneiformi magno.

k Portio alia à tendine abscedens, l insertaque ossi metatarsi secundo.

Quomodo in sinu cubiformis retineatur à ligamento, id vide Tab. X. Fig. 21. N O.

Adde Fig. 3. & 4.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 22. b--i. Dein Fig. 21. B C D, & inter r & l; ubi sub ligamento, quo retinetur, sub N O; & testus Adductore pollicis l m, & Flexore brevi o p r. Dein Fig. 20.  $z$   $\alpha$   $\beta$ ; caeterum sub iisdem, ac in Fig. 21. & sub Flexore longo digitorum cum Lumbricalibus. Et qua nudus in Fig. 20. ea in 19. testus Abductore digiti minimi pedis A B.

### FIGURAE VI.

*Tibialis anticus.*

a a Ortus à tibia; primum mox ante Extensoris digitorum longi ortum, occupans deinde ortu suo totam planitiei externae tibiae, à capite ejus secundum spinam priorem fere usque ad medium tibiae longitudinis, latitudinem; & ex parte etiam affixus proximo ligamento, cruris ossium intervallo interferto. Sed & inde per cruris longitudinem ab eodem ligamento, & inprimis à tibia, juxta ligamentum illud, oriri diu, & ad duas tertias longitudinis tibiae partes plus minus usque, pergit.

b Pars vaginae tendinae cruris, à qua Tibialis hic subtus abscedit: c c hic truncata, ubi is non amplius abscedit ab ea.

Oritur & à vaginae illius propagine, quae interferta Tibiali huic & Extensori longo digitorum pedis.

d Tendo, in quem abit. Quomodo is incedat sub cornubus ligamenti, quo tendines in flexu ad pedem extremum coercentur, id vide Tab. I. r t in crure & pede extremo, & Tab. IX.  $\iota$   $\kappa$  in pede dextro, & Y Z in sinistro.

Adde Fig. 7.

In *Syntaxi*, Tab. I. n--p in crure & pede extremo; ubi ex parte in imo testus Abductore pollicis pedis A.

A latere, Tab. IX. U V W in pede sinistro: &  $\eta$   $\theta$  in dextro.

### FIGURAE VII.

*Tibialis antici extremum bicornae, in planta pedis.*

a Extremitas cornu alterum, b insertum rotundae illi laevique superficiei, quae in ossis cuneiformis magni parte interiore eademque inferiore & finitima ossi metatarsi primo.

c Alterum, idque tenuius, mox ante finem praecedentis insertum d eminentiae, quae in capite primo ossis metatarsi pollicis, ab interno latere, atque ibi fere in medio.

Adde Fig. 6.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 22. k. l. Dein Fig. 21.  $\zeta$   $\eta$ ; ubi pars testis Flexore brevi pollicis pedis y. Dein eodem modo Fig. 20. i. k; testis parte Flexore brevi p. Et quod nudum, id in Fig. 19. testum Abductore pollicis F.

### FIGURAE VIII.

*Soleus, à parte priore.*

a a b c c Origo à capite superiore fibulae, magnaue portione spinae, quae infra caput illud à posteriore parte eminet.

d e f f Origo, d e à tibiae eminentia, quae in ejus posteriore parte, non longe à capite superiore obliqua jacet; & ubi illa desinit, e f f continuo à a gine posteriore spinae interioris tibiae, ultra mediam ossis hujus longitudinem.

g. h Superficies tendinosae, longe excurrentes.

i i Pars tendinea, carnem bifariam septi modo distinguens. Intus autem in carne fere in ipso summo initio musculi incipit.

k k. l l Carnes, quae ex utroque latere descendendo convergunt, acceduntque ad septum tendineum i i.

m. n Mucrones, in quos caro ab utroque latere abit; quorum interior n crassior, insignior, excurrentisque longius.

Inveni & carnes illas ab inferiore parte conjunctas in unum, unoque simul mucrone, eoque insigniore, desinentes.

o Tendo, in quem abit; p hic rescissus à calcaneo.

[R r]



# TABULAE MUSCULORUM QUARTAE ET VIGESIMAE EXPLANATIO.

q Superficies tendinosa, qua tendo ab hac parte incipit.  
Adde Fig. 9.

In *Syntaxi*, Tab. I. ξ ε η in crure; ubi caeterum tectus Peroneo longo o π ε,  
& Flexore longo digitorum pedis θ κ, & Tibiali postico λ: adde ν. Et Tab. II.  
υ N P in crure; eodem modo tectus Peroneo longo φ ψ, & Flexore longo digi-  
torum pedis Q S, & Tibiali postico V: adde Y.  
r r r r Hic truncatum os tibiae.  
s s Hic truncata fibula.

## FIGURAE IX.

### *Soleus, à parte posteriore.*

a Ortus à fibulae capitis superioris posteriore parte.  
b Pars tendinea principii, quod à tibia oritur c c. Oritur autem à tibiae e-  
minentia, quae in ejus posteriore parte, non longe à capite superiore, obli-  
qua jacet.  
d d Superficies tendinosa, qua tendo in posteriore parte incipit.  
e e Nota incisurae similis, ubi intus in carne pars tendinea, carnem illam  
septi tendinei modo distinguens.  
f Tendo, in quem abit.  
g g Hinc rescissus Gemelli tendo, ubi se primum tendini Solei adjungit. Ad-  
jungit obliquo ductu, citius ab exteriori parte pedis.  
h Tendo Achillis, i i infertus posticae eidemque inferiori parti prominentis  
tuberis calcanei, quod calcem efficit.  
Adde Fig. 8.

In *Syntaxi*, Tab. VI. Ω--E in crure; ubi partem integit Plantaris φ. Dein  
Tab. V. a a b in crure; tectus Gemello Λ--Φ.  
A latere, Tab. IX. ω Δ Θ in pede sinistro; tectus Gemello φ ψ: & Γ Δ in  
dextro; tectus Gemello W X, & Plantari Λ.

## FIGURAE X.

### *Gemellus.*

a b c d e e f Caput interius, principiis duobus, iisque tendinosis b. d, inci-  
piens. Quorum  
b inferius crassius tendo est, oriturque c c mox supra posteriorem partem  
condyli interni femoris, juxta latus internum:  
d superius tenue, e e oritur à margine partis posterioris femoris, juxta la-  
tus internum, mox supra principium inferius.  
f Superficies tendinosa, ab excurrente principio tendineo effecta.  
g h i i k Caput exterius, h principio tendineo i i oriens ab eminentia oblon-  
ga, quae in latere externo femoris, juxta partem posteriorem, mox supra fi-  
num, è quo nascitur Popliteus.  
k Superficies tendinosa, quam efficit excurrentis principium tendineum.  
l m Mucrones duo, in quos caro definit.  
n Tendo, qui se tendini Solei adjungit.  
In *Syntaxi*, Tab. V. Λ--Φ in crure; capite exteriori subjacens Bicipiti cru-  
ris τ φ in femore: interiore Semimembranofo ν ξ o. Et praeterea Tab. VI.  
Δ & Θ in femore: & Tab. VII. T & U in femore.  
Praeterea à priori parte, Tab. I. β γ δ ν ν in crure. Et à latere, Tab. IX.  
φ χ ψ Θ in pede sinistro: & V--Y in dextro.  
o Tendo Solei, p hic truncatus.  
q Tendo Achillis, r r infertus posticae eidemque inferiori parti prominentis  
tuberis calcanei, quod calcem efficit.

## FIGURAE XI.

### *Plantaris.*

a a Ortus à radice condyli externi femoris, mox juxta internam partem or-  
tus Gemelli.  
b Tendo, in quem abit. Infertus interno lateri calcanei, juxta finem ten-  
dinis Achillis: quod vide Tab. IX. E in pede dextro.  
In *Syntaxi*, Tab. VI. Σ φ in femore & crure; à principio subjectus Gemel-  
li capiti exteriori Θ, & Bicipiti cruris λ; in fine post tendinem Achillis D. Dein  
Tab. V Γ c in femore & crure; subjectus itidem Gemello Λ--Φ, & Bicipiti  
cruris τ; in fine post tendinem Achillis Ψ. Et praeterea Tab. VII. V in femore.  
Praeterea à priori parte, Tab. II. T in crure. Et Tab. I. μ in crure. Et  
à latere, Tab. IX. Λ E in pede dextro: & Π in sinistro.

## FIGURAE XII.

### *Tibialis posticus, à parte posteriore.*

a a Origo à tibia: unde extrinsecus tendinosus b b. Oritur autem à tibiae  
planitie, quae mox à radice illius partis, cui fibula innixa, deorsum per eam  
partem, qua fibulam spectat, aliquantum porrecta.  
c Principium à fibula oriens. A ejus deinde planitie illa tota oriri pergit,  
quae à superiore capite ejus, per plus quam duas tertias partes longitudinis, qua  
tibiae obversa, se extendit: vide Tab. IV. υ υ in crure. Ex parte etiam à liga-  
mento incipit, quod inter cruris ossa, qua dehiscunt, medium.  
d d Superficies tendinosa partis illius, quae à fibula oritur.  
e f Tendo, e hac parte ex carne oriens, f hac pone malleolum internum  
procedens, qua crassior & durior. Juxta malleolum quomodo ligamento reti-  
neatur, exhibitum Tab. V. e in crure, & Tab. I. u in crure & pede extremo,  
& Tab. IX. δ in pede dextro.  
Adde Fig. 13. & 14.  
In *Syntaxi*, Tab. VIII. E--L in crure. Dein Tab. VII. Z--d e in crure;  
subjectus Popliteo W Y, Flexori longo pollicis pedis h, Flexori longo digito-  
rum pedis f. Dein Tab. VI. G in crure; caeterum tectus Soleo Ω &c. Sic  
& Tab. V. d in crure.

## FIGURAE XIII.

### *Tibialis postici, à parte priore.*

a Tendo ad malleolum internum procedens: post infra eum, b per latus in-  
ternum pedis extremi; ubi ligamento retinetur, x in pede extremo Tab. I. &  
ζ in pede dextro Tab. IX.  
c Tendinis pars praecipua inserta in inferiora maxime eminenti parti tuberis  
crassi & inaequabilis, quo os naviculare ab interno pedis latere eminet.  
d Tendinis excurrentis portio tenuior, inserta e ossis cuneiformis primi parti  
inferiori, juxta posteriora.  
Adde Fig. 12. & 14.  
In *Syntaxi*, Tab. IV. π--ψ in crure & pede extremo. Et Tab. III. P--R  
S--U in crure & pede extremo. Dein Tab. II. F V W X in crure & pede ex-  
tremo; tectus Extensore longo digitorum pedis A, & Extensore proprio pol-  
licis H I. Dein Tab. I. λ γ in crure & pede extremo; ubi quod in crure Tab.  
II. nudum, id subjectum Tibiali antico n in crure: extremum tectum Abduc-  
tore pollicis pedis A in pede extremo.  
Praeterea à latere, Tab. IX. β β γ in pede dextro.

## FIGURAE XIV.

### *Tibialis postici tendo, in planta pedis.*

a Hic truncatus.  
b Nodus, qua ad tali caput (interveniente ligamento, quod à calcaneo ad os  
naviculare per plantam deductum, sustinet tali caput) & ad inferiorem quoque  
& eandem posteriorem partem tuberis ossis navicularis applicatus.  
c Hic tendinis pars praecipua subtus naviculari inserta, in inferiora maxime  
eminenti parti tuberis crassi & inaequabilis, quo os illud ab interno pedis latere  
eminet.  
d d Hic excurrente portione tenuiore infertus ossis cuneiformis primi parti  
inferiori, juxta posteriora.  
e Portio tenuior, quae se f inserit imae deorsum protuberanti parti ossis cu-  
neiformis tertii: excurritque praeterea g ad os metatarsi secundum, & h ad  
tertium; eorumque capitis primi parti inferiori se inserit, ab illo latere, quo  
spectant digitum minimum. Dat & portionem i Flexori pollicis brevi, k  
hic ab eo rescissam.  
l Alia à tendine abscedens portio, in duas m. o abeuns: quarum altera m,  
inserta n calcanei inferiori parti, prope cubiforme, haud longe à margine ejus  
illo, qui est juxta talum: altera o, inserta p inferiori parti ossis cubiformis,  
haud longe à postica parte cuneiformis tertii.  
Adde Fig. 13. & 12.  
In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 21. E F G H I; ubi pars tecta Flexore brevi polli-  
cis pedis p, Adductore pollicis l k, & tendinibus Peronei longi. Dein Fig. 20.  
f g h; tectus tendine Flexoris longi digitorum pedis A B, capiteque ad eum in  
planta accedente C D, & Flexoris longi pollicis tendine b. Post in Fig. 19.  
subjectus Abductori pollicis pedis F.









# TABULAE ANATOMICAE QUINTAE ET VIGESIMAE MUSCULORUM HOMINIS EXPLANATIO.

## DIGITORUM PEDIS MINORUM.

### FIGURAE I.

#### *Extensor longus digitorum pedis cum Peroneo tertio, à latere.*

a Extensor longus digitorum pedis cum Peroneo tertio conjunctus in unum.  
b b c c Prima pars principii, oriens b b à radice capitis superioris tibiae, mox ante fibulae caput superius: & c c à spina priore fibulae capitis illius.  
d Pars vaginae tendineae cruris, à qua subtus caro hujus principii procedit; hic e e, ubi nulla amplius abscedit caro, rescissa.  
Oritur etiam à propagine, quam vagina illa interfert Extensori huic & Tibiali antico.

f g h h Principii pars altera, quae ab initio tendinea g, oritur h h à fibulae spina priore, & quidem à margine ejus, qui spectat tibiam.

i i Principii tertia pars, ab initio i i maximam partem tendinea, k k oriensque à fibulae spina priore, & à planitie, in quam spina illa ab inferiore parte abit. Pars ejus, quae ad Peroneum pertinet, oritur etiam à propagine vaginae tendineae cruris.

l Tendo Extensoris longi digitorum, qui se in quatuor tendines m. n. o. p findit, per dorsum pedis ad digitos quatuor minores decurrentes.

Quomodo decurrat sub ligamento transverso, ad cruris pedisque extremi confinium, id vide Tab. IX. X in pede sinistro, & Tab. I. q in pede.

q Tendo Extensoris longi per dorsum digiti minimi decurrens. r extremum, insertum tuberculo oblongo transversoque, quod in capite primo ossis secundi ordinis hujus digiti, à superiore parte. s. t portiones ad os tertium procurentes, quae in extremum commune u abeunt, v superiori parti capitis primi ossis tertii insertum.

w Aponeurosis, quae ab hoc latere ad tendinem q accedit; producta ab Abductore minimi, à quo hic x rescissa.

Aponeurosem, quae ad alterum hujus, & caeterorum tendinum latus accedit, vide Tab. I. h in pede extremo: & Tab. II. q in pede extremo: & Tab. III. u in pede extremo. Eaque partim à capsula articuli digiti cum metatarso, partim ab Interosseo primo, partim à Lumbricali, partimque à latere ossis primi ordinis, procedit.

y. y. y Truncati tendines Extensoris brevis digitorum pedis.

z α Tendo communis Extensoris longi & brevis. z pars à brevi producta; α pars à longo: intermedia est divisionis nota. β extremum ossi secundi ordinis insertum, ut r in digito minimo. γ. δ portiones ad os tertium procurentes; quarum altera γ est Extensoris brevis, altera δ longi. ε earum commune extremum, ζ superiori parti capitis primi ossis tertii insertum.

η Aponeurosis, quae ab hoc latere ad tendinis communis partem illam accedit, quae ab Extensoris brevis tendine effecta. Abscedit illa ab Interosseo secundo hujus digiti, & à capsula articuli.

Eadem in digito tertio, & in secundo.

θ. x Tendo Peronei tertii, θ hic ex carne oriens, x hic insertus superiori parti radice capitis primi ossis metatarsi quinti, juxta commissuram cum quarto; indeque continuo superiori spinae ejusdem illius quinti.

Quomodo ad cruris pedisque extremi confinium decurrat sub ligamento, id vide Tab. IX. X in pede sinistro, & Tab. I. q in pede.

In Syntaxi, Tab. IX. G--R, & f--m in pede sinistro; testata parte Peroneo longo Z, & brevi B C.

A priori parte, Tab. II. A--E, & m--q in crure & pede extremo; testata parte Extensoris proprio pollicis pedis H I. Dein Tab. I. τ--h in crure pedisque; subiecta parte Extensori proprio pollicis pedis i, & Tibiali antico n.

Praeterea Tab. III. n. o. p. q. r. s. t. u in pedibus extremis. Et Tab. V. r. z. s in pede extremo. Et Tab. VI. U. V in pede extremo. Et Tab. VII. γ. γ in pede extremo. Et Tab. IX. o in pede dextro.

### FIGURAE II.

#### *Interossei pedis externi, seu bicipites, à superiore parte.*

a b b c d d e f Interosseus secundus digiti quarti.

a Caput crassius, b b oriens à plusquam dimidia posteriore parte lateris ossis metatarsi quinti, quod est è regione quarti.

c Caput tenuius, d d oriens à posteriore parte marginis inferioris ossis metatarsi quarti, quo respicit quintum.

e Tendo, f insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti quarti, quo spectat quintum.

Adde Fig. 3. a--e.

In Syntaxi, Tab. IV. Π in pede extremo. Dein Tab. VIII. S in pede extremo. Dein Tab. IX. q in pede sinistro; testatus Extensoris longi digitorum tendine O.

g h h i k k l m Interosseus secundus digiti tertii.

g Caput crassius, h h oriens fere à plusquam dimidia posteriore parte longitudinis lateris ossis metatarsi quarti, quo respicit tertium.

i Caput tenuius, k k oriens à posteriore parte marginis inferioris lateris ossis metatarsi tertii, quo respicit quartum.

l Tendo, m insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti tertii, quo spectat quartum.

Adde Fig. 3. f--k.

In Syntaxi, Tab. IV. Ξ in pede extremo. Dein Tab. III. inter k & l pedis extremi finistri; testatus Extensor brevis digitorum k. In Tab. II. testatus praeterea tendine Extensoris longi digitorum A E ad digitum quartum pertinente. Dein Tab. VIII. T in pede extremo. Dein Tab. IX. p in pede sinistro; testatus Extensor brevis digitorum d, & Extensoris longi tendine P.

n o o p q q r s Interosseus secundus digiti secundi.

n Caput crassius, o o oriens à plusquam dimidia posteriore parte medii lateris ossis metatarsi tertii, quo spectat secundum.

p Caput tenuius, q q oriens à posteriore parte lateris ossis metatarsi secundi, quo tertium respicit, & quidem ab inferiore margine eminentiae oblongae, quae per latus illud porrecta.

r Tendo, s insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti secundi, quo spectat tertium.

Adde Fig. 3. l--q.

In Syntaxi, Tab. IV. Λ in pede extremo. Dein Tab. III. inter i & k in pede sinistro; testatus Extensor brevis digitorum i. In Tab. II. testatus praeterea tendine Extensoris longi digitorum A E ad digitum tertium pertinente. Dein Tab. VIII. V in pede extremo. Dein Tab. IX. o in pede sinistro; testatus Extensor brevis digitorum c, & Extensoris longi tendine Q.

t u u v w x y z α Interosseus primus digiti secundi.

t Caput crassius, u u oriens à plusquam dimidia posteriore parte illius lateris ossis metatarsi secundi, quo primum spectat. v tendinea pars principii.

w Caput tenuius, x principio tendineo oriens y à superiore parte mucronis ossis cuneiformis magni, qui ossi metatarsi primo secundoque insertus.

z Tendo, α insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti secundi, quo pollicem spectat.

Cujusque autem capita fibras conjungunt inter se ad angulos acutos.

Adde Fig. 3. r--w.

In Syntaxi, Tab. IV. Θ in pede extremo. Dein Tab. III. m m in pede extremo; testatus Extensor brevis digitorum f h. Dein Tab. II. h in pede extremo; testatus Extensor brevis digitorum i k, & tendine Extensoris proprii pollicis pedis I K. Sic & Tab. I. L in pede extremo. Dein Tab. IX. n in pede sinistro; testatus Extensor brevis digitorum a b, & tendine Extensoris proprii pollicis S.

### FIGURAE III.

#### *Interossei pedis externi, seu bicipites, à parte inferiore.*

a b c d e Interosseus secundus digiti quarti.

b Tendinea principii pars.

c Ortus ab ossis metatarsi quarti capite primo, qua parte quintum respicit. Oritur & à ligamento, quod tendinem Peronei longi in planta retinet: vide Tab. X. Fig. 21. U P.

d Tendo, e insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti quarti, quo spectat quintum.

Adde Fig. 2. a--f.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 22. β γ δ; testatus Interosseo minimi ε. Dein Fig. 21. U V; testatus Interosseo minimi S, & Transversali pedis f g. Dein Fig. 20. μ ν; testatus Interosseo minimi λ, Transversali pedis g, Lumbricali quarto Z, & Flexoris longi digitorum pedis tendine M Q. Dein Fig. 19. X Y; testatus Interosseo minimi Z, Transversali pedis g, Lumbricali quarto c, tendine Flexoris digitorum pedis longi & brevis V, Flexore brevi digitorum T. Dein Fig. 18. m m; testatus Interosseo minimi o, Transversali pedis i, Lumbricali quarto h, tendine Flexoris brevis digitorum, ad digitum minimum pertinente; portione mediae aponeurosis plantae, ad digitum minimum pertinente G.

Praeterea Tab. VIII. Y in pede extremo.

f g h i k Interosseus secundus digiti tertii.

g Tendinea pars principii.

h Ortus à radice capitis primi ossis metatarsi tertii, qua parte quartum respicit.

i Tendo, k insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti tertii, quo spectat quartum.

Adde Fig. 2. g--m.

In Syntaxi, Tab. X. Fig. 22. v w x; testatus Interosseo primo digiti quarti y. Dein Fig. 21. Y Z; testatus Interosseo primo digiti quarti W, Transversali pedis f, Adductore pollicis k. Dein Fig. 20. o; testatus Transversali pedis g, Lumbricali tertio X, tendinibus O. P Flexoris longi digitorum, Adductore pollicis t. Dein Fig. 19. i; subiectus iisdem: & Fig. 18. l; iisdem subiectus, & portioni E mediae aponeurosis plantae.

l m n n o p q Interosseus secundus digiti secundi.

m Tendinea pars principii.

n n Ortus ab ossis metatarsi secundo, ante radicem capitis ejus primi, qua parte tertium respicit.

o Ortus ab ossis metatarsi tertio, juxta radicem capitis ejus primi, qua parte secundum spectat.

p Tendo, q insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti secundi, quo spectat tertium.



# TABULAE MUSCULORUM QUINTAE ET VIGESIMAE EXPLANATIO.

Adde Fig. 2. n--s.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 22. p q r; subjectus Interosseo primo digiti tertii s. Dein Fig. 21. c d; subjectus Interosseo primo digiti tertii a, Transversali pedis f, Adductore pollicis k. Dein Fig. 20. π; testus Transversali pedis g, Lumbricali secundo W, tendine N Flexoris longi digitorum. Dein Fig. 19. k, & Fig. 18. k; testus iisdem.

r s t u v Interosseus primus digiti secundi.

r Caput crassius.

s. t Tendineae partes principii.

u Ortus à plusquam dimidia posteriore parte illius lateris ossis metatarsi secundi, quo primum spectat.

v Tendo, w insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti secundi, quo spectat pollicem.

Adde Fig. 2. t--a.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 22. m n o. Dein Fig. 21. e; testus Transversali pedis f, & Adductore pollicis k l. Dein Fig. 20. inter Lumbricalem primum, & os metatarsi, osque primi ordinis digiti secundi; testus iisdem, quibus in Fig. 21. & praeterea Lumbricali primo V. Sic & Fig. 19. & 18.

## FIGURAE IV.

*Interossei pedis interni, ab inferiore parte.*

a b b c d e Interosseus digiti minimi.

b b Ortus à posteriore parte marginis inferioris illius lateris ossis metatarsi quinti, quo respicit pollicem.

c Pars tendinea principii.

Quomodo praeterea oriatur à ligamento, quod Peronei longi tendinem in planta retinet, id vide Tab. X. Fig. 21. S N.

d Tendo, e insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti quinti, quo id pollicem spectat.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 22. ε ζ η. Dein Fig. 21. S T; testus Flexore brevi digiti minimi Q, & Transversali pedis f h. Dein Fig. 20. λ; testus Flexore brevi digiti minimi t, Transversali pedis g, tendine M Q Flexoris longi digitorum, Lumbricali quarto Z. Dein Fig. 19. Z; testus Flexore brevi minimi a, Transversali pedis g h, tendine V Flexoris brevis digitorum, tendineque Flexoris longi ab minimum pertinente, & Lumbricali quarto c. Sic & Fig. 18. o; testus iisdem.

Praeterea Tab. VII. ε in pede extremo.

f g g h i k Interosseus primus digiti quarti.

g g Ortus ejus à posteriore parte marginis inferioris illius lateris ossis metatarsi quarti, quo respicit pollicem.

h Pars tendinea principii.

Quomodo praeterea oriatur à ligamento Peronei longi tendinem in planta retinente, id vide Tab. X. Fig. 21. W P.

i Tendo, k insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti quarti, quo id pollicem spectat.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 22. y z α; testus Interosseo secundo digiti ejusdem quarti β. Dein Fig. 21. W X; testus Interosseo secundo U, Transversali pedis f g, Adductore pollicis k. Dein Fig. 20. ξ; testus Interosseo secundo μ, Transversali pedis g, Adductore pollicis t, Lumbricali quarto Z, & tertio X, Flexoris longi digitorum tendinibus M Q & P. Dein Fig. 19. inter Lumbricalem tertium d, & os metatarsi, osque primum digiti hujus quarti: & inter Lumbricalem quartum c, tendinem U, & Transversalem pedis g; caeterum testus iisdem, quibus in Fig. 20. & praeterea Flexore brevi digitorum T R. Dein Fig. 18. inter Lumbricalem tertium g, & os metatarsi, osque primi ordinis digiti hujus quarti: & inter Lumbricalem quartum h, Transversalem pedis i, & aponeurosis plantae portionem F; testus iisdem, quibus in Fig. 19. & praeterea aponeurosis plantae portione F.

l m m n o p Interosseus primus digiti tertii.

m m Ortus ejus à posteriore parte marginis inferioris illius lateris ossis metatarsi tertii, quo respicit pollicem.

n Tendinea pars principii.

o Tendo, p insertus inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti tertii, quo id pollicem spectat.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 22. s t u; testus Interosseo secundo digiti hujus tertii v. Dein Fig. 21. a b; testus Interosseo secundo Y, Transversali pedis f, Adductore pollicis k. Dein Fig. 20. inter Lumbricalem secundum W, & os metatarsi, osque primum digiti tertii; caeterum testus iis, quibus in Fig. 21. & praeterea Lumbricali secundo W. Sic & Fig. 19. inter Lumbricalem secundum e, & os metatarsi, osque primi ordinis digiti tertii. Et Fig. 18. inter Lumbricalem secundum f, & os primi ordinis digiti tertii.

## FIGURAE V.

*Flexor brevis digitorum pedis.*

a Ortus ab ima parte calcanei, juxta radicem tuberis, quo calx efficitur: unde extrinsecus tendinosus b; qua parte à principio diu cohaeret cum media plantae aponeurosi, ut oriri ab ea videatur.

c Portio ad digitum secundum pertinens. d tendo ejus, e hic divisionis notam habens, post abeuns in caudas duas f. g: quae cohaerent inter se parte tenuiore h; & ad postremum i. k insertae tuberculis, quae sunt in inferiore parte utriusque marginis ossis secundi ordinis digiti hujus, ante caput ossis illius primum.

l Portio ad digitum tertium pertinens. m tendo ejus, definens ut tendo d portionis primae.

n Portio ad digitum quartum pertinens. o tendo ejus, definens ut tendo d.

p Tendo ad digitum minimum pertinens, definensque ut tendo d.

Ligamenta, quibus tendines retinentur, vide Tab. X. Fig. 18. s. t.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 19. L--V; ubi tendinum pars subiecta Flexoris longi digitorum tendinibus l. &c. Dein Fig. 18. v w w. &c. pariter subiectis tendinibus his Flexoris longi digitorum tendinibus x. &c: reliquo autem muscoli

testo media plantae aponeurosi A B C D E F G.

Praeterea Tab. IX. x ψ in pede dextro: & y. z. &c. in sinistro. Et Tab. II. c d in pede extremo. Et Tab. I. E in pede extremo. Et Tab. VI. Y & δ in pede extremo. Et Tab. V. ε in pede extremo.

## FIGURAE VI.

*Flexor longus digitorum pedis, à parte posteriore.*

a Pars tendinea summi principii, b oriens à posteriore tibiae parte, infra longitudinem prope mediam illius eminentiae, à qua Soleus oritur.

c Pars tendinea principii, oriens d d à posteriore parte tibiae, & e à parte proxima ligamenti, quod inter tibiam & fibulam intermedium. Haec pars tendinea, una cum carnea proxima f, subiecta Tibiali postico.

g Tendo.

Ligamentum, quo juxta malleolum internum retinetur, vide Tab. V. e in crure & pede extremo.

Adde Fig. 7. & Fig. 8. a--s.

In *Syntaxi*, Tab. VII. f g in crure; testus Flexore longo pollicis h, & Popliteo Y. Dein Tab. VI. F in crure; testus Soleo Ω &c. Sic & Tab. V. inter tendinem d & ψ in sinistro pede, & inter d & tendinem Plantaris in dextro.

## FIGURAE VII.

*Flexor longus digitorum pedis, à parte priore.*

a a Ortus à tibiae margine.

b c Tendo; b hic ex carne oriens, c hic per latus pedis extremi internum decurrens ad plantam.

Ligamentum, quo juxta malleolum, & ad eam, quae tali caput sustinet, calcanei, sub qua in latere pedis extremi procedit, eminentiam, retinetur, vide Tab. I. u in crure & pede extremo: & Tab. IX. δ in pede dextro.

d Caput ad Flexorem hunc in planta accedens. e e ortus ejus à latere interno tuberis calcanei, quod calcem facit.

Adde Fig. 6. & Fig. 8. a--s.

In *Syntaxi*, Tab. III. X--c in crure & pede extremo; testus tendine Tibialis posticus S--U. Sic & Tab. II. Q R R S Z a b in crure & pede extremo; eodem modo testus Tibialis postici tendine V V. Et Tab. I. θ ι ι x z in crure & pede extremo; similiter testus Tibialis postici tendine λ y y, & Abductore pollicis pedis A B.

A latere, Tab. IX. ψ Ω Ω α ω in pede dextro.

## FIGURAE VIII.

*Flexor longus digitorum pedis, cum Lumbricalibus, & tendine Flexoris longi pollicis, in planta.*

a b Tendo Flexoris longi digitorum pedis. b nodus, ubi se ad calcaneum atterit.

c Portio, quam tendo Flexoris longi digitorum adjungit, continuatque tendini Flexoris longi pollicis.

d e f g g h i Caput, quod ad Flexorem digitorum longum in planta accedit, è duabus à principio constans portionibus, e & f: quarum

e Altera oritur g g ab imo calcaneo, ante partem anteriorem eandemque inferiorem tuberis, quod calcem efficit. Hujus portionis continuationem vide Fig. 7. d e e.

f Altera tenui tendine h incipit, i ab inferiore parte calcanei, ante inferiorem eandemque anteriorem partem tuberis, quod calcem efficit, oriente.

k. l. m. n Quatuor tendines, in quos tendo Flexoris longi digitorum, una cum capite, quod ad eum accedit, abit. Qui tendines ad digitos quatuor parvos pertinent o. p. q. r, per longitudinem quodammodo fissi, s. s. s. s infer-tique ossibus tertiis.

Ligamenta, quibus tendines illi retinentur, vide Tab. X. Fig. 18. s. t. u. Adde Fig. 7. & 6.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 20. A--R; ubi tendinum partem Lumbricales S. W. X. Z integunt. Dein Fig. 19. l m, & ab illo Flexoris digitorum brevis latere, quo spectat pollicem; caeterum testus Lumbricalibus c. d. e. f, Flexore brevi digitorum L--V, Abductore minimi A B, Abductore pollicis F G. Dein Fig. 18. x. &c. & ab illo tendinum Flexoris brevis digitorum v latere, quod pollicem respicit; & inter tendinum illorum cornua w. w: caeterum testus iisdem, quibus in Fig. 19. & praeterea media plantae aponeurosi D E F G.

Praeterea Tab. VII. δ ζ θ in pede extremo. Et Tab. VI. infra X, & δ in pede extremo. Et Tab. IX. y. z in pede sinistro.

t u v Lumbricalis primus, oriens u à tendine primo & secundo Flexoris longi digitorum. v tendo, in quem abit.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 20. S T V. Dein Fig. 19. f; testus Flexore brevi digitorum N O R. Dein Fig. 18. e; testus media plantae aponeurosi A D. w x Lumbricalis secundus. x tendo, in quem abit.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 20. W; testus primo S, & tertio X. Dein Fig. 19. e; testus primo f, & Flexore brevi digitorum R S. Dein Fig. 18. f, testus media plantae aponeurosi A D E.

y z α Lumbricalis tertius, oriens z à tendine secundo & tertio. α tendo ejus.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 20. X Y. Dein Fig. 19. d; testus Flexore brevi digitorum R S T U. Dein Fig. 18. g; testus media plantae aponeurosi A E F. β γ δ Lumbricalis quartus, oriens γ à tendine tertio & quarto. δ tendo, in quem abit.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 20. Z α. Dein Fig. 19. c; testus Flexore brevi digitorum R T U V. Dein Fig. 18. h; testus media plantae aponeurosi A F G.

Tendines se affigunt tuberculis digitorum ossium primi ordinis, quae sunt in inferiore parte illius lateris caputim primorum, quo pollicem spectant: tenuioremque aponeurosem adjungunt tendinibus Extensoris longi digitorum.

ε Tendo Flexoris longi pollicis pedis, qui ζ accepta à tendine Flexoris longi digitorum portione auctus, dein η per longitudinem quodammodo fissus, ad postre-



# TABULAE MUSCULORUM QUINTAE ET VIGESIMAE EXPLANATIO.

postremum  $\theta$  insertus est ossi ultimo pollicis, & asperae quidem eminentiae, quam ab inferiore parte juxta caput primum habet.

Ligamenta, quibus continetur, vide Tab. X. Fig. 18. c. d. d.

Adde Fig. X.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 20. b c d e; tectus Flexoris longi digitorum tendine A, & capite, quod ad eum in planta accedit C. Dein Fig. 19. n o; tectus Flexore brevi digitorum N, & Abductore pollicis F G. Dein Fig. 18. a a b; tectus media plantae aponeurosi A C.

Praeterea Tab. VII. 11 in pede extremo. Et Tab. VI.  $\epsilon \epsilon$  in pede extremo. Et Tab. V.  $\gamma \gamma$  in pede extremo. Et Tab. III. W W in pede extremo. Et Tab. II. f f g in pede extremo. Et Tab. I. F F G in pede extremo. Et Tab. IX. g in pede dextro.

## POLLICIS PEDIS ET DIGITORUM PROXIMORUM TRIUM.

### FIGURAE IX.

#### Extensor brevis digitorum pedis.

a a Origo à superiore parte tuberis, quo pars prior calcanei in superiora eminet.

b Portio ad pollicem procedens. c tendo, in quem abit; d insertus eminentiae obliquae, quae in superiore parte ossis primi pollicis, mox ante caput ejus primum, juxta illud latus, quo spectat digitos parvos.

e Portio ad digitum secundum pertinens. f tendo ejus.

g Portio ad digitum tertium procedens. h tendo ejus.

i Portio ad digitum quartum procedens. k tendo ejus.

l. l. l. Tendinis illi cum tendinibus Extensoris longi digitorum conjuncti in communes tendines, intermedia divisionis nota.

m. m. m. Truncati tendines Extensoris longi digitorum.

n l Tendo communis, factus ex conjunctione tendinis n Extensoris longi, & l brevis. o extremum ossi secundi ordinis insertum. p. q portiones ad os tertium procurentes, quarum altera p est Extensoris longi, altera q brevis. r earum commune extremum, s superiori parti capitis primi ossis tertii ordinis insertum. Eadem in digito tertio, & in quarto. Adde Fig. 1.

In *Syntaxi*, Tab. IX. a--e in pede sinistro; tectus tendine Extensoris proprii pollicis S, tendinibus Extensoris longi digitorum R. Q. P. O, tendine Peronei tertii L M, Peronei brevis D E, & ligamento, quo tendines in confinio cruris & dorsi pedis obducti X.

Et Tab. III. e--l in pede extremo. Dein Tab. II. i k l in pede extremo; tectus tendine Extensoris proprii pollicis I K, tendinibus Extensoris longi digitorum A E, & Peronei tertii tendine D. Sic & Tab. I. H I K in pede extremo; tectus eodem modo tendine Extensoris proprii pollicis i, tendinibus Extensoris longi digitorum c. b. a. w, & Peronei tertii tendine X.

Et Tab. VII. y z a  $\beta$  in pede extremo; tectus Peronei brevis tendine w. Dein Tab. VI. W in pede extremo; tectus tendinibus U Extensoris longi digitorum, tendine V Peronei tertii, & Peronei brevis L. Dein Tab. V. t; tectus eodem modo tendinibus r Extensoris longi digitorum, tendine s Peronei tertii, & Peronei brevis i; praetereaque ligamento q, quo tendines in confinio cruris dorsoque pedis obducti.

## POLLICIS PEDIS.

### FIGURAE X.

#### Flexor longus pollicis pedis.

a a Origo à fibulae planitie posteriore, ante tertiam partem longitudinis ejus incipiens; indeque à duabus sequentibus fere ad malleolum usque pergens b b.

c c Hic fibrae ab utroque latere descendentes convergunt.

d Tendo.

Ligamentum, quo retinetur tendo, vide Tab. IX.  $\Phi$  in pede dextro.

Adde Fig. 8.  $\epsilon \zeta \eta \theta$ .

In *Syntaxi*, Tab. VII. h i k in crure. Dein Tab. VI. H in crure; tectus Soleo  $\Omega$  &c. Eodem modo Tab. V. f in crure.

A latere, Tab. IX.  $\Pi \Sigma$  in pede dextro. Praeterea Tab. III. V in crure.

### FIGURAE XI.

#### Extensor proprius pollicis pedis, à latere.

a a Origo à planitie fibulae, quae tibiae à priori parte obversa; ab eaque planitie secundum totam fere longitudinem spinae prioris: infra autem, ubi spina illa quasi retusa, à planitie inde nata. Perque originis hujus longitudinem oritur etiam à ligamento, quod ad tibiam pertinet, crurisque ossium intervallum maximam partem occludit: & exigua quoque portione infra à tibia b, proxime ligamentum.

c Pars tendinea principii.

d Tendo, e insertus superiori parti capitis primi ossis ultimi pollicis.

Quomodo retineatur ligamento, quod à priori parte cruris, juxta pedis extremi principium est, vide Tab. IX. Y Z in pede sinistro: & Tab. I. r. t in crure pedeque extremo.

f Aponeurosis, quae ad tendinem ab hoc latere accedit, veniens è capsa articuli pollicis cum metatarso.

Aponeurosem, quae ab altero latere accedit, vide Fig. 13. f.

In *Syntaxi*, Tab. IX. S S S T in pede sinistro; tectus Extensore longo digitorum cum Peroneo tertio G I N.

A priori parte, Tab. II. H I K L M in crure & pede extremo; tectus Extensore longo digitorum cum Peroneo tertio A E C. Dein Tab. I. i i i k l l l in crure pedeque extremo; tectus Extensore longo digitorum cum Peroneo tertio  $\tau \psi \phi$ , & Tibiali antico n. Praeterea Tab. IX.  $\lambda \lambda \mu \nu$  in pede dextro.

### FIGURAE XII.

#### Abductor pollicis pedis cum Flexore brevi, ab inferiore parte.

a--e Abductor pollicis pedis.

a Ortus à radice tuberis calcanei, quo calcem efficit: unde extrinsecus tendinosus b, eaque parte à principio diu cohaeret cum aponeurosi tegente.

c Tendo, ad postremum d conjunctus cum ligamento f, quod ab osse sesamoideo pollicis exteriore pertinet ad os pollicis primum, cum eoque ligamento insertus e interiori & eidem inferiori parti capitis, quo os primum pollicis incipit.

Adde Fig. 13. a--c.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 19. F--K; tectus Flexore brevi digitorum L M N. Dein Fig. 18. Q--S; tectus aponeurosi O.

Praeterea Fig. 20. m n, & Fig. 21.  $\beta \gamma \delta$ . Et Tab. V.  $\delta$  in pede extremo.

f Ligamentum, quod ab osse sesamoideo pollicis exteriore ortum g, pertinet ad os primum pollicis, eique se inserit e, conjunctum d cum tendine Abductoris pollicis.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 21.  $\epsilon$ . Et Fig. 20. o; ex parte tectum Flexoris longi pollicis tendine d e. Sic & Fig. 19. K, & Fig. 18. T.

h--s Flexor brevis pollicis pedis.

h Principium tendineum longius, i oriens ab inferiore eademque pedem alterum spectante parte extremi prioris calcanei, mox pone commissuram ejus cum cubiformi.

k Principium tendineum brevius, l oriens ab ima parte ossis cuneiformis, quod medium magnitudine.

m Pars illius portionis aponeurosis plantae mediae, quae abit in principium Flexoris brevis pollicis.

Partem, quam accipit à tendine Tibialis postici, vide Tab. XXIV. Fig. 14. i.

n Flexoris brevis pars, quae pertinet ad os sesamoideum exterius pollicis.

o o Hac parte accedit ad tendinem Abductoris pollicis. p hac inserta ossi sesamoideo exteriore pollicis, inferiori eidemque alterum pedem spectanti parti partis ejus posterioris.

q Pars, quae pertinet ad os sesamoideum interius pollicis.

r Tendo, in quem abit, s insertus parti posteriori ossis sesamoidei interioris pollicis. Conjunctus autem t cum tendineo extremo Adductoris pollicis, commune cum eo & cum Transversali pedis extremum habet.

Adde Fig. 13. d e.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 21. o--u, & y z a; tectus Abductore pollicis  $\beta \gamma$ . Dein Fig. 20. s s v p q r; tectus Abductore pollicis m n, Flexoris longi pollicis tendine c d, Flexore longo digitorum C D &c. Lumbricali primo S. Dein Fig. 19. q q s w x y; tectus Abductore pollicis F H, Flexoris longi pollicis tendine n, Lumbricali primo f, Flexore brevi digitorum N O. Dein Fig. 18. U V W X & inter Y & C; tectus Abductore pollicis Q R, & media plantae aponeurosi A C.

Praeterea Tab. VIII. W X in pede extremo. Et Tab. VII.  $\eta$  in pede extremo.

u Hinc rescissus Adductor pollicis cum Transversali pedis.

v Extremum tendineum commune Adductoris pollicis & Transversalis pedis, w hic conjunctum cum ligamento y, quod ab osse sesamoideo interiore pollicis ad os primum pollicis pertinet, cum eoque x ossi illi primo insertum.

y Ligamentum, quod ab osse sesamoideo interiore pollicis oritur z, & conjunctum cum extremo tendineo communi v Adductoris pollicis & Transversalis pedis, cum eo se inserit x ossi primo pollicis.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 21. w. Et Fig. 20. x; ex parte tectum Flexoris longi pollicis tendine d e. Sic & Fig. 19. u, & Fig. 18. a.

### FIGURAE XIII.

#### Abductor pollicis pedis cum Flexore brevi, à latere.

a a b b c Abductor pollicis pedis.

a a Origo à parte inferiore lateris interni radice tuberis calcanei, quo is calcem efficit.

b b Hic fibrae in angulos conveniunt.

c Tendo, in quem abit.

Adde Fig. 12. a--e.

In *Syntaxi*, Tab. IX.  $\sigma$ -- $\tau$  in pede dextro.

Et Tab. I. A B C in pede extremo.

d e Flexor brevis pollicis pedis.

e Pars haec inferior adjungit se tendini Abductoris pollicis.

Adde Fig. 12. h--s.

In *Syntaxi*, Tab. IX.  $\upsilon \upsilon \phi$  in pede dextro; tectus Abductore pollicis  $\sigma \varsigma$ .

Et Tab. III. d in pede extremo. Et Tab. II. e in pede extremo. Et Tab.

I. D in pede extremo; tectus Abductore pollicis A C.

f Aponeurosis, procedens partim g à tendine Abductoris pollicis, partim h à capsa articuli pollicis cum metatarso; accedensque i i ad tendinem Extensoris proprii pollicis.

In *Syntaxi*, Tab. IX.  $\xi$  in pede dextro.

Et Tab. I. m in pede extremo.

k Tendo Extensoris proprii pollicis, l hic truncatus, m hic insertus ossi primo pollicis.

### FIGURAE XIV.

#### Adductor pollicis pedis, cum Transversali pedis.

a b b c c Ligamentum, quod à calcaneo b b oriens, pertinet ad os cubiforme, hic c. c insertum tuberi ejus.

d Excursus ligamenti mododicti, qui extrinsecus accedit ad ligamentum a Fig. 15. Unaque abeunt e e in primum principium Adductoris pollicis.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 21. K--O. Dein Fig. 20.  $\delta \delta \gamma \epsilon \eta$ ; tecta capite ad Flexorem longum digitorum in planta accedente D F. In Fig. 19. reliquum

[ T t ]



## TABULAE MUSCULORUM QUINTAE ET VIGESIMAE EXPLANATIO.

testum Abductore digiti minimi B A, & Flexore brevi digitorum L.

f--m *Adductor pollicis*. Subtus oritur ab ima parte ossis metatarsi quarti, juxta radicem capitis ejus primi: & à parte inferiore fere tota capitis primi ossis metatarsi tertii, proximaque secundi.

f Adductoris pollicis pars quodammodo separata.

g Pars altera, insignior. h pars tendinea principii.

i Extremum tendineum, quod primum conjunctum k cum extremo tendineo p Flexoris brevis pollicis, cum eoque se inferit posteriori & eidem inferiori & digito secundum spectanti parti ossis sesamoidei pollicis, quod è duobus ejus vicinibus digito secundo: conjunctum dein l cum ligamento n, quod ab osse sesamoideo interiore pollicis ad os ejus primum pertinet; & cum eo se inferit m ossi illi primo, inferiori parti illius lateris capitis ejus primi, quo digito secundum respicit, non multum ultra primum capitis illius marginem.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 21. k--n v; testus Flexore brevi pollicis o s. Dein Fig. 20. t t u w; testus Flexore brevi pollicis s, Flexore longo digitorum D M L K, Lumbricalibus Z. X. W. S. Dein Fig. 19. p r t; testus Flexore brevi pollicis q, Lumbricali primo f, caeterisque, quibus in Fig. 20. & praeterea Flexore brevi digitorum L T. Dein Fig. 18. Y Z; testus Flexore brevi pollicis, Lumbricali primo e, caeterisque, quibus in Fig. 19.

Praeterea Tab. VIII. I in pede extremo. Et Tab. IV. Z in pede extremo.

n Ligamentum, quod ab osse sesamoideo interiore pollicis oritur o, conjunctumque l cum tendineo extremo i Adductoris pollicis, cum eo se ossi primo pollicis inferit m. Vide y Fig. 12.

p Tendineum extremum caudae interioris Flexoris brevis pollicis, q hic truncatum, r hic insertum ossi sesamoideo interiore pollicis.

s Hic truncatus excursus d, una cum ligamento a Fig. 15.

t--y *Transversalis pedis*.

u Principium tendineum, cujus primum principium w nascitur è capsa, qua continetur articulus digiti quinti cum metatarso.

x Hac parte nascitur è capsa articulum digiti quarti cum suo osse metatarsi continente, & à proxima aponeurosi vestiente ibi Interosseos digiti illius.

y y Extremum, quo se adjungit extremo tendineo communi pollicis Adductoris Flexorisque brevis.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 21. f g h i. Dein Fig. 20. g g s; testus Lumbricalibus S V. W. X. Z, & Flexoris longi digitorum tendinibus N. O. P. Q. Dein Fig. 19. g g h; testus Lumbricalibus f. e. d. c, cum tendinibus Flexoris longi digitorum, tendinibus Flexoris brevis digitorum O. S. U. V, Abductore minimi E. Dein Fig. 18. i i i; testus Lumbricalibus e. f. g. h, tendinibus Flexoris digitorum longi & brevis v. &c. media plantae aponeurosi D E F G, Abductore minimi r.

Praeterea Tab. VIII. Z in pede extremo.

### DIGITI MINIMI PEDIS.

#### FIGURAE XV.

##### *Flexor brevis digiti minimi pedis, à parte inferiore.*

a b Ligamentum latum, quod oritur à cubiformis tubere imo, inferiturque capitibus primis ossium metatarsi secundi, tertii, quarti, quinti. Continet tendinem Peronei longi in planta, vaginae instar. Extrinsecus ex parte vestitum accedente excursu b ligamenti a Fig. 14; qui excursus hic c truncatus.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 21. N O P. Dein Fig. 20. Z n θ; parte testis capite ad Flexorem longum digitorum in planta accedente D. Dein Fig. 19. W; tegentibus caeterum Flexore brevi digitorum L T R, & Abductore minimi B. Et quod nudum, id in Fig. 18. testum portione M, qua aponeurosis Abductorem minimi tegens, conjuncta est cum aponeurosi plantae media.

d e f g *Flexor brevis digiti minimi pedis*.

e Hic oritur à ligamento a. Subtus autem etiam à media inferiore parte radicis capitis primi ossis metatarsi quinti.

f Extremum tendineum, g insertum imae parti capitis primi ossis primi digiti minimi.

Adde Fig. 16.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 21. Q R; testus Transversali pedis h. Dein Fig. 20. i x; testus eodem modo Transversali pedis σ. Dein Fig. 19. a b; testus similiter Transversali pedis h, & praeterea Abductore minimi B E. Eodem modo Fig. 18. p; testus Transversali pedis i, & Abductore minimi q r.

h Hinc Interossei digiti minimi ortus à ligamento a b rescissus. i hinc Interossei secundi digiti quarti. k hinc primi, digiti ejusdem. l l hinc partis praecipuae Adductoris pollicis, g h Fig. 14. Hinc m partis ejus alterius, f Fig. 14. Vide P Fig. 21. Tab. X.

#### FIGURAE XVI.

##### *Flexor brevis digiti minimi pedis, à latere.*

a Origo ab ossis metatarsi quinti margine externo, spectante inferiora, juxta caput primum.

b Pars, quae c c inserta exteriori margini amplitudinis inferioris ossis metatarsi digiti minimi, mox pone caput ejus prius.

d Pars altera, eaque praecipua, quae inserta ossi primo digiti minimi. e extremum tendineum, in quod abit.

Adde Fig. 15. d--g.

In *Syntaxi*, Tab. IX. w x. in pede sinistro; testus Abductore minimi r v.

Et Tab. VI. Z--γ in pede extremo. Dein Tab. V. α β in pede extremo; testus Abductore minimi y.

#### FIGURAE XVII.

##### *Abductor digiti minimi pedis, à latere.*

a Pars carnea nuda.

b Tendo, in quem ad postremum abit; c insertus externae parti radicis capitis primi ossis primi digiti minimi.

d Hac parte testus aponeurosi.

e e Ortus ab exteriori parte tota radicis tuberis calcanei, quo calcem efficit.

f Pars aponeurosis, qua intestus est, g inserta posticae parti tuberis magni & inaequalis, quod è capite primo ossis metatarsi digiti minimi in externum pedis latus eminet.

Aponeurosem, quam adjungit tendini Extensoris longi digitorum pedis, vide Fig. 1. w.

Adde Fig. 18.

In *Syntaxi*, Tab. IX. r--v in pede sinistro; testus aponeurosi s.

Et Tab. V. u--y in pede extremo; testus aponeurosi u.

#### FIGURAE XVIII.

##### *Abductor digiti minimi pedis, à parte inferiore.*

a. b Duae partes, ex quibus constat. Quarum haec a separatim tendinem efficit, qui se in aliis cum tendine partis alterius conjungit in unum, in aliis totus separatus.

c c Origo ab inferiore parte tota radicis tuberis calcanei, quo calcem efficit: unde pars altera extrinsecus in totam tendinosam d; altera ex parte e: partibusque illis tendinosis cum aponeurosi, qua teguntur, cohaerent.

f Tendo, g insertus externae parti radicis capitis primi ossis primi digiti minimi.

Aponeurosem, quae ab ejus extremo abscedit, pertinetque ad Extensoris tendinem, qui digiti minimi est, vide Fig. 1. w.

Adde Fig. 17.

In *Syntaxi*, Tab. X. Fig. 19. A B C D E; testus Flexore brevi digitorum M L. Dein Fig. 18. q r; testus aponeurosi I K L.





# INDEX MUSCULORUM.

Numero majore tabula, minore figura indicata.

- Abductor brevis alter pollicis manus XX. 17.  
 Abductor brevis pollicis manus XX. 16.  
 Abductor digiti minimi manus XX. 11.  
 Abductor digiti minimi pedis XXV. 17. 18.  
 Abductor indicis manus XX. 13. 14.  
 Abductor longus pollicis manus XX. 18. 19.  
 Abductor pollicis pedis XXV. 12. 13.  
 Accelerator XII. 37.  
 Adductor brevis femoris XXII. 3. 4.  
 Adductor longus femoris XXII. 1. 2.  
 Adductor magnus femoris XXI. 16. 17.  
 Adductor ossis metacarpi digiti minimi manus XX. 25.  
 Adductor pollicis manus XX. 24.  
 Adductor pollicis pedis XXV. 14.  
 Anconeus XIX. 8.  
 Anterior auriculae XI. 3. 7.  
 Antitragicus XI. 4.  
 Arytaenoideus obliquus XII. 2. 3.  
 Arytaenoideus transversus XII. 1.  
 Attollens auriculae XI. 3. 6. 7.  
 Azygus uvulae XII. 8.  
 Basioglossus XI. 40.  
 Biceps brachii XIX. 3. 4.  
 Biceps cruris XXII. 10. 11. 12.  
 Biventer cervicis XVI. 23. 24.  
 Biventer maxillae XII. 18. 19.  
 Brachialis internus XIX. 1. 2.  
 Buccinator XI. 13. 14. XII. 23.  
 Ceratoglossus XI. 40.  
 Cervicalis descendens XV. 4.  
 Chondroglossus XI. 41.  
 Ciliaris XI. 2.  
 Circumflexus palati mollis XII. 9. 10.  
 Cleidomastoideus XVI. 25. 26.  
 Coccygeus XVII. 7. 8.  
 Complexus XVI. 23. 24.  
 Compressor naris XI. 7.  
 Constrictor inferior pharyngis XII. 23. 24.  
 Constrictor isthmi faucium XII. 11.  
 Constrictor medius pharyngis XII. 23. 25.  
 Constrictor superior pharyngis XII. 23. 26.  
 Coracobrachialis XVIII. 7. 8.  
 Coracohyoideus XI. 35.  
 Corrugator supercilii XI. 1.  
 Cremafter XIII. 4.  
 Cricoaerytaenoideus lateralis XII. 5.  
 Cricoaerytaenoideus posticus XII. 2. 4.  
 Cricothyreoideus XI. 46. 47. 48.  
 Cruralis XXIII. 7.  
 Cucullaris XVII. 18. 19.  
 Deltoides XVIII. 11. 12.  
 Depressor alae nasi XI. 8.  
 Depressor anguli oris XI. 10. 11. 12. 13.  
 Depressor labii inferioris XI. 9. 16.  
 Diaphragma XIV. 4. 5. 6. 7.  
 Epicranius. Vide Frontales & Occipitalem.  
 Erector penis XII. 37. 40.  
 Extensor brevis digitorum pedis XXV. 9.  
 Extensor communis digitorum manus XX. 1.  
 Extensor longus digitorum pedis XXV. 1.  
 Extensor major pollicis manus XX. 22.  
 Extensor minor pollicis manus XX. 23.  
 Extensor proprius digiti auricularis XX. 1.  
 Extensor proprius pollicis pedis XXV. 11.  
 Externus mallei XI. 31. 28.  
 Flexor brevis digiti minimi pedis XXV. 15. 16.  
 Flexor brevis digitorum pedis XXV. 5.  
 Flexor brevis pollicis manus XX. 20.  
 Flexor brevis pollicis pedis XXV. 12. 13.  
 Flexor longus digitorum pedis XXV. 6. 7. 8.  
 Flexor longus pollicis manus XX. 21.  
 Flexor longus pollicis pedis XXV. 10. 8.  
 Flexor parvus digiti minimi manus XX. 10.  
 Frontalis XI. 6. 7.  
 Gemellus XXIV. 10.  
 Gemini XXI. 11.  
 Genioglossus XI. 41. 42. 43.  
 Geniohyoideus XI. 36.  
 Gluteus magnus XXI. 1.  
 Gluteus medius XXI. 2. 3.  
 Gluteus minor XXI. 4. 5.  
 Gracilis XXIII. 5.  
 Hyothyreoideus XI. 45.  
 Iliacus internus XXI. 14. 15.  
 Indicator XX. 12.  
 Infraspinatus XVIII. 6.  
 Intercostales externi XVII. 9. 10.  
 Intercostales interni XVII. 11. 12. 13.  
 Interosseus externi, seu bicipites, digitorum manus XX. 8. 9.  
 Interosseus externi, seu bicipites, digitorum pedis XXV. 2. 3.  
 Interosseus interni digitorum manus XX. 6. 7.  
 Interosseus interni digitorum pedis XXV. 4.  
 Interspinales cervicis XVI. 2. 3.  
 Interspinales dorsi XV. 11.  
 Interspinales lumborum XV. 11.  
 Intertransversarii dorsi XV. 9.  
 Intertransversarii lumborum XV. 10.  
 Intertransversarii posteriores colli XVI. 9. 16. 18.  
 Intertransversarii priores colli XVI. 8. 10.  
 Latissimus colli XI. 16.  
 Latissimus dorsi XVIII. 1. 2. 3.  
 Laxator tympani XI. 30. 28.  
 Levator anguli oris XI. 11. 12.  
 Levator ani XII. 31. 32. 33. 34.  
 Levatores breviores costarum XVII. 14.  
 Levatores longiores costarum XVII. 15.  
 Levator labii superioris XI. 10.  
 Levator labii superioris alaeque nasi XI. 10.  
 Levator menti XI. 15.  
 Levator palati mollis XII. 9.  
 Levator palpebrae superioris XI. 21.  
 Levator scapulae XVI. 13. 14.  
 Lingualis XI. 41. 43.  
 Longissimus dorsi XV. 3. 5. 6.  
 Longus colli XVI. 6. 7.  
 Lumbricales manus XX. 3.  
 Lumbricales pedis XXV. 8.  
 Major helices XI. 4.  
 Masseter XII. 20. 21. 22.  
 Minor helices XI. 4.  
 Multifidus spinae XV. 1. 2.  
 Mylohyoideus XI. 38.  
 Nasalis labii superioris XI. 10. 11.  
 Obliquus externus abdominis XIII. 1. 2.  
 Obliquus inferior capitis XVII. 4.  
 Obliquus inferior oculi XI. 19. 18. 20. 27.  
 Obliquus internus abdominis XIII. 3. 4. 5.  
 Obliquus superior capitis XVII. 3.  
 Obliquus superior oculi XI. 22.  
 Obturator externus XXII. 7. 8.  
 Obturator internus XXI. 10.  
 Occipitalis XI. 6.  
 Opponens pollicis manus XX. 15.  
 Orbicularis oris XI. 10. 11. 12. 13. 14.  
 Orbicularis palpebrarum XI. 1.  
 Orbicularis palpebrarum portio ad labium superius accedens XI. 10.  
 Palatopharyngeus XII. 11. 27. 28. 29. 30.  
 Palmaris brevis XX. 26.  
 Palmaris longus XX. 26.  
 Pectineus XXII. 5. 6.  
 Pectoralis XVIII. 4. 5.  
 Peroneus brevis XXIV. 1. 2.  
 Peroneus longus XXIV. 3. 4. 5.  
 Peroneus tertius XXV. 1.  
 Plantaris XXIV. 11.  
 Popliteus XXIII. 1.  
 Profundus XX. 2. 3.  
 Pronator quadratus XIX. 21. 22.  
 Pronator teres XIX. 19. 20.  
 Psoas magnus XXI. 12. 13. 15.  
 Psoas parvus XV. 14.  
 Pterygoideus externus XII. 15. 16.  
 Pterygoideus internus XII. 15. 17.  
 Pyramidalis XIII. 7.  
 Pyriformis XXI. 6. 7.  
 Quadratus femoris XXI. 8. 9.  
 Quadratus lumborum XV. 12. 13.  
 Radialis externus brevior XIX. 11. 12.  
 Radialis externus longior XIX. 13. 14.  
 Radialis internus XIX. 9.  
 Rectus abdominis XIII. 6.  
 Rectus abducens oculi XI. 26.  
 Rectus adducens oculi XI. 25.  
 Rectus attollens oculi XI. 23.  
 Rectus cruris XXIII. 2. 3.  
 Rectus depressor oculi XI. 24.  
 Rectus internus major capitis XVI. 19. 20.  
 Rectus internus minor capitis XVII. 6.  
 Rectus lateralis capitis XVII. 5.  
 Rectus posticus major capitis XVII. 2.  
 Rectus posticus minor capitis XVII. 1.  
 Retrahentes auriculae XI. 3. 6.  
 Rhomboideus major XVII. 24.  
 Rhomboideus minor XVII. 23.  
 Sacrolumbalis XV. 3. 4. 6.  
 Salpingopharyngeus XII. 27. 28.  
 Sartorius XXIII. 4.  
 Scalenus medius XVI. 4. 5.  
 Scalenus posticus XVI. 12.  
 Scalenus prior XVI. 11.  
 Semimembranosus XXII. 9. 10.  
 Semispinalis dorsi XV. 8.  
 Semitendinosus XXII. 11. 12.  
 Serratus anticus XVII. 22.  
 Serratus magnus XVII. 21.  
 Serratus posticus inferior XVII. 17.  
 Serratus posticus superior XVII. 16.  
 Soleus XXIV. 8. 9.  
 Sphincter ani externus XII. 35. 36.  
 Sphincter ani internus XII. 31. 32.  
 Spinalis cervicis XVI. 15.  
 Spinalis dorsi XV. 7.  
 Splenius capitis XVI. 27.  
 Splenius colli XVI. 1.  
 Stapedius XI. 34. 29.  
 Sternohyoideus XI. 39.  
 Sternomastoideus XVI. 25. 26.  
 Sternothyreoideus XI. 44.  
 Styloglossus XI. 40. 43.  
 Stylohyoideus XI. 37.  
 Stylopharyngeus XII. 27. 28. 30.  
 Subclavius XVII. 20.  
 Sublimis XX. 4. 4.  
 Subscapularis XVIII. 15.  
 Supinator brevis XIX. 17. 18.  
 Supinator longus XIX. 16.  
 Supraspinatus XVIII. 16. 17.  
 Temporalis XII. 12. 13. 14.  
 Tensor tympani XI. 32. 33. 29.  
 Tensor vaginae femoris XXIII. 8.  
 Teres major XVIII. 9. 10.  
 Teres minor XVIII. 13. 14.  
 Thyroaerytaenoideus XII. 3. 4.  
 Thyroaerytaenoideus alter, minor XII. 6. 7.  
 Thyreoepiglotticus major XII. 3. 7.  
 Thyreoepiglotticus minor XII. 3.  
 Tibialis anticus XXIV. 6. 7.  
 Tibialis posticus XXIV. 12. 13. 14.  
 Trachelomastoideus XIV. 21. 22.  
 Tragicus XI. 4.  
 Transversalis cervicis XVI. 16. 17. 18.  
 Transversalis pedis XXV. 14.  
 Transversus abdominis XIV. 1. 2. 3.  
 Transversus auriculae XI. 5.  
 Transversus perinaei XII. 37. 38.  
 Transversus perinaei alter XII. 37. 39.  
 Triangularis sterni XIV. 1.  
 Triceps brachii XIX. 5. 6. 7.  
 Vastus externus XXIII. 6. 7.  
 Vastus internus XXIII. 6. 7.  
 Vesicae musculus XII. 41.  
 Ulnaris externus XIX. 15.  
 Ulnaris internus XIX. 10. 11.  
 Zygomaticus major XI. 10. 11. 13.  
 Zygomaticus minor XI. 10.

F I N I S.







